

# Les oiseaux rares en Île-de-France en 2023

Yves Massin

## RÉSUMÉ

Cette synthèse annuelle concerne les taxons les plus rares au niveau régional, ceux qui totalisent (en principe) au maximum 20 individus sur 5 ans. Elle s'inscrit dans la continuité des rapports du Comité d'homologation régional publiés depuis 1993 dans *Le Passer*. La liste des taxons concernés comprend une centaine d'espèces et sous-espèces, dont 47 ont fait l'objet d'au moins une observation en 2023. Parmi les faits les plus marquants : une première mention régionale pour la Fauvette mélanocéphale, un afflux historique d'Océanites en novembre et la première reproduction prouvée de l'Aigle botté dans la région.

## ABSTRACT

*This annual report deals with the rarest taxa for the Paris region, totalling a maximum of 20 individuals over the last 5 years. It follows on from the CHR reports published since 1993 in Le Passer by the Regional Rarities Committee. The list of taxa involved includes about a hundred species and subspecies, among which 47 were reported at least once in 2023. Among the main highlights: a first mention for the Sardinian Warbler, a historic influx of Storm Petrels in November and the first proven breeding of the Booted Eagle in the region.*

*Plongeon imbrin  
pêchant une Écrevisse  
de Louisiane,  
Viry-Châtillon (91).  
© Y. Massin*




## Contexte météorologique de l'année 2023

Cette année est marquée dans notre région par un hiver sec sans gel prolongé, un printemps et un été proches des normes et un automne très contrasté. Contrairement à 2022, les canicules estivales ont cette fois épargné l'Île-de-France, la température de 35 °C n'étant atteinte que pendant la première quinzaine de septembre, à l'occasion d'une vague de chaleur tardive touchant la moitié nord du pays. À l'échelle de la France, ce mois de septembre a été le plus chaud depuis 1900 (source Météo France). Après une première quinzaine d'octobre également ensoleillée et chaude (28,6 °C à Paris le 2), l'automne a été ensuite particulièrement agité et pluvieux. De mi-octobre à mi-novembre, quatre tempêtes atlantiques précoces se sont succédé, emportant des espèces pélagiques à l'intérieur des terres, en particulier Ciaran (1-2 novembre, rafales dépassant 170 km/h en Bretagne), et Domingos (4-5 novembre, 150 km/h en Charente-Maritime). Le début d'hiver a été doux dans la région comme dans l'ensemble du pays.

## Révision de la liste de référence

La liste des taxons concernés est révisée régulièrement sur la base de critères statistiques. Cette année, la Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* disparaît de la synthèse après plusieurs années de hausse spectaculaire de ses effectifs (38 ind. dénombrés en 2022). En 2023, une vingtaine de sites sont à nouveau fréquentés par l'espèce, dont au moins 3 avec preuves certaines de reproduction. Ce passereau sédentaire a profité d'une décennie d'hivers doux



pour se réinstaller dans le nord de la France et fait désormais partie de l'avifaune nicheuse de notre région.

## Sources des données citées

Les données compilées dans la présente synthèse proviennent essentiellement de la plateforme naturaliste participative Faune IDF animée par la LPO Île-de-France. Quelques données complémentaires vérifiées proviennent de la plateforme GeoNat'îdF de l'Agence régionale de la biodiversité. Des données ont pu évidemment nous échapper : il n'est jamais trop tard pour les saisir, surtout s'il existe des documents de preuves (photos ou

*Cisticole des joncs, carte des données 2023 saisies sur Faune IDF. S'y ajoutent quelques autres sites signalés sur GeoNat'îdF*

enregistrements sonores). Elles pourront alors être examinées rétrospectivement et, après vérification, publiées dans des synthèses ultérieures.

### Les faits marquants de l'année dans la région

- Première mention historique pour la **Fauvette mélanocéphale**.
- Preuve du séjour d'une **Chouette de Tengmalm** en forêt de Fontainebleau (première régionale).
- Premières données contemporaines pour les **Océanites culblanc et tempête**.
- Deuxièmes mentions régionales pour la **Sterne Hansel**, 61 ans après la première, et pour le **Chevalier à pattes jaunes**.
- Troisième mention pour un **Bruant nain** enregistré en forêt de Fontainebleau.
- Première nidification prouvée de l'**Aigle botté**.
- Première donnée hivernale de **Busard pâle**.
- Effectifs records pour le **Plongeon imbrin**, l'**Ibis falcinelle**, l'**Aigle botté** et le **Busard pâle**.
- Stationnement printanier d'un **Martinet à ventre blanc** en Essonne.

Ces données sont détaillées à leurs places dans les pages qui suivent.

### Liste des données par espèces

L'ordre taxonomique suivi est celui révisé par la Commission de l'avifaune française en 2020. Pour rappel, la nouvelle Liste des oiseaux de France remanie profondément l'ordre des familles suite aux travaux phylogénétiques basés sur les analyses

ADN (CAF, 2020). Pour chaque taxon, les données sont citées dans l'ordre chronologique. Sont indiqués : le nombre d'individus différents estimés sur l'année, suivi entre parenthèses de l'effectif cumulé des 5 dernières années (2019-2023), les dates minimales de présence de chaque oiseau et les sites fréquentés.

Les taxons soumis à homologation nationale sont marqués d'un astérisque\*.

#### Bernache Cravant

*Branta bernicla*, 9 ind. minimum (17 en 5 ans)

- 1 ind. au moins enregistrée en migration nocturne le 29 mars à Raizeux (78) et à Saint-Ouen (93) : peut-être le même vol ?
- 1 juv. le 22 novembre à Congis-sur-Thérouanne (77) ;
- un groupe de 7 oiseaux le 24 décembre sur le même site.

Les oiseaux vus en Île-de-France appartiennent à la sous-espèce *bernicla*.

#### Oie des neiges\*

*Anser caerulescens*, 3 ind. (4 en 5 ans)

- 2 oiseaux de forme blanche en vol le 18 décembre à Jablines (77) ;
- 1 le 24 décembre à Viry-Châtillon (91) en compagnie de Bernaches du Canada (photo page suivante).

Tous les individus vus en France sont considérés comme des échappés, cette oie étant élevée pour l'ornement dans plusieurs pays d'Europe occidentale. Il y a d'ailleurs un oiseau captif au bois de Vincennes (75) depuis 2019.

#### Oie rieuse

*Anser albifrons*, 6 ind. (70 en 5 ans)

Seule la Seine-et-Marne fournit des données cette année.



Aucun groupe n'étant signalé, il est difficile de statuer sur l'origine de ces oiseaux qui reviennent probablement chaque automne dans les boucles de la Marne. Les mêmes individus sont d'ailleurs peut-être comptabilisés plusieurs fois au fil de leurs déplacements hivernaux.

- 2 oiseaux fréquentent l'étang des Olivettes à Trilbardou (77) du 29 janvier au 7 février, dont 1 reste jusqu'au 18 février. Ces oiseaux étaient probablement les mêmes que l'hiver précédent ;
- 1 du 21 février au 4 mars à Congis-sur-Thérouanne (celle de Trilbardou qui s'est déplacée ?) ;
- 1 le 25 mars à Changis-sur-Marne (77) : serait-ce encore la même ?

*Oie des neiges,  
Viry-Châtillon (91).  
Les bords noirs du bec  
sont typiques de  
l'espèce.  
© Y. Massin*



- 1 le 26 août à Villeneuve-le-Comte (77), date très précoce : l'oiseau était probablement féral ou échappé ;
- 1 du 28 octobre au 5 novembre à Nangis (77).

#### **Fuligule à tête noire\***

*Aythya affinis*, 1 ind. (5 en 5 ans)

- Un mâle hiverne dans un groupe de Fuligules morillons à l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) du 24 février au 5 avril. Ce site avait déjà accueilli un mâle au printemps 2021, peut-être le même revenu deux ans après.
- C'est certainement le même qui est revu du 25 au 27 avril à l'étang du Manet à Magny-les-Hameaux (78), seulement 3 km plus au sud.

*Fuligule à tête noire,  
mâle (en haut) avec  
2 Fuligules morillons,  
Saint-Quentin-en-  
Yvelines (78). Noter le  
manteau et les  
scapulaires gris clair,  
ainsi que les rémiges  
primaires sombres  
délimitant une barre  
alaire blanche réduite.  
© B.Froelich*



Macreuse noire,  
Jablines (77). Le ventre  
blanc indique un  
juvénile.  
© D. Bodo

### Macreuse noire

*Melanitta nigra*, 9 ind. (19 en 5 ans)

Même si des milliers d'individus hivernent chaque année dans la Manche, cette macreuse reste très rare à l'intérieur des terres.

- 1 mâle ad. le 11 mars à Saint-Quentin-en-Yvelines (78), suite au passage la veille de la tempête Larisa sur l'ouest de la France ;
- 1 juv. stationne sur le même site du 25 novembre au 2 décembre, puis 2 le 8 décembre ;
- jusqu'à 6 oiseaux de type fem. du 2 au 21 décembre à la base de loisirs de Jablines (77).

### Harle huppé

*Mergus serrator*, 1 ind. (9 en 5 ans)

- 1 oiseau de type fem. les 21 et 22 décembre à Changis-sur-Marne (77).

### Érismature rousse

*Oxyura jamaicensis*, 1 ind. (2 en 5 ans)

- 1 ind. les 6 et 15 janvier à Ville-Saint-Jacques (77).
- L'espèce, introduite d'Amérique comme canard d'ornement, fait l'objet depuis la fin des années 1990 d'un programme européen de régulation pour éviter son hybridation avec l'Érismature à tête blanche. Concentrée dans les Pays de la Loire, la population française se limite désormais à quelques dizaines d'oiseaux (28 dénombrés en janvier 2023 lors du comptage Wetlands International).

### Martinet à ventre blanc

*Tachymartitis melba*, 1 ind. (2 en 5 ans).

Stationnement remarquable d'un oiseau chassant parmi les Martinets noirs au-dessus des lacs de Grigny et Viry-Châtillon (91) du 17 au 30 avril, soit près de deux semaines. Des photos prises à 10 jours d'intervalle ont permis de confirmer qu'il s'agissait bien du même oiseau (mue d'une secondaire à l'aile gauche et marques sombres distinctives sur la poitrine). C'est seulement la 5<sup>e</sup> donnée régionale après celles de 1998, 2002, 2010 et 2020, et elle intervient trois ans jour pour jour après celle de 2020. L'observation, quoique surprenante, n'a pas été un cas isolé. Le mois précédent, un afflux record a été observé dans les îles Britanniques, avec plusieurs dizaines d'oiseaux notés au Royaume-Uni et en Irlande. Ce dépassement d'aire de nidification (overshooting dans le vocabulaire anglo-saxon) était



Martinet à ventre blanc,  
Grigny (91)  
© L. Domingues-  
Haccart (17 avril) et  
© N. Pruss (27 avril).  
On reconnaît la  
secondaire manquante  
à l'aile gauche qui  
confirme qu'il s'agit du  
même individu

favorisé par un flux de sud soutenu pendant la migration printanière.

### Rôle des genêts

*Crex crex*, 2 ind. (8 en 5 ans)

- 2 chanteurs se répondent du 2 au 5 septembre à Balloy (77).

Il est rare que l'espèce chante en migration d'automne. Peut-être la présence simultanée de deux mâles a-t-elle réveillé chez eux l'instinct territorial pendant leur stationnement ? Pour mémoire, le dernier cantonnement de l'espèce en période de reproduction dans notre région avait eu lieu en 2003 dans le même secteur de la Bassée (Le Maréchal *et al.*, 2013).

### Grèbe esclavon

*Podiceps auritus*, 1 ind. (7 en 5 ans)

- 1 ind. le 15 janvier à Vimpelles (77).

### Huîtrier pie

*Haematopus ostralegus*, 1 ind. (14 en 5 ans)

- 1 migrateur nocturne enregistré le 17 mars aux Molières (91).

### Gravelot à collier interrompu

*Charadrius alexandrinus*, 1 ind. (1 en 5 ans)

- 1 fem. photographiée le 25 juin à Nangis (77).

### Guignard d'Eurasie

*Eudromias morinellus*, 2 ind. (15 en 5 ans)

Les seules données de l'année concernant des migrateurs nocturnes enregistrés le 20 août à Thorigny-sur-Marne (77) et le 28 août à Brie-Comte-Robert (77).

### Barge rousse

*Limosa lapponica*, 5 ind. (23 en 5 ans)

- 1 ind. le 7 mai à Mousseaux-sur-Seine (78) ;
- 1 enregistré dans la nuit du 8 au 9 mai à Mouroux (77) ;
- 2 le 23 septembre à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) ;
- 1 stationne du 23 septembre au 1er octobre à Nangis (77).

### Phalarope à bec large

*Phalaropus fulicarius*, 1 ind. (3 en 5 ans)

- 1 ind. photographié le 5 décembre sur un bassin du parc de Sceaux (92).

Également un Phalarope indéterminé le 7 novembre à Saint-Quentin-en-Yvelines (78), à une date et dans un contexte qui plaident pour *fulicarius*. Malheureusement l'observation trop lointaine n'a pas permis de préciser l'espèce.





Chevalier à pattes jaunes (à gauche), à côté d'un Chevalier sylvain, Saclay (91).  
© L. Spriet

### Chevalier à pattes jaunes\*

*Tringa flavipes*, 1 ind. (1 en 5 ans)

#### Deuxième mention régionale

- 1 oiseau en plumage nuptial fait halte du 3 au 8 mai à l'étang de Saclay (91).

La première mention de ce limicole néarctique dans notre région date de l'automne 2018 (Massin et le CHR, 2020).

### Mouette tridactyle

*Rissa tridactyla*, 3 ind. (24 en 5 ans)

- 2 ad. sont trouvés épuisés le 16 janvier après le passage de la tempête Gérard dans le quart nord-ouest de la France : 1 sur la Seine à Courbevoie

- (92) et 1 dans un jardin à Melun (77) ;
  - 1 juv. le 11 novembre à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) suite au passage de la tempête Domingos.
- Pour rappel, un afflux record de 19 oiseaux avait eu lieu l'automne précédent.

### Sterne hansel

*Gelochelidon nilotica*, 3 ind. (3 en 5 ans) -

#### Deuxième mention régionale

- 3 adultes sont photographiés en vol le 5 août à Saint-Quentin-en-Yvelines (78).

La précédente mention, sur le même site, remonte à 1962 (Le Maréchal *et al.*, 2013).

### Sterne caspienne

*Hydroprogne caspia*, 9 ind. (28 en 5 ans)

- 1 ind. le 16 avril à Lesches (77) ;
- 1 le 2 juin, 3 le 5 septembre, puis 2 le 30 septembre à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) :

Sterne caspienne adulte,  
Saint-Quentin-en-Yvelines (78).  
© C. Ménard



- 1 le 9 juin à Saulx-les-Chartreux (91) ;
- 1 enregistrée en migration nocturne le 14 septembre à Mouroux (77).

### Sterne caugek

*Thalasseus sandvicensis*, 8 ind. (27 en 5 ans)

- 6 ind. le 30 avril à Jaulnes (77) ;
- 1 le 10 juillet, puis 2 le 12 juillet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) ;

### Sterne arctique

*Sterna paradisaea*, 1 ind. (6 en 5 ans)

- 1 en vol le 25 avril à l'étang des Olivettes à Trilbardou (77).

### Guifette leucoptère

*Chlidonias leucopterus*, 2 ind. (8 en 5 ans)

- 1 ad. en plumage nuptial complet le 19 mai à Vimpelles (77) ;
- 1 ad. en mue le 21 août à Saint-Quentin-en-Yvelines (78).

Guifette leucoptère,  
adulte en mue,  
Saint-Quentin-en-  
Yvelines (78).  
© B. Froelich



Plongeon arctique  
adulte, Mousseaux-sur-  
Seine (78).  
© T. Chaurand

### Labbe indéterminé

*Stercorarius sp.*, 2 ind.

- 2 ad. passent en vol le 1<sup>er</sup> octobre à Champlan (91).  
La description oriente vers le Labbe parasite  
*Stercorarius parasiticus*.

### Plongeon arctique

*Gavia arctica*, 2 ind. (6 en 5 ans)

- 1 oiseau d'âge incertain les 15 et 16 janvier à Vaires-sur-Marne (77) ;
- 1 ad. stationne du 1<sup>er</sup> au 29 décembre à la base de loisirs de Moisson à Mousseaux-sur-Seine (78), en compagnie de 3 à 4 Plongeurs imbrins !





### Plongeon imbrin

*Gavia immer*, 12 ind. (18 en 5 ans)

#### Effectif record

Tous les oiseaux vus cette année sont des jeunes de premier hiver. Les premiers de l'automne arrivent dans le sillage de la tempête Domingos le 5 novembre, puis les effectifs se renforcent en décembre. Comme souvent, les hivernants se nourrissent principalement d'Écrevisses de Louisiane *Procambarus clarkii*.

- 1 ind. hiverne du 6 janvier au 3 mars aux étangs de Grigny et Viry-Châtillon (91) ;
- 1 le 5 novembre à Saint-Martin-la-Garenne (78), revu à partir du 7 quelques kilomètres plus au nord à la base de loisirs de Moisson à Mousseaux-sur-Seine (78), où jusqu'à 4 ind. sont observés simultanément en décembre ;

*Plongeon imbrin*,  
2<sup>e</sup> année civile,  
Viry-Châtillon (91).  
© Y. Massin



- 1 du 5 novembre au 28 décembre au moins à Jablines (77), probablement le même vu le 8 novembre à Trilbardou, à quelques kilomètres de là ;
- 1 du 7 novembre au 16 décembre à Congis-sur-Théroutte (77) ;
- 1 le 19 novembre à Marolles-sur-Seine (77) ;
- 1 du 14 au 27 décembre, puis 2 à partir du 29 décembre à l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) ;
- 2 le 16 décembre à Grisy-sur-Seine (77).

### Océanite tempête

*Hydrobates pelagicus*, 2 ind.

#### Première contemporaine

Dans la nuit du 1<sup>er</sup> au 2 novembre, la tempête Ciaran balaye les côtes atlantiques avec des rafales dépassant 170 km/h à la pointe Bretonne. Des milliers d'oiseaux pélagiques, alors en migration dans le golfe de Gascogne, sont drossés sur les côtes, principalement des Phalaropes à bec large, Mouettes de Sabine et Océanites. Parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui sont emportés à l'intérieur des terres et sont retrouvés morts ou épuisés dans les jours qui suivent. L'Océanite culblanc est de loin le plus nombreux, mais quelques Océanites tempêtes sont également concernés, bien que l'essentiel de la population de cette espèce ait déjà migré plus au sud à cette date.

En Île-de-France, 2 oiseaux sont retrouvés :

- 1 le 2 novembre dans une rue de Paris et 1 le 5 novembre à Raizeux, au sud-ouest de la forêt de Rambouillet (78). Les deux oiseaux, très affaiblis, sont morts avant d'avoir pu être soignés. Le cadavre de l'oiseau parisien a été confié au Muséum national d'histoire naturelle par le centre vétérinaire de Maisons-Alfort (source : Faune Alfort).

La seule mention précédemment connue de l'espèce dans notre région remonte à 1884 et concerne 2 oiseaux trouvés en Seine-Saint-Denis après le passage de tempêtes automnales (Le Maréchal *et al.*, 2013).

- 1 océanite d'espèce indéterminée est également observé volant le 5 novembre à Saclay (91).

### Océanite culblanc

*Oceanodroma Leucorhoa*, 9 ind.

#### Première contemporaine

Cette espèce stationne massivement dans le golfe de Gascogne en novembre, ce qui explique que des milliers d'individus aient été observés le long des côtes atlantiques suite au passage des tempêtes

*Océanite culblanc*,  
Trilbardou (77).  
© P. Malliet



Ciaran et Domingos. Plusieurs dizaines ont été emportés à l'intérieur des terres aussi loin à l'est que le lac du Der en Champagne (cf carte Faune France). Dans notre région, 9 ont été trouvés :


- 1 ind. épuisé le 4 novembre à Saint-Rémy-les-Chevreuse (78), transféré au centre vétérinaire de Maisons-Alfort, puis au MNHN (il n'a pas survécu) ;
- 1 observé volant le 5 novembre au lac d'Enghien (95) ;
- 1 trouvé mort sur la Seine le même jour à Alfortville (94) ;
- 2 observés volants le même jour à la base de loisirs de Moisson (78) ;
- 1 observé le même jour aux étangs de Vernouillet et Verneuil-sur-Seine (78) ;

*Océanite culblanc*,  
Trilbardou (77).  
© P. Malliet

- 1 volant le même jour à l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) ;
- 1 le même jour à la base de loisirs de Jablines (77) ;
- enfin 1 à l'étang des Olivettes à Trilbardou (77), le seul revu le lendemain 6 novembre.

Les uniques mentions antérieures dans la région datent de 1952 : 2 oiseaux avaient été capturés à Paris après une tempête à des dates similaires (Le Maréchal *et al.*, 2013). En France, l'afflux précédent avait eu lieu de fin octobre à fin novembre 2022 dans le sillage des tempêtes Armand, Béatrice, Claudio et Martin, avec des milliers d'oiseaux dénombrés le long du littoral atlantique, mais peu d'observations à l'intérieur des terres (Blat *et al.*, 2023). Antérieurement, il n'y avait pas eu d'événement comparable depuis la tempête Ludwig de novembre 2009. Aucun oiseau n'avait alors non plus atteint notre région.

L'afflux d'Océanites culblancs en France du 3 au 6 novembre 2023.  
© Faune France



Il semble que ces afflux d'Océanites culblancs soient favorisés par l'orientation des vents tempétueux au sud-ouest, au moment du pic de passage de l'espèce à la latitude du golfe de Gascogne. Pour rappel, les populations du nord de l'océan Atlantique hivernent au large des côtes africaines.

Contrairement à l'épisode de novembre 2022, celui de novembre 2023 ne s'est pas accompagné d'un afflux de Mouettes tridactyles, 1 seul oiseau ayant été observé dans notre région à l'automne (voir plus haut).

### Cormoran huppé


*Phalacrocorax aristotelis*, 2 ind. (2 en 5 ans)

- 1 juv. du 12 au 14 août à l'étang de Saint-Hubert (78), site qui avait déjà connu des observations en 1998 et 2011 ;
- 1 juv. du 24 au 26 septembre au bord de la Seine à Croissy-sur-Seine (78).

Cela faisait 8 ans que cette espèce côtière n'avait pas été notée dans notre région. Presque toutes les données historiques proviennent des Yvelines.



Cormoran huppé juvénile, étang de Saint-Hubert (78). © C. Alexandre



Cormoran huppé juvénile, Croissy-sur-Seine (78).  
© L. Bouilleau



**Ibis falcinelle***Plegadis falcinellus*, 16 ind. (29 en 5 ans)**Effectif record**

- 8 ind. le 4 mai à Trilbardou et Lesches (77), site qui avait déjà accueilli l'espèce en 2014 ;
- 3 posés le 8 mai à Tremblay-en-France (93), sans doute les mêmes vus en vol le même jour à Chelles (77) ;
- 2 en vol le 20 mai à Grigny (91) ;
- 1 ad. nuptial les 11 et 12 juin à Saclay (91) ;
- 1 juv. probable le 26 juillet à Triel-sur-Seine (78) ;
- 1 le 20 décembre à Trilbardou (77).

La hausse des effectifs rencontrés est à mettre en relation avec l'explosion démographique de l'espèce en France, où la population nicheuse dépasse les 1 000 couples et où près de 5 000 oiseaux hivernent (source Wetlands International 2023).

*Ibis falcinelle, adulte nuptial, Saclay (91).*  
© L. Spriet

**Crabier chevelu***Ardeola ralloides*, 1 ind. (7 en 5 ans)

- 1 ad. le 14 juin à Jaulnes (77), site ayant déjà accueilli l'espèce au printemps en 2013, 2015 et 2019.

**Élanion blanc***Elanus caeruleus*, 3 ind. minimum (15 en 5 ans)

- 1 ad., découvert le 27 décembre 2022, hiverne dans une friche à Saint-Martin-de-Bréthencourt (78) jusqu'au 23 janvier au moins ;
- 1 le 21 avril à Maisse (91) ;
- 1 en migration vers le nord le 25 avril à Roissy-en-Brie (77).

Trois autres mentions dans les Yvelines n'ont pas été retenues car des doutes subsistent. Également 2 données hivernales non documentées en Essonne et en Seine-et-Marne (source GeoNat'îdF).

*Élanion blanc, Saint-Martin-de-Bréthencourt (78).*  
© J.-L. Déniel

L'expansion très rapide de l'espèce vers le nord de la France laisse espérer une première nidification régionale dans les prochaines années. Aux limites de notre région, l'espèce s'est en effet déjà reproduite dans l'Eure (1993), l'Aube (2020), la Marne (2020) et dernièrement l'Oise (2023, Issa N., comm. pers.). Encore plus au nord, elle a déjà niché dans le département du Nord (2017) et le Pas-de-Calais (2019, source LPO Pas-de-Calais).

### Vautour fauve

*Gyps fulvus*, 2 ind. (27 en 5 ans)

- 1 en vol le 30 mai en forêt de Fontainebleau (78) ;
- 1 en vol le 27 juin à Jablines (77) ;
- 2 vautours ont aussi été signalés le 3 avril en plein Paris, mais la description incomplète n'a pas permis de confirmer l'espèce ni d'exclure des échappés de volière.

### Aigle botté

*Hieraetus pennatus*, 17 ind. (52 en 5 ans)

#### Effectif record

Outre ce nombre record d'individus, cette année est marquée par la première nidification prouvée de l'espèce en Île-de-France. Un couple élève 2 jeunes en août et septembre dans une pinède claire de Seine-et-Marne (localisation non divulguée). Les 4 oiseaux sont de forme claire. Un article séparé relate la découverte de cette reproduction (Massin et Savry, 2023). Avec cet événement et la hausse des effectifs observés, l'espèce sort de la liste de cette synthèse pour les années à venir.

Les autres observations concernent classiquement l'Essonne et la Seine-et-Marne. En tout, 12 oiseaux clairs et 5 sombres sont signalés. Il n'est pas exclu



que certains aient été comptés plusieurs fois au cours de leurs déplacements mais à défaut de photos, il est impossible de le vérifier au cas par cas :

- 1 ind. clair le 27 avril et le 13 septembre à Auvernaux (91) ;
- 1 clair le 9 juin à Arbonne-la-Forêt (77) ;
- 1 clair le 15 juin à Charny (77) ;
- 1 clair le 2 juillet à Mondreville (77) ;
- 1 clair le 18 juillet et le 5 août et 1 sombre le 6 août à Écharcon (91) ;
- 1 sombre le 7 août à Isles-les-Meldeuses (77) ;
- 2 sombres (ad. et juv.) le 14 septembre entre Auferville et Chevrainvilliers (77) ;
- 2 clairs le 16 septembre à Arbonne-la-Forêt (77) ;

*Aigle botté, femelle du couple nicheur (77).*  
© M. Savry

- 1 sombre le 30 septembre à Bazoches-les-Bray (77). Également une donnée non vérifiée dans la vallée de l'Essonne en octobre (source GeoNat'idF).

### Busard pâle

*Circus macrourus*, 8 ind. (20 en 5 ans)

#### Effectif record

Deux données printanières et cinq automnales, à des dates tardives favorisées par un début d'automne chaud et ensoleillé. Décembre fournit en outre la première donnée hivernale dans la région.

- 1 fem. le 9 avril à Arthies (95) ;
  - 1 mâle ad. le 19 avril à Mouroux (77) ;
  - 1 mâle ad. le 18 septembre à Chatignonville (91) ;
  - 1 fem. ad. le 3 octobre à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) ;
  - 1 juv. le 16 octobre à Trilbardou (77) ;
  - 1 fem. le 23 octobre à Rolleboise (78) ;
  - 1 mâle ad. le 27 octobre à Tancrou (77) ;
  - 1 juv. du 17 au 21 décembre à Blandy (91), première mention hivernale de l'espèce en Île-de-France.
- Peut-être un 9<sup>e</sup> oiseau en novembre, mais la description imprécise n'a pas permis de valider la donnée en l'absence de photos.

### Pygargue à queue blanche

*Haliaeetus albicilla*, 3 ind. (4 en 5 ans)

- 1 imm. de 3<sup>e</sup> plumage est photographié en vol le 26 février à Balloy (77) ;
- 1 autre imm. plus âgé est photographié le 3 mars à Vendrest (77) ;
- 1 jeune mâle équipé d'une balise GPS est retrouvé mort le 18 octobre à Coubert (77) tenant un Canard souchet dans les serres. Il s'agissait d'un individu relâché en Espagne, sur la côte des Asturies, dans



le cadre du programme de réintroduction « Proyecto Pigargo » lancé en 2021 par l'association GREFA ([www.grefa.org](http://www.grefa.org)). Les causes de sa mort ne sont pas encore élucidées à l'heure où nous écrivons ces lignes. À noter qu'un autre pygargue relâché par le GREFA était déjà mort en France en 2022, dans le Maine-et-Loire, heurté par une ligne électrique mais aussi intoxiqué par un rodenticide (source LPO France, Rapaces de France n°25, p.18).

### Grand-duc d'Europe

*Bubo bubo*, 2 ind. (12 en 5 ans)

- le site ayant accueilli une reproduction dans les Yvelines en 2022 est toujours occupé, un oiseau ayant été repéré le 7 avril, mais sans preuve de reproduction cette année ;

*Busard pâle juvénile, Blandy (91).*  
© M. Cauchois



- un chant est entendu sur un nouveau site en Essonne le 16 novembre.

Nous avons appris cette année qu'une nidification avait déjà eu lieu au printemps 2017 dans une carrière de l'Essonne, où 3 poussins avaient été photographiés (source : inaturalist.org). La première de 2022 n'était donc pas une et l'espèce nichait déjà depuis cinq ans dans notre région en toute discrétion...

Le découvreur de cette nichée de 2017 n'a malheureusement pas pu être contacté pour davantage de précisions. S'il nous lit, qu'il n'hésite pas à se manifester !

### Chouette de Tengmalm

*Aegolius funereus*, 1 ind.

#### Première mention régionale

Une plumée, trouvée dans un nichoir à Chouette hulotte le 21 janvier en forêt de Fontainebleau, prouve la dispersion jusque-là insoupçonnée de cette espèce montagnarde jusqu'à notre région. L'oiseau a très probablement été la proie de la hulotte qui fréquentait le nichoir. Celui-ci n'ayant pas été contrôlé depuis septembre 2022, on ignore la date de la prédation et si la chouette de Tengmalm était déjà présente l'année précédente (Baradez et Sénécal, 2023).



### Pie-grièche grise

*Lanius excubitor*, 2 ind. (10 en 5 ans)

- 1 hivernant du 31 janvier au 27 mars en forêt de Fontainebleau, dans la réserve biologique dirigée de Macherin et ses abords (77). C'est probablement le même oiseau que l'hiver précédent, fréquentant les mêmes parcelles à peu près aux mêmes dates ;
- 1 le 28 février aux Ormes-sur-Voulzie (77), site où l'espèce avait déjà hiverné en 2020.

Également une donnée non vérifiée le 27 mars en Essonne (source GeoNat'idF).

*Pie-grièche grise*,  
Fontainebleau (77).

© J.-L. Déniel

### Grand Corbeau

*Corvus corax*, 6 ind. (14 en 5 ans)

Les quatre données sont de Seine-et-Marne, dont deux dans les boucles de la Marne où les observations avaient été régulières en 2022.

- 1 ind. en vol le 13 janvier à Nanteuil-sur-Marne (77) ;
- 1 photographié en vol le 24 octobre à Barbizon (77) ;
- 2 le 7 novembre à Tancrou (77), où 4 oiseaux avaient été vus l'automne précédent ;
- 2 également le 12 décembre à Fontainebleau (77).

### Pouillot ibérique

*Phylloscopus ibericus*, 1 ind. (2 en 5 ans)

- 1 chanteur cantonné est enregistré et photographié du 7 au 21 mai à Auffreville-Brasseuil (78).

La précédente observation date du printemps 2020 : 1 chanteur avait été découvert le 6 mai en forêt de Fontainebleau où il était resté deux mois (Massin, 2021).

### Hypolaïs icterine

*Hippolais icterina*, 1 ind. (2 en 5 ans)

- 1 mâle chanteur est observé le 30 avril à Limay (78). La donnée GeoNat'îdF n'est pas documentée mais la description précise du plumage et du chant est crédible et l'observateur connaissait bien l'espèce. La précédente mention régionale date du 6 mai 2020.

### Locustelle lusciniöide

*Locustella luscinioides*, 9 ind. (44 en 5 ans)

Pas de preuves de reproduction cette année, mais des chanteurs et des stationnements sur les sites habituels. C'est la dernière fois que l'espèce, nicheuse régulière depuis une dizaine d'années, est traitée dans cette synthèse annuelle.



- marais du Colombier à Varennes-sur-Seine (77) : 1 chanteur le 16 avril ;
- Saint-Sauveur-les-Bray (77) : 1 chanteur le 13 mai ;
- réserve du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne (77) : 1 chanteur du 13 mai au 22 juillet, nicheur probable vue la durée du stationnement ;
- marais de Larchant (77) : 1 chanteur le 28 avril, puis 2 le 11 mai ;
- étang de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) : 1 chanteur du 24 avril au 3 mai ;
- étangs de Hollande (78) : 1 chanteur le 8 avril ;
- marais de Fontenay-le-Vicomte (91) : 1 chanteur le 3 avril ;
- marais de Misery à Écharcon (91) : 1 chanteur du 9 au 26 avril.

*Pouillot ibérique*,  
Auffreville-Brasseuil  
(78). © C. Alexandre


### Fauvette mélanocéphale

*Curruca melanocephala*, 1 ind.

#### Première mention régionale

Un mâle est découvert le 20 janvier dans un jardin privé en pleine ville de Pontoise (95). Cette fauvette méditerranéenne, réputée sédentaire, est en expansion vers le nord depuis plusieurs décennies, probablement en liaison avec le réchauffement climatique (Issa et Muller, 2015). Son aire de reproduction s'est étendue dans les années 2000 en remontant la vallée du Rhône et de la Saône jusqu'au sud de la Bourgogne. Des individus erratiques se retrouvent parfois aussi loin au nord que la Suède ou l'Écosse. En hiver, l'espèce fréquente souvent les jardins qui offrent un microclimat tempéré et une nourriture abondante.

Fauvette  
mélanocéphale, mâle,  
Pontoise (95).  
© G. Perreau



### Bouvreuil trompetteur

*Pyrrhula pyrrhula*, type *pyrrhula*, 1 ind. (22 en 5 ans)

- Un oiseau est entendu le 1<sup>er</sup> décembre à Nanteuil-les-Meaux (77), site déjà fréquenté l'hiver précédent par cette sous-espèce nordique aux cris particuliers.

### Sizerin flammé

*Acanthis flammea*, 4 ind. (4 en 5 ans)

- Les 4 oiseaux sont enregistrés en forêt de Rambouillet (78) les 22 novembre, 23 novembre (2 ind.) et 2 décembre.

Une dizaine d'autres sizerins n'ont pas pu être déterminés à l'espèce, dans un contexte d'irruption où *flammea* était largement majoritaire sur les sites de halte migratoire en Europe. Le précédent afflux de ce taxon nordique dénommé autrefois « Sizerin boréal » pour le distinguer du Sizerin cabaret remonte à l'hiver 2017-2018. Plus de 300 oiseaux avaient alors stationné dans notre région (Massin, 2019). Il est toutefois à noter que les critères d'identification acoustique de l'espèce, de même que la délimitation entre les différents taxons de sizerins ne font pas consensus et sont susceptibles d'évoluer encore dans un futur proche (Wroza, 2023).

Sizerin flammé, forêt  
de Rambouillet (78).  
Sonagramme  
© J. Rochefort







*Bruant fou, Villiers-sous-Grez (77).*  
© C. Gloria


### Bruant fou

*Emberiza cia*, 1 ind. (1 en 5 ans)

- 1 mâle hivernant est observé à partir du 26 décembre à Villiers-sous-Grez, au sud du massif de Fontainebleau (77).

Peut-être aussi un premier oiseau le 22 novembre à Château-Landon (77), mais les photos floues n'ont pas permis de valider la donnée.

Les précédentes mentions dataient de 2018 et le précédent hivernage de 2012-2013.



### Bruant nain

*Emberiza pusilla*, 1 ind. (1 en 5 ans) -

#### Troisième mention régionale

- 1 oiseau est enregistré le 11 novembre en forêt de Fontainebleau (77).

Le premier enregistrement avait eu lieu en 2008, déjà en forêt de Fontainebleau et un oiseau avait hiverné de décembre 2015 à février 2016 à Achères (78).

### 2022 : Donnée non encore publiée

### Martinet pâle

*Apus pallidus*

- 1 oiseau est retrouvé mort sous une éolienne le 27 octobre à Allainville (78), dans le cadre d'un suivi éolien par un bureau d'étude. La donnée ne nous était pas parvenue.

*Bruant nain, forêt de Fontainebleau (77)*  
Sonagramme.  
© J. Rochefort

Il s'agit du 3<sup>e</sup> ind. formellement identifié lors de l'afflux de l'automne 2022 ayant concerné probablement au moins une dizaine d'oiseaux dans notre région (Massin, 2023).

Indépendamment de cet événement ponctuel lié à des conditions météorologiques particulières, il est intéressant de noter que cette espèce méditerranéenne est en expansion vers le nord et niche depuis peu à Lyon et Besançon (Piqué et Mokuenko, 2023).

## Bibliographie

BARADEZ R. et SÉNÉCAL D. (2023). Une Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* en forêt de Fontainebleau, Seine-et-Marne. *Ornithos*, **30** (2) : 108-110.

BLAT Y., DUBOIS P.J. et DUQUET M. (2023). Afflux d'Océanites culblancs *Oceanodroma leucorhoa* en France à l'automne 2022. *Ornithos*, **30** (1) : 42-50.

ISSA N. et MULLER Y. [coord.] (2015). *Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale*. Delachaux et Niestlé, Paris, 2 vol., 1 408 pages.

LE MARÉCHAL P., LALOI D. et LESAFFRE G. (2013). *Les Oiseaux d'Île-de-France. Nidification, migration, hivernage*. Delachaux et Niestlé, Paris, 512 pages.

MASSIN Y. et le CHR (2019). Afflux exceptionnel de Sizerins flammés *Acanthis flammea* en Île-de-France pendant l'hiver 2017-2018. *Le Passer*, **52** : 18-19.

MASSIN Y. et le CHR (2020). Les oiseaux rares en Île-de-France en 2018. 18<sup>e</sup> rapport du Comité d'homologation régional. *Le Passer*, **53** : 1-17.

MASSIN Y. et le CHR (2021). Les oiseaux rares en Île-de-France en 2020. 20<sup>e</sup> rapport du Comité d'homologation régional. *Le Passer*, **54** : 1-19.

MASSIN Y. (2022). Les oiseaux rares en Île-de-France en 2021 : synthèse des observations de l'année et statistiques décennales. *Le Passer*, **55** : 29-56.

MASSIN Y. (2023). Les oiseaux rares en Île-de-France en 2022. *Le Passer*, **56** : 10-30.

MASSIN Y. et SAVRY M. (2023). Première nidification de l'Aigle botté *Hieraetus pennatus* en Île-de-France. *Le Passer*, **56** : 59-66.

PIQUÉ S. et MOKUENKO N. (2023). Expansion du Martinet pâle *Apus pallidus* vers le nord : après Genève, Lyon et Besançon. *Ornithos*, **30** (6) : 281-296.

WROZA S. (2020). *Identifier les oiseaux migrants par le son*. Delachaux et Niestlé, Paris, 240 pages.

WROZA S. (2023). Une énigme à résoudre : les cris de vol et d'appel des sizerins *Acanthis* sp. *Ornithos*, **30** (6) : 297-301.

### Sources des données citées : liens utiles

Faune IDF, membre du réseau Faune France : [www.faune-iledefrance.org](http://www.faune-iledefrance.org)

GeoNat'îdF, plateforme de l'Agence Régionale de la Biodiversité : <https://geonature.arb-idf.fr/>

## Liste des observateurs ayant fourni des données validées en 2023

Merci à celles et ceux qui ont saisi leurs données sur les plateformes naturalistes ou partagé leurs photos et enregistrements de raretés régionales.

Christophe Alexandre, Christophe Alexandre Lasne, Michel Andrieux, Louis Albesa, Frédéric Arnaboldi, Miguel Arrechea, Viviane Arrechea, Denis Attinault, Thierry Aurissegues, Christophe Balleron, Thierry Bara, Frédéric Baudat, Gérard Baudoin, Guy Bauplé, Pascal Bednarczyk, Othmane Belladjou, Cyril Bellanger, Juliette Béraud, Charles Bertrand, Florent Besson, Thomas Bitsch, Anna Bittighoffer, Martin Blessing, Didier Bodo, Olivier Boissier, Pierre Boissier, Laurence Boîteux, Julien Bottinelli, Christian Boucher, Laurent Bouilleau, Yael Bourgain, Lucille Bourgeais, Sylvie Boyer, Fabien Branger, Christophe Bray, Julien Brière, Aurélie Brisson, Joël Brun, Christophe Bruneaux, Marc Brunel, Mathis Buriasco, Laurent But, Mathieu Cauchois, Benoit Chague, Arnaud Chambon, Stéphane Chambris, Daniel Chantrel-Valat, François Charron, Sandrine Chaurand, Thierry Chaurand, Laurent Chevallier, Sylvain Codarini, Jacques Comolet-Tirman, Jaime Crespo, Arnaud Cuquel, Théo d'Amonville, Timothée d'Abbadie d'Arrast, Bertrand Dallet, Romain Daniélou, Julien Daubignard, Jérôme de Linares, Hugo Debry, Philippe Decressac, Jean-Pierre Delapré, Olivier Delzons, Jean-Luc Déniel, Jacqueline Descotils, Guy Destré, Aurélien Desvilles, Sébastien Detante Brison, Léo Domingues-Haccart, Vincent Dourlens, André Duchemin, Louis Duchesne, Fabrice Ducordeau,

Laurent Dufresne, Jean-Michel Énard, Lilian Encinas, Adrien Ferraz, Valentin Field, Théo Florentin, Olivier Fontaine, Thierry Fournet, Cloé Fraigneau, Benoit Froelich, Tom Gall, Yoann, Lilian et E. Galle, Rémy Ganna, Audrey Garcia, Claudine Gaugoin, Christian Gaudiard, Paul Gilbon, Didier Gilles, Isabelle Giraud, Christian Gloria, Mathieu Goguelet, Julien Gouëllo, Mathieu Gouirand, Éric Grosso, Stéphane Guenneteau, Melvyn Guillot-Jonard, François Hébert, Théo Hervé, Théo Hurtrel, Théo Jean-François, Claire Jolly, Cédric Jouve, Clément Jovené, Rémi Jugieux, Alexandre Kebabjian, Malo et Aurélien Kipman, Antoine Kita, Jean-Luc Kleis, Jean-Christophe Kovacs, Gwendal Kuentz, Arnaud Ladole, Olivier Laporte, Alban Larousse, Nathanaël Lasserre, Aurélie Laurent, Franck Le Bloch, Vincent Le Calvez, Yohan Le Goff, Pierre Le Maréchal, Pascal Le Poulain, Bruno Lebrun, Tristan Lecuyer, Léa Lefrou, Olivier Legros, François Lelièvre, Christian Lenclud, Christian Letourneau, Tanguy Loïs, Gabriel Loiseau, Olivier Mabile, Gaell Mainguy, Daniel Malassingne, Stéphane Mallard, Patrick Malliet, Nicolas Marmet, Andrea Massa, Yves Massin, Gabriel Maubert, Christian Menard, Sylvie Micheneau, Pierre Miguet, Marianne Milliet, Cédric Moisan, Cécile Monin, Thomas Monjoin, Corentin Monmont, Ghislaine Moulin, Raphael Naquin, Emma Olivier, Christiane Oliviéro, Stéphane Ostrowski, Robin Panvert, Laurent Pascual-Le Tallec, Pascal Pelletier, Anatole Perdrizet, Gilbert Perreau, Nicolas Perrot-Ligodières, Max Petitours, Grégory Picard, Baptiste Plana, Olivier Plisson, Nicolas Pluchon, Vincent Ponelle, Alexandre Portmann, Frédéric Pou, Nicolas Pruss, Maxime Rambaud, Philippe Rance, Mathis Richard, Pierre Rivallin, Julien Rochefort, Lucas Roger, Michel Romaggi, David Rosane, Léo Roumieu, Léo Royer, Noah Saleme, Enrique Sans, Joël Savry, Mathis Savry, Mathieu Sebille, Jean-Philippe Siblet, Audrey Signol, David Simpson, Michel Sitterlin, Julien Souville, Arnaud Sponga, Laurent Spriet, Philippe Stoop, Jean-Christophe Talibert, Régis Temperman, Jean-Pierre Thibaud, Antoine Thivolle, Anne-David Thomas, Baptiste Thomin, Stéphane Thomin, David Thorns, Robequain Tilio, Gilles Touratier, Suzanne Tourtignes, Alexandre Verroye, Mikaël Viain, Sylvain Vincent, Oriane Vivin, Guillaume Wetzel, Lukas Witkowski, Stanislas Wroza, Raphaël Zordan, Maxime Zucca.