

Groupe local LPO Vallée de la Marne

SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE 2017 - 1
Période prénuptiale et nidification

MARS 2017 - JUILLET 2017

Observations ornithologiques dans la

Vallée de la Marne

Mars **2017**– Juillet **2017**

Introduction

Encore une fois l'actualité reste marquée par les Laridés, mais pas uniquement du fait du suivi du centre d'enfouissement technique de Charny/Fresnes-sur-Marne où on retiendra néanmoins l'observation du premier Goéland d'Audouin francilien et celle de deux possibles Goélands de la Baltique.

En effet, pas moins de 5 Sternes caugek ont été observées ainsi qu'un Labbe parasite.

Le stationnement d'un Gravelot à collier interrompu et la mention d'une Pie-grièche à tête rousse complètent les « raretés » de cette période.

Coté nicheurs, le site de Villenoy, hélas, c'est officiel, voué à la destruction pour en faire un décharge de déchets inertes, a confirmé son excellente attractivité : outre les passereaux patrimoniaux (Gorgebleues, Phragmites, Locustelles…), 3 couples de grèbes à cou noir, une colonie de Mouettes rieuses en essor, un couple hivernant de Sarcelles d'été, une possible reproduction du Tadorne de Belon… Quelle tristesse. Remercions tous les membres du Groupe local qui se sont battus ainsi que l'association MARNE. Restons mobilisés et si l'action en justice, échoue, tentons d'être associés à la gestion du site compensatoire dépollué voisin.

O. Laporte



Analyse des données brutes

Répartition des données synthétisées selon la source des données

Source	Nombre	%
Cettia	6026	30
Faune-Idf	13741	70
Total	**19767**	

Répartition des données synthétisées selon la commune d'observation : communes les plus prospectées

Commune	Nb de données	Commune	Nb de données
Congis-sur-Thérouanne	2313	Meaux	239
Roissy-en-Brie[1]	2264	Chelles	234
Lesches	2121	Isles-lès-Villenoy	232
Trilbardou	1500	Torcy	228
Luzancy	991	Changis-sur-Marne	175
Jablines	811	Charmentray	162
Neuilly-sur-Marne	647	Émerainville	142
Croissy-Beaubourg	522	Gournay-sur-Marne	121
Bussy-Saint-Georges[2]	503	Gouvernes	119
Annet-sur-Marne	305	Vaires-sur-Marne	108
Villenoy	240	Champs-sur-Marne	105

[1] En fait, les données codées sur Roissy-en-Brie concernent essentiellement l'étang du Coq, à cheval sur Roissy-en-Brie et Pontault-Combault.

[2] Essentiellement en provenance d'un jardin, refuge LPO, suivi au quotidien.

MONOGRAPHIES

Rédaction : G. Passavy, Y. Massin, T. Hervé, O. Laporte, V. Le Calvez

Relecture : O. Laporte, V. Le Calvez

Cygne tuberculé *Cygnus olor* : 431 données, 35 communes

Le plus gros rassemblement est noté à Changis-sur-Marne, au lieu-dit les prés Marchal, avec 40 individus le 15 mars (SCl). D'autres groupes relativement importants sont notés au Grand Voyeux avec 27 individus la 28 mars (RHu), à Trilbardou avec 24 individus le 5 juillet (SPI-CD77), ou encore aux étangs d'Isles-lès-Villenoy avec 20 individus le 31 juillet (VDe).
Nicheur certain. Les indices de nidification certaine les plus précoces sont notés le 20 mars à la passerelle de Gournay-sur-Marne (THe).

Cygne noir *Cygnus atratus* : 5 données, 1 commune

1 individu est observé du 5 mars au 26 mai à la base de Vaires-sur-Marne (ORe *et al.*)

Oie cendrée *Anser anser* : 9 données, 2 communes

Espèce vue seulement au Grand Voyeux et à Trilbardou. Un groupe de 8 sur ce second site le 28 mai (PGu).

Oie à tête barrée *Anser indicus* : 6 données, 4 communes

1 individu observé entre le 5 mars et le 30 mai autour de la base de Vaires-sur-Marne (ORe).

Ouette d'Egypte *Alopochen Aegyptiaca* : 21 données, 3 communes

Un groupe de 3 qui semble s'être déplacé entre Lesches et Trilbardou du 26 mars au 25 mai (TBi *et al.*). Egalement 3 individus (les mêmes ?) à Luzancy le 22 avril (JBo).

Bernache du Canada *Branta canadensis* : 379 données, 32 communes

Les effectifs les plus importants sont notés au Grand Voyeux, avec un maximum de 200 individus le 30 juin (RHu). D'autres groupes importants sont vus à la passerelle de Gournay-sur-Marne le 10 mars avec 45 individus (THe), au parc du Pâtis à Meaux avec 38 individus le 21 mai (FVa), aux Olivettes le 5 juillet avec 94 individus (SPI-CD77), ou encore aux prés du refuge de Lesches avec 48 individus le 29 juillet (PLP).
Nicheur certain. Les indices de nidification certaine les plus précoces sont notés le 31 mars aux prés annelets à Serris (TBa).

Bernache nonnette *Branta leucopsis* : 13 données, 1 commune

Toujours l'individu du Grand Voyeux revu sur toute la période. Il était accompagné d'un deuxième individu le 1er avril (VSi).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : 84 données, 9 communes

Plus de la moitié des données proviennent des prés du refuge à Lesches.
Jusqu'à une vingtaine d'individus sont vus à Trilbardou le 23 avril (AHo).
Nidification probable sur le site de Villenoy où un couple est noté le 28 mai (GPa, SCh) et deux oiseaux de première année, mais déjà bien volants, observés le 22 juillet.

Tadorne de Belon © P. Guitet

Canard mandarin *Aix galericulata* : 76 données, 12 communes

Trois localités accueillent des groupes familiaux et donnent des indices de nidification certaine : le secteur de la passerelle de Gournay-sur-Marne avec 10 individus le 11 mai dont 6 jeunes, puis 14 individus le 6 juin et le 11 juillet dont 9 jeunes (THe), l'étang de Croissy-Beaubourg avec un maximum de 8 individus le 10 mars et 2 jeunes observés le 4 juin (JPD), et l'étang du bois de Célie à Emerainville avec un maximum de 6 individus dont 5 jeunes le 9 mai (LMa).

Canard carolin *Aix sponsa* : 1 donnée, 1 commune

4 individus (2 mâles et 2 femelles) le 12 mars à Bussy-Saint-Georges (ORe).

Canard siffleur *Anas penelope* : 59 données, 9 communes

L'essentiel des effectifs est observé à Luzancy où un maximum de 104 individus est noté le 5 mars (JBo), et au Grand Voyeux où le plus gros groupe comptait 56 individus le 17 mars (RHu).

Le dernier groupe conséquent, composé de 30 individus, est vu au Grand Voyeux le 28 mars (RHu), et l'individu le plus tardif est un mâle observé le 18 mai à la carrière Gosset à Lesches (PDu).

Canard chipeau *Anas strepera* : 138 données, 14 communes

Les plus gros effectifs sont notés au Grand Voyeux avec un maximum d'au moins 70 individus le 19 mars (SCh). Egalement un groupe de 25 à Trilbardou le 2 mars (ALa-CG77) ou encore 15 individus au parc du Pâtis le 23 mars (RHu). A des dates plus avancées, on peut également noter un groupe de 9 à Lesches le 7 juin (TBi) et 10 au Grand Voyeux le 14 juin (RHu). Aucun site n'accueille plus de 10 individus à partir du 4 avril ce qui coïncide avec la fin du passage prénuptial.
Aucun indice de nidification.



Canard colvert *Anas platyrhynchos* : 623 données, 49 communes

Les groupes les plus importants sont observés à Trilbardou, avec un maximum de 81 individus le 31 juillet (ALa-CG77). Egalement un groupe de 47 le 13 juin au parc du Pâtis (SVa) et un autre d'une cinquantaine le 30 juillet au Grand Voyeux (IGi).

Nicheur certain. Les indices de nidification certaine les plus précoces sont notés le 15 avril au Grand Voyeux (JBo).

Canard pilet *Anas Acuta* : 69 données, 9 communes

Les plus gros groupes sont notés aux Olivettes de Trilbardou avec 18 individus le 11 mars (Ola, SBo), puis 23 le lendemain (IGi, JGn), et au Grand Voyeux avec un maximum de 9 individus le 23 mars (RHu).
Le premier groupe est celui observé le 11 mars à Trilbardou. Les derniers individus sont notés le 30 avril au Grand Voyeux (RHu).

Canard souchet *Anas clypeata* : 197 données, 15 communes

Les plus grands groupes sont vus sur le site de Trilbardou avec un maximum à 130 individus le 31 mars (MZu). D'autres rassemblements notables sont observés au Grand Voyeux avec un maximum de 40 individus le 7 avril (RHu), à l'étang d'Isles-lès-Villenoy avec 29 individus le 26 mars (VDe) ou encore à Luzancy avec 25 individus le 2 avril (CGl).
Le pic du passage prénuptial se produit durant la troisième décade de mars.
Après le 27 avril, aucun groupe de plus de 10 individus n'est observé, mais de petits effectifs sont notés durant tout l'été.



Nette rousse *Netta rufina* : 98 données, 5 communes

Le plus gros rassemblement est vu à Jablines où jusqu'à 16 individus sont comptés le 14 mai (PLP) et où la nidification est certaine avec 2 nichées réussies. Egalement un couple noté régulièrement à Trilbardou au printemps.
Jusqu'à 6 individus au Grand Voyeux le 27 juillet en début de période postnuptiale (RHu).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : 117 données, 11 communes

Le plus gros rassemblement est vu à Luzancy avec 34 individus le 5 mars (JBo). On peut également noter un maximum d'au moins 30 oiseaux le 19 mars au Grand Voyeux (SCh) et d'une vingtaine à Lesches le 28 mars (PLP).
Le pic du passage prénuptial se produit durant la deuxième décade de mars.



Sarcelle d'été *Anas querquedula* : 66 données, 11 communes

Les premières migratrices sont vues le 11 mars à Jablines (GMa), à Trilbardou où le groupe observé est le plus gros de la période avec au

moins 13 individus (Ola, SBo) et à Vaires-sur-Marne (SNo).
Aucune donnée entre le 29 mai et le 30 juin, puis de nouveau quelques observations en juillet qui coïncident avec le début de la période postnuptiale.

Fuligule milouin *Aythya ferina* : 232 données, 18 communes

Les plus gros rassemblements sont observés à Trilbardou où jusqu'à 173 individus sont notés le 31 juillet (ALa-CG77). D'autres groupes relativement importants sont vus à l'étang du Coq de Roissy-en-Brie avec un maximum de 82 individus le 4 mars (VLC) et au Grand Voyeux avec 43 individus le 19 juillet (RHu).
Bonne année pour la reproduction de cette espèce dans les boucles de la Marne puisque le Milouin est noté nicheur certain en 4 localités différentes : sur l'étang de Croissy-Beaubourg le 11 juin (JPD), sur l'étang de la Haute Maison à Champs-sur-Marne le 15 juin (TBa), à Villenoy le 29 juin (JBo) et à Jablines le 3 juillet (TBi).
Aucun groupe de plus de 20 individus n'est vu entre la deuxième décade de mars et la deuxième décade de juillet, moment où des rassemblements postnuptiaux commencent à être notés.



Fuligule morillon *Aythya fuligula* : 260 données, 16 communes

Les plus grosses troupes sont vues à Trilbardou où un maximum de 190 individus est observé le 14 mars (SPl-CD77). La plupart des autres gros groupes sont notés à Luzancy avec au maximum 80 individus le 12 mars (JBo), à Jablines où 62 individus sont vus le 6 avril (SVa) ou encore au Grand Voyeux avec 60 individus le 19 mars (SCh).
Bonne année également pour la reproduction du Morillon dont la nidification est certaine à Jablines (PLP), Trilbardou (ALA-CG77) et Villenoy (JBo, GPa) avec 3 nichées notées sur ce dernier site.

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* : 1 donnée, 1 commune

1 mâle (ind. non sauvage) à Noisiel le 25 avril (LMa).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* : 47 données, 4 communes

Entre 1 et 5 individus (3 femelles et 2 mâles) sont vus au Grand Voyeux entre le 6 et le 10 mars (RHu, SCl).

Garrots à œil d'or, Trilbardou © G. Passavy

Espèce observée seulement sur les sites de Trilbardou, de Lesches et du Grand Voyeux, vue à chaque fois à l'unité ou par paire, hormis 3 individus observés au Grand Voyeux le 10 mars (RHu).
Nidification notée probable à Trilbardou où un accouplement est observé le 23 avril (GPa). Le marais voisin de Lesches est favorable…
Dernier individu observé le 28 mai à Lesches (PDu).

Harle piette *Mergellus albellus* : 8 données, 1 commune

Dendrocygne fauve *Dendrocygna bicolor* : 2 données, 2 communes

2 individus observés le 5 mai à l'étang du point d'interrogation de Jablines (PLP) et un individu le 31 juillet au Grand Voyeux (RHu).

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis* : 15 données, 1 commune

1 femelle adulte observée du 1er avril au 15 mai au Grand Voyeux (VSi, JCr *et al.*).

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* : 348 données dans 33 communes

À l'ENS des Olivettes à Trilbardou, 40 nids sont occupés le 3 mars (ALa-CG77), 76 nids le 30 mars (HJu). En période d'envol des juv., l'effectif dénombré, tous âges confondus, est de 290 ind. environ le 8 juin (ALa-CG77), soient des chiffres relativement comparables à l'année précédente.

Butor étoilé *Botaurus stellaris* : 1 données, 1 communes

Dernier hivernant noté le 10 mars à l'étang de Croissy à Croissy-Beaubourg (JPD), à la même date que l'année dernière sur ce site.

Blongios nain *Ixobrychus minutus* : 52 données, 7 communes

Le premier migrateur est noté le 11 mai à Jablines (TCh).

Les indices de nidification et preuves de reproduction sont toujours difficiles à obtenir.

À Annet-sur-Marne, seule une femelle est vue au cours de la saison sur les bords du Grand Lac (PLP). Côté carrière, commune de Jablines, un accouplement est noté à fin juin dans la partie Est de l'étang du téléski (PLP).

À Meaux, une seule donnée d'un mâle le 20 juin (RHu).

À la réserve régionale du Grand Voyeux, reproduction confirmée cette année avec un mâle accompagné de deux jeunes le 27 juillet (RHu). Pas d'indice d'un couple supplémentaire.

A Croissy-Beaubourg, un couple est noté le 11 juin mais sans preuve de nidification cette année (JPD).

A l'étang du Coq à Roissy-en-Brie, la nidification est prouvée cette année avec deux couples et trois jeunes à l'envol le 20 juillet (VLC).

Un individu isolé également noté en bord de Marne à Vaires-sur-Marne le 18 juin (FBa).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : 1 donnée, 1 commune

Le stationnement inédit de quelques individus dans les carrières de Jablines ne s'est hélas pas réitéré cette année…

Un individu photographié le 4 juillet à l'étang du Coq, Roissy-en-Brie, ce qui constitue la première donnée et 189e espèce du site (GLe)…

Grande Aigrette *Casmerodius albus* : 48 données, 10 communes

La Grande Aigrette est présente toute l'année désormais à la réserve naturelle du Grand Voyeux, généralement à l'unité, avec un maximum de 5 le 19 juillet (RHu). Présence également régulière à Lesches où elle est notée tous les mois.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : 68 données, 7 communes

Les sites les plus fréquentés sont toujours le marais de Lesches et la réserve régionale du Grand Voyeux où l'on dénombre l'effectif maximal sur la période : 7 ind. le 31 juillet (RHu).

Héron cendré *Ardea cinerea* : 383 données, 47 communes

Au moins cinq nids occupés le 2 mars à Trilbardou pour 21 individus présents, avec encore 19 individus comptés le 24 mai (ALa).

Au parc du Pâtis à Meaux, au moins huit nids sont occupés le 9 avril, et 8 poussins dénombrés dans quatre nids le 21 avril (SVa).

Pas de comptage à Croissy-Beaubourg où l'espèce se reproduit mais des nids occupés notés le 10 mars (JPD).

Aucune donnée de reproduction notée cette année à Champs-sur-Marne, mais le site semble avoir été peu prospecté…

Héron pourpré *Ardea purpurea* : 6 données, 2 communes

Congis-sur-Thérouanne rassemble toutes les observations de cette espèce, à l'exception d'une donnée migratoire à Neuilly-sur-Marne le 24 avril (OLa).

A Congis, un groupe de trois migrateurs est observé le 9 avril (SCh, VDo), puis deux migrateurs isolés sont notés le 26 avril à quelques minutes d'intervalle (JBo). En estivage, un individu immature est observé le 29 mai puis le 14 juin, en transit pour le premier et se posant dans la réserve pour le second (RHu).

A noter que tous les migrateurs ont été observés le matin, et surtout entre 8h et 9h…

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* : 2 données, 1 commune

Deux individus (!) ont été découverts ensemble le 19 mai à Jablines, sur les berges de l'étang des mouettes (PLe). Un seul sera revu le lendemain, puis aucun le jour suivant.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : 56 données, 11 communes

A nouveau notée sur toute la période. Peu de gros groupes, un maximum de 17 en migration le 5 mars à Luzancy (JBo). Les cigognes en stationnement sont le plus souvent notées à la décharge de Fresnes-sur-Marne, avec un maximum de 18 le 30 mai (TCh), ainsi qu'à Lesches, avec 12 individus le 3 juin dont une baguée, mais dont l'origine de la bague n'a pu être retrouvée (OLa).

Spatule blanche : 3 données, 2 communes.

Spatule blanche, marais de Lesches © O. Laporte

Un adulte avec une bague (mais non lisible) est découvert le 20 mai à l'aube aux prés du refuge, à Lesches (OLa).

Un oiseau de première année est ensuite noté à Congis-sur-Thérouanne les 25 et 27 juillet (RHu).

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* : 249 données, 20 communes

Au printemps, les effectifs maximaux concernent encore une fois des hivernants tardifs, avec une exception en été où un maximum de 14 est observé sur les bassins de Villenoy le 22 juillet (GPa).

Des indices de nidification certains sont notés sur les communes de : Jablines, Neuilly-sur-Marne, Roissy-en-Brie, Trilbardou, Villenoy.

A Roissy-en-Brie, il s'agit de la première nidification certaine depuis 5 ans. Aucun indice de nidification certaine n'a par contre été noté cette année à Congis-sur-Thérouanne, site classique pour l'espèce.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* : 528 données, 23 communes

De gros effectifs allant de 30 à 50 individus sont notés sur toute la période à Trilbardou, avec un maximum de 85 ind. dont 80 adultes le 31 juillet (ALa). Egalement 47 notés le 28 mars à Congis-sur-Thérouanne.

Nicheur certain sur 17 communes cette année.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : 44 données, 8 communes

Quelques petits groupes de migrateurs stationnent sur nos plans d'eau principalement entre mars et avril, la plupart des sites accueillant de 4 à 6 individus.

Cette année la reproduction n'a pas pu être prouvée à Congis-sur-Thérouanne, où un couple a pourtant été observé paradant le 9 avril (SCh, VDo).

Sur les bassins de Villenoy, qui sont maintenant un site classique de reproduction pour cette espèce, jusqu'à 25 individus sont observés le 29 juin (JBo), et au moins trois couples nicheurs sont notés au cours du mois de mai, produisant un minimum de 11 jeunes toujours présents le 22 juillet (GPa). A noter que l'arrivée sur site est tardive, car seuls quelques individus sont notés jusqu'à fin avril.

En ce qui concerne l'avenir du site, la partie est mal engagée, la préfète ayant autorisé l'exploitation du centre de recyclage de granulats et de stockage de déchets. Plusieurs recours sont en cours côté LPO et associations de riverains locales.

Râle d'eau *Rallus aquaticus* : 42 données, 6 communes

Reproduction notée à Congis-sur-Thérouanne le 30 juin avec 3 juv, famille revue les 6 et 13 juillet (RHu, THe). Peu voire pas d'autres indices ! Inquiétant.

Marouette ponctuée *Porzana porzana* : 1 donnée, 1 commune

1 ad. le 8 mai à Congis (SCh).

Grue cendrée *Grus grus* : 10 données, 2 communes

Passage marqué le 3 mars avec notamment 120 ind. en marge de la zone à Crécy-la-Chapelle (NDe) et 30 à Congis-sur-Thérouanne (CPa). Le passage se tarit la dernière décade de mars.

En dehors de la fenêtre de passage massif, 3 ind. font halte à Luzancy le 16 avril (TRo) et 1 ind. isolé fait halte tardivement, le 10 mai à Congis-sur-Thérouanne (jBo).

Vautour fauve *Gyps fulvus* : 1 donnée, 1 commune.

(En marge de la zone d'étude, pour le plaisir)

Un groupe exceptionnel photographié depuis un avion au-dessus de Mouroux par Rémi Bourgin, *fide* JF Magne.

Rémi BOURGIN est pilote de planeur et samedi 10 juin il s'est retrouvé dans une ascendance un peu à l'Ouest de Coulommiers (Coordonnées GPS : 48°49'21.3"N 3°04'12.0"E) avec au moins 79 vautours. « Lorsqu'on a vu la nuée d'oiseaux on s'est dirigé vers elle. On est arrivé au 1/3 bas de la colonne d'oiseaux en spirale peu organisée (ça tournait un peu dans tous les sens) à environ 950m d'altitude. Ne souhaitant pas percuter un oiseau on a décidé de tourner autour d'eux. En deux tours de spirale on était dépassé, c'est là où j'ai pris les photos. (…). Mais je n'imaginais pas rencontrer cet oiseau là en Seine et Marne. Je me suis arrêté de monter à 1050m

(Réglementation), mais j'ai continué d'observer le groupe d'oiseaux. Ils sont encore montés de quelques centaines de mètres puis sont partis en transition vers le Nord Nord-Ouest (direction Nord de Meaux) Puis on les a perdu de vue...»

Vautour moine *Aegypius monachus* : 1 donnée, 1 commune.

Première mention francilienne : dans le groupe de vautours, un zoom montre la présence d'un individu plus sombres, aux ailes plus larges (RBo, identifié par SWr).

Vautours fauves et Vautour moine © Rémi Bourguin

Bondrée apivore *Pernis apivorus* : 42 données, 21 communes

Premier migrateur le 1er mai à Luzancy (JBo). Pas de groupe notable en migration active cette année. Seul indice de reproduction : un couple le 10 juillet à Jablines (PLP).

Milan noir *Milvus migrans* : 314 données, 34 communes

Le premier de la saison est vu le 15 mars à Isles-lès-Villenoy (JBo). De grands groupes sont observés en migration active et en dortoirs au printemps : jusqu'à 17 le 29 avril et encore 15 le 26 mai à Fresnes-sur-Marne (BDa et TCh), 24 à Annet-sur-Marne le 20 mai (OLa) et au moins 41 le même jour à Tancrou (SBo) ! Ce dernier effectif constitue un record pour l'Île-de-France. La plupart des autres données proviennent de la zone de reproduction habituelle : Congis-sur-Thérouanne, Lesches et Jablines-Trilbardou. Des parades sont observées dès le 18 mars à Lesches (TBi). La nidification est prouvée à Trilbardou à l'ENS des Olivettes, avec des couvaisons le 18 mai (OLa et PLP) et 2 poussins au nid le 24 mai, revus volants le 5 juillet (SPl-CD77).

Milan royal *Milvus milvus* : 3 données, 3 communes

Trois individus isolés en migration active : 1 le 19 mars à Congis-sur-Thérouanne (VDo et SCh), 1 le 21 avril à Meaux (SVa) et 1 le 4 juin à Noisiel (DJL), date bien tardive pour l'espèce.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : 103 données, 11 communes

La quasi-totalité des observations concernent les sites de nidification de Congis-sur-Thérouanne et Jablines.

À Congis-sur-Thérouanne, le premier mâle arrive le 13 mars (SCl) et la première femelle 4 jours plus tard (RHu). Jusqu'à 6 oiseaux sont vus ensemble le 1er avril (RHu). Deux couples fréquentent ensuite le site, dont un se reproduit pour la 8e année consécutive dans la roselière de la Bougrandeuse. Des transports de matériaux sont observés dès le 10 avril et des passages de proies entre le 24 avril et le 6 juin. Toutefois aucun oiseau n'est revu après le 17 juin (SCl) : échec de la nichée cette année ?

À Jablines, second site de reproduction dans la zone d'étude, une femelle est aperçue dès le 25 mars (DLi) et un mâle à partir du 28 (LBo). Le couple construit un nid et l'occupe. Un passage de proie est observé le 10 juin (PLP). Un 2e mâle est de passage sur le site le 24 avril (SRo).

À Trilbardou, où un couple s'était reproduit l'année précédente, seul un mâle est observé cette année. Il y occupe son territoire pendant toute la saison mais aucune preuve de nidification n'est notée, malgré la présence épisodique de deux femelles à Lesches, non loin de là.

Les autres observations de l'espèce concernent des migrateurs isolés de passage, entre fin mars et début mai. Une donnée du 2 juillet à Trocy-en-Multien se rapporte très probablement à l'un des oiseaux de Congis-sur-Thérouanne (RHu).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* : 13 données, 9 communes

Des couples possibles sont signalés à Jablines (LBo et SRo), à Chambris (SVa) et surtout à Ussy-sur-Marne, en pleine période de nidification le 10 mai (JBo).

Autour des palombes *Accipiter gentilis* : 1 donnée, 1 commune

Une femelle se perche sur un arbre le 22 avril à Coupvray (PDu). La date est compatible avec le passage printanier.

Buse variable *Buteo buteo* : 332 données, 61 communes

Maximum de 6 oiseaux le 16 mars à Lesches (JPD). Des parades en vol sont notées sur plusieurs sites et un accouplement est observé sur un pylône le 18 avril à Lesches (PDu)… mais toujours aucun nid découvert ! Décidément, les ornithologues s'intéressent toujours aussi peu aux milieux forestiers en période estivale.

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* : 7 données, 5 communes

Observé à l'unité à des dates classiques, entre le 26 mars et le 11 mai à Annet-sur-Marne, Charmentray, Congis-sur-Thérouanne, Lesches et Trilbardou. Aucun stationnement remarquable cette année.

Œdicnème criard, Vignely © O. Hépiègne

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* 114 données, 12 communes

Nombre de données et communes comparable à 2016.

L'arrivée des premiers chanteurs est notée tardivement, le 18 mars aussi bien à Précy-sur-Marne qu'à Trilbardou (OLa).

Estimation des nicheurs (pas d'inventaire protocolé cette année):

- Précy-sur-Marne : 1-2 couples
- Vignely : > 1 couple avec 2 poussins le 14 mai (MMa) à l'écluse, 1 couple entre village et Marne ;
- Villenoy : 1 couple ;
- Isles-les-Villenoy : 1 couple ;
- Trilbardou : 2 coté Olivettes, >3 couples coté marais du refuge ;
- Jablines : 1 couple vers le centre équestre (varenne) ;
- Changis-sur-Marne : > 2 couple (très peu, 2 anciens sites sans contact, beaucoup de dérangements) ;

- Isles-les-meldeuses > 1 couple, non dénombré ;
- Congis-sur-Thérouanne: 1 couple avec 2 juv. le 30 juin (AVEN) ;
- Luzancy : présent sur nouveau secteur favorable.

Bilan : pas de chiffrage fiable. Minimum 16 couples dénombrés, en deça de la réalité mais statut toujours préoccupant même si les sites principaux sont occupés.

Avocette élégante *Recurvirostra avocetta* 16 données, 3 communes

Un seul groupe en halte au mois de mars : 17 le 15 mars à Lesches (PDu, JBo). Le passage se fait plus marqué en avril : 4 le 15 avril (PDu, OLa) ; 10 le 22 avril à Luzancy (JBo) et 3 le même jour et le lendemain à Trilbardou (TVi). 2 ind. (du groupe précédent) sont observés à Lesches ce 23 avril.

Fin du passage le 26 avril à Luzancy avec un ind. en halte (JBo).

Echasse blanche © Daniel Malassingne

Echasse blanche *Himantopus himantopus* : 17 données, 7 communes

Premier ind. dans le 11 avril à Charmentray (SPl) ;

Egalement 1 ad. le 27 avril aux bassins de Villenoy.

Du passage en mai aussi avec un max de 3 ind. en vol à Claye-Souilly (SDe), et 2 ind. le 20 lors des dernières rencontres ornithologiques de printemps du CORIF (OLa, FMa, AdB, PRa).

Œdicnèmes criard avec poussin, Trilbardou © O. Hépiègne

Dernier passage le 14 juin à Trilbardou (TBi).

Vanneau huppé *Vanellus gregarius* 270 données 22 communes

La reproduction n'est rapportée de manière certaine qu'au marais du refuge à Lesches (3 poussins min. observés, PDu, SBo *et al.*), et à Jablines dans un champ à l'est de la base de loisirs (3 couveurs, OLa) ce qui est peu.

Toutefois la preuve de nidification – le plus souvent par l'observation de poussins- est difficile à obtenir. Les sites de Villenoy, Précy-sur-Marne et Luzancy mais aussi Villeneuve-le-Comte semble aussi être occupés par des nicheurs potentiels avec des comportements nuptiaux durant la période favorable (mai, juin). Un inventaire plus fin serait à mener, le secteur de Précy-sur-Marne ayant par ex. été peu prospecté en mai-juin.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* : 1 donnée, 1 commune

1 le 29 avril à Congis-sur-Thérouanne (THu).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* : 3 données, 3 communes

Quelques groupes fréquentent encore les parcelles agricoles début mars avec pour max. de 100 le 9 à Quincy-Voisins (RMu).

Gravelot à collier interrompu *Charardius alexandrinus* : 7 données, 1 commune

Une donnée rarissime dans notre région que ce Gravelot à collier interrompu découvert le 16 mai (JGn). Il restera sur le pré du refuge jusqu'au 18 mai au moins. Le dernier visiteur de cette espèce datait de 1986 - selon faune-idf !

Gravelot à collier interrompu, Lesches © J. Gnanou

Petit gravelot *Charadrius dubius* : 207 données, 18 communes

Le premier pointe son bec le 11 mars à Lesches (OLa).

7 ind. sont vus à la réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux le 19 mars.

Une bonne année pour le passage.

La nidification est avérée Isles-les-Villenoy (PRiv).

Probable à Serris, Lesches, Congis, et en marge : Mitry/Tremblay, Compans.

Petit gravelot, Jablines © P. Le Poulain

Grand gravelot *Charadrius hiaticula* : 39 données, 5 communes

Le passage s'étire du 28 mars à Lesches (PlP) au 10 juin sur ce même site, qui concentre l'essentiel des observations.

Sites secondaires : Luzancy, Jablines avec 1 ind. à Jablines du 26 au 28 avril (LBo, TCh…).

Jusqu'à 5 ind. le 31 mars.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* : 10 données, 4 communes

Le gros du passage à la mi-avril, avec notamment 9 ind. en vol le 14 avril mais aussi 2 le même jour à Luzancy (JBo). Egalement 1 le 23 à Trilbardou (AHo) et 1 du 24 et 28 avrilà Congis-sur-Thérouanne (RHu, JBo).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* : 140 données, 14 communes

Un individu précoce le 12 mars (JGn) puis le passage prénuptial s'étend du 10 avril à Congis-sur-Thérouanne (RHu – AVEN) au 29 mai toujours sur la réserve.

Max. de 16 ind. De 3 mai sur ce même site.

Les premiers retours ont lieu comme habituellement en juillet : 2 le 2 juillet à Luzancy (JBo) mais aussi 1 ind. de première année le 19 juillet à Lesches (TBi).

Chevalier arlequin *Tringa totanus* 21 données, 6 communes

Un passage bien marqué ce printemps, entre le 11 avril à Lesches (PDu) et le 27 mai à Trilbardou (ALa, PDu, AKi, ALa-CD77). Egalement une mention tardive d'un ind. criant au crépuscule aux Olivettes le 27 mai (MZu).

Max de 3 ind. le 23 avril à Trilbardou.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* : 128 données, 20 communes

Présence en continu mais logiquement absent entre le 10 et le 29 mai entre les deux passages migratoires (3 données en mai seulement).

Max de 11 le 27 juin à Luzancy (JBo).

Chevalier gambette *Tringa erythropus* :115 données, 13 communes

Le passage débute le WE du 10 mars à Congis-sur-Thérouanne (RHu) et Trilbardou (OLa).

Maxima de 22 le 8 mai à Lesches (TBi), 20 le même jour à Congis-sur-Thérouanne (SCh), et de 19 le 23 avril à Luzancy (TRo).

Le passage reprend le 2 juillet (JBo). Dernier de la période le 15 juillet à la Haute-île, sur un site où il est rare (OHe).

Chevalier sylvain © P. Guitet

Chevalier sylvain *Tringa glareola* : 44 données, 6 communes

Le passage s'étire du 9 avril (SCh) et le 10 mai (THe, JBo) et reprend le 27 juin (JBo) dans le sens inverse… Max de 4 ind. le 6 mai (PGu).

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* : 204 données, 22 communes

Deux aventuriers les 12 et 14 mars respectivement à Lesches et Trilbardou (PGu, SPl), puis le gros du passage début le 31 mars (RHu).

Max. de 20 le 8 mai à Trilbardou (JBo).

Rare en juin (seulement 1 donnée le 17), juillet voit les migrateurs revenir avec 14 ind. le 22 à Villenoy (GPa).

Barge à queue noire : 7 données, 3 communes

3 ind. Le 15 mars à Lesches ouvrent la saison de migration pour l'espèce. L'essentiel des observations se concentrent avant la première décade d'avril mais toutefois un « retardataire » est noté le 28 avril à Congis-sur-Thérouanne (RHu).

Le 27 juin, un ind. est peut-être déjà sur le retour aux prés de Courtaron à Luzancy (JBo).

Tournepierre à collier *Arenaria interpres* : 1 donnée, 1 commune

1 ind. le 7 mai à Trilbardou (TVi).

Bécasseau de Temminck 2 données, 1 commune

1 ind. du 8 au 9 mai au marais du Refuge à Lesches (TBi, PLP, PDu, JPD).

Bécasseau minute 7 données, 1 commune

3 ind. Le 8 mai à Lesches (TBi, PRa, PGu, SCh, PlP), encore 2 le lendemain. Noté également le 16 mai, un individu différent ?

Bécasseau sanderling *Calidris alba* : 4 données, 2 communes

1 le 26 avril à Jablines (PLP), 1 autre le 8 mai sur la même plage (VDo, SCh).

1 le 14 mai à Lesches en compagnie d'un Grand gravelot : ambiance de bord de plage…

Bécasseau sanderling, Jablines © Sorlin Chanel

Bécasseau minute *Calidris minutus* : 7 données, 1 commune

Jusqu'à 3 ind. en halte migratoire au mois de mai : 3 le 8 mai (TBi, SCh, PRa, PlP, PGu) , 2 le lendemain, et encore 1 le 16 mai (PDu).

Bécasseau variable *Calidris alpina* : 33 données, 4 communes

Le passage débute le 11 mars avec 2 ind. (OLa, SBo) puis s'intensifie le 18 et 19 mars à Congis-sur-Thérouanne avec 6 ind. (DMa, SCh, VDo).

Luzancy et Trilbardou accueillent quelques individus jusqu'au 24 mai, date constatée de la fin du passage postnuptial dans la vallée.

Bécasse des bois : 8 données, 8 communes

La mention d'un mâle chanteur en vol le 20 mai à Moussy-le-Neuf (PPi) apporte un indice

Colonie de Villenoy : Mouette rieuse et Grèbe à cou noir © O. Laporte

exceptionnel de nidification en limite de notre secteur.

Au mois de mars, à des dates plus classiques, une belle série d'observations pouvant concerner des migrateurs : 1 le 8 mars à Guérard (BPi), 1 le 12 mars à Ferrières (LVi), 1 le 14 mars à Lesches (SPl), 1 le 16 mars à Boissy-saint-Léger (VLi), 1 le 17 mars à Othis (RHu), 1 le 19 mars à Lésigny (RPr).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* : 63 données, 14 communes

Luzancy accueille un rassemblement remarquable au début du printemps avec 52 ind. le 20 mars (JBo).

La mention d'un individu dérangé à Lesches le 26 juin est intéressante car les mentions en juin sont rares (PDu). Le passage postnuptial ou le passage d'ind. erratiques est détecté les 13 et 27 juillet à Congis-sur-Thérouanne (THe, RHu).

Bécassine sourde *Lymnocryptes minimus* 3 données, 2 communes

La halte migratoire de l'espèce est bien détectée grâce à Julien B. avec 8 ind. Le 12 mars à Luzancy, 4 ind. le 15 mars à Isles-lès-Villenoy et encore 3 ind. le 20 mars à Luzancy.

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* : 385 données, 45 communes

Des colonies reproductrices sur 6 sites cette année. A noter une augmentation du nombre de couveurs sur la colonie de Villenoy, qui produiront une trentaine de poussins (JBo). La plus grosse colonie reste celle de Changis, qui ne compte pas moins de 300 couples (OLa).

Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus : 137 données, 21 communes

Malgré de nombreux contacts au printemps et à l'été, aucune reproduction n'a pu être prouvée cette année dans les boucles de Marne. Maximum de 53 parmi les rieuses à Congis-sur-Thérouanne le 28 mars (RHu), mais la colonie est désertée le 7 avril, pour une raison inconnue… Une première mention pour l'Étang de Croissy le 23 mars (JDe) et un nombre record de 10 adultes posées à Luzancy le 18 mars, où une possible hybride rieuse x mélano a également été observée en train de couver parmi les rieuses, du 12 mai au 3 juin au moins (JBo).

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* : 42 données, 10 communes

L'année 2017 a été marquée par un passage printanier exceptionnel de mouettes pygmées en Île-de-France, avec plusieurs gros groupes notés du 22 au 24 avril, constitués très majoritairement d'adultes. Un maximum de 46 adultes à Luzancy le 22 avril (JBo), et 35 ind. dont 33 adultes et deux 2A à Trilbardou les 22 et 23 avril (JPD, THe, GPa, SCh). Encore 9 le 27 avril (ALa-CG77) à cet endroit.

Goéland argenté *Larus argentatus* : 12, données, 7 communes

Suite à l'analyse des populations de goélands en dortoir, la présence de gros groupes de ce goéland en nord Seine-et-Marne a fait l'objet de vérifications. Il s'avère que le Goéland argenté est beaucoup plus rare en printemps et en été que ce qui était précédemment envisagé. En dehors des quelques données douteuses, il n'est contacté qu'à l'unité et à une dizaine de reprises !

Goéland leucophée *Larus michahellis* : 74 données, 12 communes

Les plus gros stationnements printaniers et estivaux sont notés encore une fois dans la zone de Lesches et Trilbardou, où jusqu'à 450 sont observés au dortoir à Lesches le 17 mai (PDu, JBo).

Goéland pontique *Larus cachinnans* : 17 données, 4 communes

Le suivi régulier des laridés de la décharge de Charny a permis de mettre en évidence la présence régulière de cette espèce en hiver, mais également jusqu'à fin mai pour les derniers individus, le tout dernier étant noté le 1er juin (TCh).

Sur la période, tous sont observés sur la décharge ou les plans d'eau immédiatement adjacents (Lesches et Trilbardou), et comme on aurait pu s'y attendre, aucun adulte n'a été recensé, ces derniers partant plus tôt vers les sites de reproduction. Maximum de 5 le 11 mai (TCh) à Charny.

Goéland d'Audouin © T. Chansac

Quatre lectures de bagues : 1 ind. polonais et jusqu'à trois ind. allemands.

Goéland d'Audouin *Larus audouinii* : 1 donnée, 1 commune

Donnée tout à fait exceptionnelle puisqu'il s'agit d'une première régionale (validé CHR). L'oiseau, un ind. de troisième année, a été découvert le 24 mai au centre d'enfouissement de Fresnes-Charny, un site

qui devient décidément un classique pour les goélands rares!

Goéland brun *Larus fuscus*: 43 données, 11 communes

Les effectifs chutent dès la mi-mars, et par la suite les bruns ne s'observent plus qu'à l'unité, à l'exception notable d'un groupe de 150 à Lesches (JPD, VLC) le 15 mai.

Goéland de la Baltique probable © T. Chansac

Goéland de la Baltique *Larus fuscus fuscus*: 1 donnée, 1 commune

Deux possibles candidats observés sur la décharge de Fresnes-Charny le 22 mai (TCh), dont la mue était extrêmement avancée pour des « *intermedius* ».

Cependant en l'état actuel des connaissances il n'est pas possible d'exclure complètement cette dernière sous-espèce à cette période de l'année.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus*: 1 donnée, 1 commune

Un individu de deuxième année vu et photographié en vol à Trilbardou le 23 juin (SHo). Il s'agit de la première observation de cette espèce au mois de juin en Ile-de-France (validé CHR).



Labbe parasite, Trilbardou © S. Houpert

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : 446 données, 37 communes

Des colonies reproductrices sur neuf sites cette année, les plus grandes à Trilbardou, Luzancy, Meaux et Roissy-en-Brie, à l'étang du Coq, où plus de 16 jeunes sont nés en deux générations, les derniers vers début juin (VLC). Au parc de la Haute-Ile à Neuilly-sur-Marne, la ponte du seul couple présent a été victime d'une attaque coordonnée de 25 corneilles noires, et au moins un œuf a été prédaté… Aucun poussin observé par la suite.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis* : 1 donnée, 1 commune

Observation de 5 individus parmi des rieuses le 10 mai à Luzancy (THe). Il s'agit du plus gros groupe observé en Ile-de-France (validé CHR).

Sterne naine *Sternula albifrons* : 1 données, 1 commune

Au moins trois sternes naines survolent l'étang du Coq le 26 mai (CBr).

Guifette noire *Chlidonias niger* : 36 données, 6 communes

Deux gros groupes sont notés cette année au passage prénuptial, 20 le 25 avril à Jablines (SRo) et 23 le même jour à l'étang du Coq

(VLC, TBa, GBa). Effectifs remarquable au niveau régional ! La dernière est observée le 17 juin à Congis-sur-Thérouanne (RHu).

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* : 6 données, 2 communes

Les seules guifettes moustac cette année ont été vues à Jablines, un individu les 28-29 avril (SRo, PGu, PLP) puis deux le 11 mai (TCh), et à Congis-sur-Thérouanne avec un individu le 11 mai (RHu) puis 4 le 17 mai (THe).

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* 150 données, 22 communes

Premier chanteur le 14 avril à Congis-sur-Thérouanne (SCl).

Coucou gris *Cuculus canorus* : 160 données, 43 communes

Premier chanteur le 31 mars à Congis-sur-Thérouanne (LBo).

Effraie des clochers *Tyto alba* : 10 données, 5 communes

Une nidification est prouvée au château de Montigny à Lesches, avec un adulte accompagné d'un jeune le 12 juillet (PDu).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* : 6 données, 3 communes

Cette année encore, un chanteur est entendu à Tancrou début mars (RHu et MDe). Également un chanteur à Cocherel le 2 mars (RHu et MDe) et un oiseau cantonné les 11 mars et 20 mai à Villeroy (OLa).

Chouette hulotte *Strix aluco* : 11 données, 11 communes

Pas de preuves de reproduction cette année : uniquement des contacts sporadiques, des chants de mâles et des cris d'oiseaux isolés.

Hibou moyen-duc *Asio otus* : 8 données, 4 communes

Des reproductions sont prouvées cette année sur 3 sites, classiquement détectées en juin lorsque les juvéniles se signalent par leurs cris : un adulte accompagné d'un jeune le 7 à Lesches (TBi), 4 juvéniles à Roissy-en-Brie le 10 (VLC) et un couple avec un jeune à Jablines le 19 (PDu).

Huppe fasciée *Upupa epops* : 1 donnée, 1 commune

Un individu au vol en provenance du stade de Neuilly-Plaisance vers la Marne, en début de matinée du 21 mai (FLb).

Martin-pêcheur d'Europe *Aceldo athis* : 117 données, 22 communes

Seuls indices de nidification à Congis-sur-Thérouanne (SCh).

Pic noir *Drycopus martius* : 70 données, 22 communes

Pas d'observation marquante.

Pic mar *Dendrocopos medius* : 30 données, 13 communes

Pas d'indice de reproduction élevé. Nicheur probable à Croissy-Beaubourg (JPD, VLC), Germiny-l'Evêque (JBo).



Pic mar © O. Laporte

Pic épeichette *Dendrocopus minor* : données, communes

A peine plus commun que le Pic mar… Surtout noté à l'étang du Coq (50% des données).

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* : 2 données, 2 communes

1 migrateur de passage le 3 mai à Lesches (SBo) et le 2 juin à Jablines (AVa), une date étonnante.

Faucon hobereau *Falco subbuteo* : 163 donnée, 36 communes

Premier migrateur noté le 15 avril à Congis et aussi à Luzancy (JBo).

Reproduction tardive pour cette espèce, pas d'indice plus forts que la présence régulière de 2 individus sur la période de la synthèse (mars juillet).

Faucon émerillon *Falco columbarius* : 1 donnée, 1 commune

1 à Luzancy le 1er mai (JBo).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : 8 données, 6 communes

Quelques ind. en migration ou erratisme hivernal. Les observations à Lesches et Jablines, toujours récurrentes depuis quelques années…

Pas de nouvelles données pour le secteur de Champigny-sur-Marne où les signes d'une installation sont toujours recherchés (AFe).

Perruche à collier *Psittacula krameri* : 350 données, 45 communes

Pas d'observation marquante. Deux couples nicheurs probables à Croissy-Beaubourg (JPD).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : 346 données, 51 communes

Premier individu de la saison observé le 12 mars à La Ferté-sous-Jouarre (JBo).
Les groupes les plus nombreux sont vus à Luzancy où un maximum de 500 individus est vu le 17 avril et le 8 mai (JBo).
Notée nicheuse certaine sur 4 communes seulement : à Roissy-en-Brie le 21 mai (VLC), à Villeroy et Trilbardou le 25 mai (VLC), à Croissy-Beaubourg le 11 juin (JPD).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* : 170 données, 44 communes

Premiers individus vus à Congis-sur-Thérouanne le 31 mars (LBo).
Le plus gros effectif noté est de 150 individus le 8 mai à Luzancy (JBo).
Nicheur certain.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* : 126 données, 18 communes

La première est vue le 30 mars à Jablines (LBo, SRo).

Rassemblement maximal observé le 1er mai à Luzancy où un groupe d'environ 200 individus est observé.

Nidification certaine à Méry-sur-Marne où 4 trous sont notés dans une toute petite falaise le 20 mai (FMa), et probable à Changis-sur-Marne où une soixantaine de couples sont vus transportant du matériel pour la construction de leur nid le 29 avril (OLa).

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* : 35 données, 5 communes

La grande majorité des données provient du site de Lesches (28) où une trentaine d'individus sont vus les 18 et 26 mars (TBi).

Les derniers individus sont d'ailleurs observés sur ce site le 4 avril (TBi).

Pipit des arbres *Anthus trivialis* : 10 données, 8 communes

Premier oiseau le 8 avril à Croissy-Beaubourg (VLC).
Aucun signe de nidification probable ou certaine.
L'espèce n'est pas revue après le 17 juin sur la période traitée ici.

Pipit farlouse *Anthus pratensis* : 46 données, 10 communes

Un groupe d'une centaine d'individus est vu à Trilbardou le 4 avril durant le passage prénuptial (JGn).

L'espèce est nicheuse probable à Luzancy où un oiseau chanteur est entendu régulièrement (CGl, JBo).

Bergeronnette grise *Motacilla alba* : 350 données, 41 communes

Effectifs les plus élevés : une quinzaine le 22 mars à la base de Torcy (Thu), et 15 le 19 juillet puis 20 le 27 juillet sur l'ensemble du Grand Voyeux (RHu).
Nicheur certain.

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* : 2 données, 1 commune

Deux données relativement tardives provenant de la base de Jablines : 1 femelle le 27 avril aux sablières (JGn) et un groupe de 4 individus à l'étang du point d'interrogation le 14 mai (Thu).

Bergeronnette nordique *Motacilla flava thunbergi* : 1 donnée, 1 commune

Un individu mâle le 8 mai aux Olivettes de Trilbardou se posant quelques instants et repartant aussitôt (SCh). Date de l'observation qui concorde parfaitement avec ce qui est connu du passage de l'espèce dans la région.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : 135 données, 24 communes

Bergeronnette printanière © J. Gnanou

Premier individu noté le 1er avril au Grand Voyeux (VSi).
Effectif le plus élevé : un groupe de 15 en halte migratoire aux Olivettes le 20 avril se nourrissant devant l'observatoire (ALa-CG77).
Passage prénuptial très marqué avec un pic dans la troisième décade d'avril. Aucune donnée en juillet.
Nicheur certain.



Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* : 92 données, 28 communes

Nicheur certain.

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* : 223 données, 33 communes

Le premier individu, assez précoce, est noté le 31 mars à Meaux (RHu).
Un maximum de 10 au Grand Voyeux lors du passage prénuptial, le 29 avril (THu).
Nicheur certain au Grand Voyeux (THe) et à Lesches (PDu).

Gorgebleue à miroir © O. Hépiègne

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : 92 données, 9 communes

L'essentiel des données (71) provient du Grand Voyeux, mais l'espcèe se reproduit sur plusieurs sites.
Le premier individu est observé le 12 mars à l'étang du Coq (VLC).
Nicheur certain à l'étang de Précy-sur-Marne (OLa, PLP) et au Grand Voyeux (RHu), nicheur probable à Changis-sur-Marne (OLa), Villenoy (OLa) et Trilbardou (OLa). 1 chanteur est également noté à Coupvray le 14 avril (PDu), et un mâle est vu le 27 avril à la base de loisirs de Torcy (BLe, AKi).

Gorgebleue à miroir nicheuse, Précy-sur-Marne © O. Laporte

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : 10 données, 20 communes

Le premier individu de l'année est vu le 9 avril à Meaux (SVa).
Reproduction certaine à Saâcy-sur-Marne où un nourrissage est observé le 20 mai (SBo) et au parc du Pâtis où un adulte est vu approvisionnant deux jeunes le 13 juin (SVa).

Tarier des prés *Saxicola rubetra* : 4 données, 2 communes

4 données durant la migration prénuptiale : 1 à Luzancy le 15 avril et le 5 mai (JBo) et 1 l'étang du Coq le 23 avril (VLC) et le 1er mai (ALa).

Tarier pâtre *Saxicola rubicola* : 226 données, 23 communes

Un maximum de 10 sur un même site en halte migratoire, à Lesches le 18 mars (TBi).
Nicheur certain à Lesches (OLa), à Précy-sur-Marne (OLa), à Villevaudé (THu), à Bussy-Saint-Georges (DGo), et à Villenoy (GPa).

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* : 11 données, 7 communes

Toutes des données de passage prénuptial, s'étalant du 22 avril (JBo) au 23 mai (OHé).

Merle à plastron *Turdus torquatus* : 4 données, 3 communes

4 données durant la migration prénuptiale : 1 le 14 avril au Pin (AGu), 1 le 22 avril à Luzancy (JBo), et 2 le même jour à l'étang du Coq (VLC), et 1 le 28 avril au lieu-dit Le pommerot à Roissy-en-Brie (VLC).

Grive draine *Turdus viscivorus* : 20 données, 10 communes

Notée nicheuse probable au Bois de l'Ermitage à Luzancy où un couple est observé le 20 mai (PRa).

Grive litorne *Turdus pilaris* : 9 données, 5 communes

Max. de 65 à Brou-sur-Chantereine le 3 mars avec environ 65 individus (THu).
Dernier individu observé le 28 mars à Congis-sur-Thérouanne (RHu).

Grive mauvis *Turdus iliacus* : 9 données, 7 communes

Le plus gros groupe est celui de Brou-sur-Chantereine le 17 mars avec une centaine d'individus (THu).
Dernier individu vu le 2 avril à l'étang du Coq (VLC).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* : 145 données, 29 communes

Premier individu, observé le 31 mars à Lesches (PDu).
Nicheur certain à Trilbardou où des jeunes à l'envol sont observés le 5 juillet (SPI-CD77).

Fauvette grisette *Sylvia communis* : 392 données, 49 communes

Premiers individus notés le 31 mars à Lesches (PDu) et Serris (TBa).
On peut noter l'observation d'un adulte observé tentant de capturer une *Anax parthenope* le 4 juin (VLC).
Nicheur certain.

Fauvette babillarde *Sylvia curruca* : 62 données, 15 communes

Espèce le plus souvent observée à l'unité. Un maximum de 3 individus observés sur un même site, à la Haute-Ile de Neuilly-sur-Marne, le 16 avril (SCh).
Premiers individus observés le 8 avril à l'étang de Précy-sur-Marne (JGn) et à la Haute-Ile (Ohé).
Nidification probable sur les communes de Luzancy (TRo, JBo) Neuilly-sur-Marne (OLa), Villevaudé (THu) et Collégien (RMu), où des chanteurs sont entendus à plusieurs jours d'intervalle.
Dernière observation d'un individu en période de nidification le 14 juillet à la grille noire de Bussy-Saint-Georges (ALa).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : 194 données, 34 communes

Le premier est vu le 12 mars à Luzancy (JBo).
Au moment du passage prénuptial, un maximum de 12 sont observés au niveau de la mare de l'églantier à Croissy-Beaubourg (VLC).
Nidification certaine au pré aux joncs à Précy-sur-Marne (OHé) et au Grand Voyeux (FMo). Elle est probable à Luzancy (JBo).

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* : 289 données, 23 communes

La première est notée le 9 avril à Jablines (FYv).
Jusqu'à 18 comptées sur l'ensemble du Grand Voyeux le 14 juin (RHu).
Nidification certaine à la Haute-Ile (VLi), au parc du Pâtis (SVa), à l'étang du Coq (VLC), et probable à Villenoy (GPa).

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* : 41 données, 11 communes

La première est vue le 6 mai à l'étang du Coq (VLC).
Jusqu'à 10 sont notées à Villenoy le 28 mai (GPa, SCh) et à Trilbardou le 8 juin (ALa-CG77).
Nidification certaine à Trilbardou où un nourrissage de jeunes est observé le 22 juillet (GPa).

Rousserolle turdoïde © Pascal Le Poulain

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* : 49 données, 3 communes

La première est entendue le 27 avril à Jablines (JGn).
Sur Jablines, la nidification est d'ailleurs notée probable (TCh) et deux chanteurs seront observés les 11 et 28 mai. Nidification probable également au Grand Voyeux où un chanteur se fait entendre du 3 mai au 21 juin (RHu) et à l'étang du Coq où un chanteur est entendu du 20 mai au 8 juin (VLC).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : 47 données, 7 communes

Premier individu noté le 31 mars au Grand Voyeux (RHu).
Un maximum de 7 individus en halte sur un même site, le 15 avril à l'étang du Coq (VLC).
L'espèce niche de façon certaine sur le site de Villenoy où le nourrissage des jeunes est observé le 28 mai (GPa, SCh). Cette donnée constitue d'ailleurs la dernière en période de reproduction pour ce printemps. Nidification notée également probable au Grand Voyeux le 10 mai (RHu).
Un individu le 31 juillet au Grand Voyeux est le premier vu lors du passage postnuptial (RHu).

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : 49 données, 3 communes

Le Grand Voyeux fournit la quasi-totalité des données (43) avec un chanteur entendu jusqu'au 14 juin (RHu) accompagné d'un deuxième chanteur le 15 avril (JBo) et le 15 mai (VLC). Egalement un individu observé les 11 et 12 mars à l'étang du Coq de Roissy-en-Brie (VLC), et 4 données provenant du parc du Pâtis à Meaux concernant à chaque fois un individu dont 2 données en juin concernant un chanteur cantonné (SVa, RHu).

Locustelle tachetée *Locustella naevia* : 35 données, 15 communes

Première de l'année le 31 mars à l'Étang de la brosse à Bussy-Saint-Georges (RMu).
Nidification probable à Luzancy (JBo), au pré aux joncs de Précy-sur-Marne (OLa), et sur le site de Villenoy (GPa).

Locustelle luscinioïde *Locustella luscinioides* : 25 données, 1 commune

Un chanteur dans la roselière Bougrandeuse du Grand Voyeux du 9 avril au 19 juillet (VDo, SCh *et al.*) donc nidification probable. Chant devenant plus timide à partir du 24 avril. Une bonne nouvelle !

Hypolaïs polyglotte *Hipolais polyglotta* : 120 données, 29 communes

Premier individu le 27 avril à Villenoy (BLe, Aki). Jusqu'à 8 sur ce même site le 14 mai (OLa).
Notée nicheuse certaine à Congis-sur-Thérouanne le 11 juin (SCl), et à Isles-les-Villenoy le 11 juillet (PRi), et nicheuse probable à Jouarre le 20 mai (JLa) et à Roissy-en-Brie les 5 et 10 juin en deux endroits différents (VLC).

Gobemouche gris *Muscicapa striata* : 5 données, 4 communes

Seulement 4 individus observés : le premier le 6 mai à la Haute Île (OLa), 1 à Jouarre (ADB, CWa) et 1 chanteur à Reuil-en-Brie le 20 mai (FMa), et 1 à Conches-sur-Gondoire le 29 juin (PDu).

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* : 29 données, 13 communes

Le premier est noté le 23 avril à Ferrières-en-Brie (LVi).
Le seul cas de nidification certaine provient de Congis-sur-Thérouanne où un juvénile est vu le 27 juillet (RHu).

Mésange noire *Periparus ater* : 4 données, 4 communes

Seulement quatre données : 1 le 31 mars à Thorigny-sur-Marne (PDu), 1 le 16 avril à Isles-

lès-Villenoy (PDu), 1 le 20 mai à Saâcy-sur-Marne (SB) et 1 le 21 mai à Neuilly-sur-Marne (OAm). Même si ces données sont étonnantes et tardives, elles correspondent certainement à des oiseaux migrateurs.

En 2016, sur la même période, il y avait eu 31 données enregistrées, et une seule donnée au printemps 2015.

Mésange huppée *Lophophanes cristatus* : 17 données, 10 communes

Toujours peu de données de nidification. Ce faible résultat s'explique probablement par la sous prospection des milieux boisés. On notera tout de même un accouplement noté le 3 mars à Germigny-l'Évêque (JEJP).

Mésange nonnette *Poecile palustris* : 76 données, 30 communes

Rien à signaler (99 données en 2016 sur 28 communes).

Mésange boréale *Poecile montanus* : 0 donnée, 0 commune

Comme en 2016, aucune donnée ce printemps 2017. Il serait important de lancer des opérations de recherche les années à venir.

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* : 1 donnée, 1 commune

Observation exceptionnelle d'un oiseau le 16 mai à l'étang du Coq, Pontault-Combault (EDC). Probablement une première donnée pour la vallée de la Marne, homologuée par le CHR (plusieurs photo). Selon les données de faune.idf, la dernière mention de l'espèce en Seine-et-Marne datait de 2012.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* : 11 données, 6 communes

La première est notée à Luzancy le 12 mai (JBo) où un couple se reproduira. Un deuxième couple sera noté nicheur à Jouarre avec au moins deux jeunes (SCl) ainsi qu'une probabilité de nidification à Lizy-sur-Ourcq (DMa).

Pie-grièche écorcheur, Changis-sur-Marne © O. Laporte

Corbeau freux *Corvus frugilegus* : 81 données, 28 communes

Seulement deux corbeautières recensées :

- Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux,
- Luzancy.

Choucas des tours *Corvus monedula* : 110 données, 18 communes

Sites de nidification répertoriés :

- Coupvray,
- Lesches,
- Luzancy.

Moineau friquet *Passer montanus* : 3 données, 2 communes

Toujours trop peu de données pour le Moineau friquet : présent à Précy-sur-Marne les 21 et 23 mai (OLa et OHé). Un seul cas

connu de nidification à Fresnes-sur-Marne le 26 mai (TCh).

Moineau friquet © O. Hépiègne

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* : 14 données, 8 communes

Présent sur plusieurs localités mais sans indice de nidification.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* : 195 données, 39 communes

Espèce assez répandue. Nidification certaines. Pas de grand rassemblement noté. Maximum : une trentaine d'oiseaux à l'étang du Coq, Pontault-Combault le 31 juillet (VLC).

Serin cini *Serinus serinus* : 45 données, 23 communes

Présent sur une vingtaine de communes mais sans indice de nidification certaine.

Tarin des aulnes *Spinus spinus*: 7 donnée, 6 communes

Les derniers tarins de l'année sont notés le 14 avril à Chelles avec deux oiseaux (THe).

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* : 29 données, 16 communes

Rien à signaler. Une prospection des milieux forestiers pourrait apporter d'avantages de données pour cette espèce souvent assez discrète en période de reproduction.

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* : 1 donnée, 1 commune

Une unique donnée de 7 oiseaux à Luzancy le 27 juin (JBo). Aucune donnée en 2016 et en 2015.

Bruant proyer *Emberiza calandra* : 23 données, 15 communes

Un peu plus de données et de localités pour cette année. Par contre, pas de rassemblement notable.

Bruant jaune *Emberiza citrinella* : 100 données, 22 communes

Rien à signaler de particulier.

Bruant zizi *Emberiza cirlus* : 1 donnée, 1 commune

Une seule donnée dans notre région avec un oiseau le 20 mai à Méry-sur-Marne (FMa).

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* : 273 données, 18 communes

Toujours bien présent, le Bruant des roseaux niche sur pratiquement tous les milieux aquatiques avec roselières. Pas de grand rassemblement noté en début de printemps.

ANNEXE : Liste des observateurs

Qu'ils soient remerciés…et que les oubliés m'excusent, ce n'est jamais volontaire !

Antoine Zuccarelli (AZu),
Adele Bellego (ABe),
Agnès de Balasy (ADB),
Alain Aaron (AAa),
Alain Barthélemy (ABa),
Axel Dehalleux (ADe),
Alain Jeanne (AJe),
Anne Leroux (ALe),
Anneli Feret (AFe),
Akaren Goudiaby (AGo),
Annie Houé (AHo),
Annie Rigaut (ARi),
Antoine Mercier (AMe),
Annick Larbouillat (ALr),
Anouk Vacher (AVa),
Anthony Guerard (AGu),
Alexandre Lainé (ALa-CG77),
Alexandre Kita (AKi),
Arnaud Lathuille (ALt),
Arnaud Sponga (ASp),
Arthur Larrieu (ALa),
Audrey Zawadzki (AZa),
Augustin Chen (ACh),
Aurélie Devoulon (ADe),
Aurélien Gaunet (AGa),
Axel Dehalleux (ADe),
Bernard Couronne (BCo),
Bertrand Alliot (BAl),
Bruno Durand (BDu),
Bruno Lebrun (BLe),
Bruno Piketty (BPi),
Carlos Malem (CMa),
Caroline Matra (CMt),
Catherine Defourneaux (CDf),
Catherine Escudié (CEs),
Catherine Walbecque (CWa),
Céline Fourey (CFo),
Christelle Pluvinet (CPl),
Christian Boutillier (CBo),
Christian Delorme (CDe),
Christian Desmier (CDs),
Christian Gloria (CGl),
Christian Guilhem (CGu),
Christian Paris (CPa),
Christiane Oliviéro (COl),
Christine Gonella (CGo),
Christophe Roland (CRo),
Christophe Balleron (CBa),
Christophe Bray (CBr),
Christophe Bruneaux (CBu),
Christophe Goujon (CGo),
Claude Fontaine (CFo),
Claude Gardères (CGa),
Claude Jund (CJu),
Claudine Durand (CDu),
Claudine Marti (CMa),
Clélie Grangier (CGr),
Colette Nivot (CNi),
Conseil départemental de Seine-et-Marne (CD77),
Corinne Géa (CGé),
Corinne Tosolini (CTo),
Cyril Epiocco (CEp),
Daniel Malassingne (DMa),
Dauren Omarov (DOm),
David Thorns (DTh),
Denis Keller (DKe),
Didier Godreau (DGo),
Didier Julien-Laferrière (DJL),
Dominique Baudet (DBa),
Dominique Robichon (DRo),
Emeline Bouzendorf (EBo),
Emeline Oudin (EOu),
Emilie Hutois (EHu),
Emma Lidji (ELi),
Emmanuel Franc (EFr),
Enrique Sans (ESa),
Les Environn'hôtes (Env),
Eric Nianane (ENi),
Éric Da Costa (EDC),
Eric Perret (EPe),
Etienne Colliat (ECo),
Fabrice Ducordeau (FDu),
Fabien Mollon (FMo),
Florent Yvert (FYv),
Florian Leemann (FLe),
Franck Le Bloch (FLb),
François Bouzendorf (FBo),
François Duchenne (FDu),
François Halligon (FHa),
François Legendre (FLe),
Francois Tourrette (FTo),
Franz Barth (FBa),
Frédéric Malher (FMa),
Frédérique Valette (FVa),
Gaell Mainguy (GMa),
Gilles Heluin (GHe),
Ginette Boursier (GBo),
Ginette Orange (GOr),
Graciane Lesage (GLs)
Guillaume Halliez (GHa),
Guillaume Passavy (GPa),
Guy Bauple (GBa),
Hélène Duret (HDu),
Hélène Meunier (HMe),
Hélène Piton (HPi),
Hélène Sudrie (HSu),
Henri de Maintenant (HdM),
Hubert Pottiau (HPo),
Hugues Finot (HFi),
Isabelle Giraud (IGi),
Jacky Winne (JWi),
Jaime Cresppo (JCr),
Jean-Marie Ganzer (JGa),
Jean Pottez (JPo),
Jean-Christophe Beaucour (JCB),
Jean-François Le Bihan (JLe),
Jean-François Magne (JFM),
Jean-Jacques Lallemant (JLa),
Jean-Luc Frèrebeau (JFr),
Jean-Marc Vigneau-Cazalaa (JVi),
Jean-Michel Coquillat (JCo),
Jeannine Mercier (JMe),
Jeanne Lavialle (JLa),
Jean-Noël Fruchart (JFr),
Jean-Pierre Delapré (JPD),
Jérôme de Linares (JdL),
Joachim de Rancourt (JdR),
Jocelyne Biasin (JBi),
Joël Hacquard (JHa†),
Joël Pasquier (JPa),
Joelle Moreno (JMo),
Jonathan Ardelet (JAr),

Jonathan Gimenez (JGi),
Joseph Gnanou (JGn),
Julien Barge (JBa),
Julien Birard (JBi),
Julien Bottinelli (JBo),
Julien Hervé (JHe-CD77)
Klaire Houeix (KHo),
Laurence Boiteux (LBo),
Laurence Hélias (LHé),
Laurent Charrier (LCh),
Laurent Chevallier (LCh),
Laurent Rouschmeyer (LRo),
Laurent Vindras (LVi),
Léa Boulière (LBo),
Liliane Rogon (LRo),
Loriane Mameli (LMa),
Louis Eyméoud (LEy),
Lucille Bourgeais (LBo),
Lydie Baranton (LBa),
Manuela Fernandes (MFe),
Marianne Serizier (MSe),
Marie Magem (MMa),
Marie-Pierre Huguenard (MHu),
Mario Fouquet (MFo †),
Marion Eriksson (MEr),
Marion Delkas (MDe),
Martine Dugrenier (MDu),
Matthieu Charton (MCh),
Mathieu Goguelet (MGo),
Mattia Brambilla (MBr),
Maxime Devauchelle (MDe),
Maxime Zucca (MZu),
Mélissa Roig (MRo),
Michaël Bouillon (MBo),
Michel Cariolle (MCa),
Michel Colombe (MCo),
Michel Ganzer (MGa),
Michel Mathis (MMa),
Michel Sitterlin (MSi),
Muguette Douillet (MDo),
Muriel Gelin (MGe),
Natacha Equille (NEq),
Nathalie Bouchez (NBo),
Nathalie Deslandes (NDe),
Nathalie Elbaz (NEl),
Nathalie Lautier (NLa),
Nathanaëlle Muger (NMu),
Nicolas Mokuenko (NMo),
Nicole Dupin (NDu),
Nicole Girard (NGi),
Nicole Piton-Muller (NPi),
Nicole Venthenat (NVe),
Odette Marechal (OMa),
Odile Inguimbert (OIn),
Olivier Amiaud (OAm),
Olivier Boissier (OBo),
Olivier Hépiègne (OHé),
Olivier Labbaye (OLa),
Olivier Laporte (OLa),
Olivier Muller (OMu),
Olivier Païkine (OPk),
Olivier Patrimonio (OPa),
Olivier Plisson (OPl),
Olivier Renault (ORe),
Olivier Sigaud (OSi),
Pascal Le Poulain (PLP),
Pascal Sandrard (PSa),
Patrick Banville (PBa),
Patrick Da Silva (PDa),
Patrick Decreus (PDe),
Patrick Derennes (PDr),
Philippe Bordas (PBo),
Philippe Bories (PBo),
Philippe Ducourneau (PDu),
Philippe Guittet (PGu),
Philippe Le Naour (PLN),
Philippe Persuy (PPe),
Philippe Pirard (PPi),
Philippe Rance (PRa),
Philippe Stocker (PSt),
Philippe Valet (PVa),
Pierre Migaud (PMi),
Pierre Mordacq (PMo),
Pierre Zimberlin (PZi),
Pierre-Yves Henry (PHe),
Prisca Pons (PPo)
Romain Provost (RPr),
Raphaëlle Del Rio (RDe),
Régis Legros (RLe),
Rémi Moulin (RMo),
Richard Muguet (RMu),
Robin Panvert (RPa),
Roland Muller (RMu),
Romain Huchin (RHu),
Roselyne Du Plessis (RDu),
Sarah Esnault (SEs),
Sarah Jan (SJa),
Sébastien Vanloo (SVa),
Sébastien Tresonne (STe),
Serge Sougakoff (SSo),
Séverine Guillier (SGu),
Sonia Oliviéro (SOl),
Sorlin Chanel (SCh),
Stanislas Wroza (SWr),
Stéphane Abin (SAb),
Stéphane Clavé (SCl),
Stéphane Thomin (STh),
Susan Merry (SMe),
Sybille Rouzaud (SRo),
Sylvain Houpert (SHo),
Sylvain Vincent (SVi),
Sylvestre Plancke (SPl-CD77),
Sylvie Boyer (SBo),
Stéphane Noell (SNo),
Sylvie Perry (SPe),
Théo Hervé (THe),
Théo Hurtrel (Thu),
Théo Vivensang (TVi),
Thibaut Chansac (TCh),
Thierry Bara (TBa),
Thierry Lematte (TLm),
Thierry Leroy (TLe),
Thierry Roy (TRo),
Thomas Bitsch (TBi),
Thomas Boguta (TBo),
Thomas Perrier (TPe),
Tristan Gruson (TGr),
Tsunehiko Kuwabara (TKu),
Valerie Duguet (VDu),
Véronique Delamare (VDe),
Vincent Gibaud (VGi),
Vincent Dourlens (VDo),
Vincent Le Calvez (VLC),
Vincent Limagne (VLi),
Vincent Ponelle (VPo),
Virginie Simard (VSi),
Vivien Gabillaud (VGa),
Yacine Attik (YAt),
Yohann Brouillard (YBr),
Yveline Goldman (YGo),
Yves Cornic (YCo),
Yves Maillet (YMl),
Yves Massin (YMa),
Yves Sanchez (YSa).

Références bibliographiques

Lien de citation des différentes synthèses du groupe local Vallée de la Marne :
https://www.faune-iledefrance.org/index.php?m_id=20019

COLLECTIF, 2017, *Atlas des oiseaux nicheurs d'Île-de-France*, Corif.
LAPORTE O., 2013. Les oiseaux du Parc départemental de la Haute-Île, *Le Passer, 47*, Corif.
LE MARÉCHAL P., LALOI D. et LESAFFRE G., 2013, *Les oiseaux d'Île-de-France*, Delachault et Niestlé.
MASSIN Y. et le CHR : *Les oiseaux rares en Île-de-France en 2017 Dix-septième rapport du Comité d'homologation régional.*

Crédits

Les données faune-iledefrance, Cettia et AEV ont été fournies grâce à l'accord des structures gestionnaires et utilisées conformément à leurs chartes, conventions ou codes de déontologie.

LPO, site collaboratif : http://faune-iledefrance.org
ARB, site collaboratif Cettia : http://cettia-idf.fr/bdd

© Groupe local LPO Vallée de la Marne
Réalisation : O. Laporte, Mai 2019.
Photo de couverture : © O. Laporte