

# Les oiseaux rares en Limousin en 2016



Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis*,  
octobre 2016, Limoges (87) Ch. Mercier.

# 8<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation Régional du Limousin

## *Pierre Marthon et le CHR du Limousin*

### PRÉAMBULE

Créé en 2009, le Comité d'Homologation Régional a pour vocation de valider les observations d'oiseaux rares et occasionnels dans le périmètre de la région géographique Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne). A ce titre, pour les espèces très rares, il est un maillon de la fiabilisation des données de Faune-Limousin et WNat. Il est le complément du CHN qui traite les observations d'espèces rares au niveau national. Ces données donnent lieu à la publication d'un rapport annuel mis à la disposition de la communauté ornithologique. Il sert de relais pour les enquêtes nationales traitant des espèces inhabituelles.

Ce huitième rapport est la synthèse des observations ornithologiques réalisées dans la région en 2016. Sont aussi présentées à titre d'information les données limousines homologuées par le CHN (Comité d'Homologation National), qui concernent donc des espèces encore plus rares. Les espèces exotiques font aussi l'objet d'une rubrique.

La liste des espèces soumises à homologation en Limousin ainsi que les fiches d'homologation sont disponibles sur les sites Internet de la SEPOL et de la LPO Corrèze. Les fiches renseignées doivent être transmises au secrétariat du CHR : de préférence par mail à [chrlimousin@hotmail.fr](mailto:chrlimousin@hotmail.fr), ou par courrier à l'adresse : SEPOL, secrétariat du CHR, pôle nature Limousin, Moulin Cheyroux, 87 700 Aix-sur-Vienne.

Le CHR Limousin est composé des 9 membres bénévoles suivants : Morgan Boch, Raphaël Bussière, Fabrice Desage, Nicolas Gendre, Guy Labidoire, Pierre Marthon (secrétaire), Robin Petit, Jérôme Sottier (président), Anthony Virondeau. Afin d'assurer un renouvellement régulier des membres il serait souhaitable que de nouvelles personnes apparaissent dans le comité. Ceux qui souhaitent intégrer le comité pour partager leurs compétences en ornithologie de terrain et faire progresser la connaissance de notre avifaune sont invités à en informer le plus rapidement possible un membre du CHR ou son secrétaire à [chrlimousin@hotmail.fr](mailto:chrlimousin@hotmail.fr).

Cette année, la mise en place à la fin du premier trimestre de la base de données Faune Limousin a provoqué une augmentation importante du nombre de données. Les données des espèces rares ont profité de cette dynamique non seulement sur l'année en cours mais aussi sur les années passées. A l'instar d'autres comités régionaux, pour la validation des données d'oiseaux rares ou inhabituels, le CHR a adapté son fonctionnement à Faune-Limousin selon le processus suivant :

Pour les utilisateurs de Faune Limousin, les données peuvent être validées sans

passer par la rédaction d'une fiche, si la donnée saisie comprend une description solide dans la partie remarque (conditions d'observation et éléments ayant permis l'identification), et/ou une photo permettant d'identifier sans ambiguïté l'espèce, et/ou un enregistrement sonore.

Les données soumises à homologation sont classées dans la rubrique "espèces très rares", elles sont notées en rouge vif et signalées par un point d'exclamation inséré dans un triangle blanc. Quand la donnée est homologuée ce triangle est suivi d'une coche verte. Par ailleurs, un clic sur ce triangle permet d'avoir en ligne les activités du CHR et les rapports annuels.

**Le processus d'homologation entre dans le cadre de la fiabilisation des données, à ce titre les données non homologuées seront invalidées dans Faune-Limousin.** D'où l'importance d'avoir des critères déterminants (description, photos....). Pour les espèces rares, la plupart des organismes, enquêtes, revues, atlas... prennent en compte uniquement les données qui ont été validées par un CHR ou CHN (Comité Homologation National).

La possibilité de rédiger une fiche d'homologation est conservée pour les personnes qui n'utilisent pas Faune Limousin ou qui le souhaitent.

Le CHR continue également à se réserver la possibilité de travailler sur les données publiées dans le forum Obs Limousin et accompagnées de photos ou d'enregistrements sonores, sous réserve d'un accord explicite de l'observateur.

## LA RÉUNION PLÉNIÈRE

Elle s'est tenue le 29 avril 2017 à Limoges. Le relevé des décisions est le suivant :

- Examen des 22 observations en suspens.

- La multiplication des données d'oiseaux saisies dans Faune Limousin va de paire avec quelques erreurs grossières d'identification. **Lorsque ces erreurs sont rapidement corrigées** (suppression de la donnée ou correction de l'identification), mais que le CHR les a déjà examinées et refusées, **elles ne sont pas publiées dans le rapport comme données refusées.** Les données pour lesquelles l'observateur ne corrige pas rapidement, et refusées par le CHR, continuent d'être publiées dans le rapport annuel comme données refusées, sans le nom de l'observateur. Cela permet de garder une trace de données non validées pouvant toutefois correspondre à des identifications correctes mais refusées car trop fragiles au vu des circonstances ou de la description.

- Mise à jour de la liste des espèces d'oiseaux soumises à homologation en Limousin.

Cette mise à jour entre en vigueur le **1<sup>er</sup> juillet 2017**. Elle consiste en un allègement puisque les neuf espèces suivantes sortent de la liste : **Vautour fauve *Gyps fulvus*, Échasse blanche *Himantopus himantopus*, Goéland brun *Larus fuscus*, Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*, Sterne pierregarin *Sterna hirundo*, Hibou des marais *Asio flammeus*, Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*, Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*, Rémiz penduline *Remiz pendulinus*.** Trois rejoignent la liste des espèces pour lesquelles les données de la commune de Lussat sont validées

sans description ni photo : Garrot à œil d'or, Nette rousse et Pluvier argenté.

Cette mise à jour se base sur le nombre de mentions en Limousin (au moins 3 par an pendant 5 ans), avec des subtilités pour les invasions ponctuelles et pour les espèces contactées à Lussat. L'augmentation du nombre de données transmises par les observateurs, notamment grâce à Faune Limousin, a démontré la régularité des espèces citées. Par ailleurs, le travail des vérificateurs sur les sites de saisies en ligne assure la fiabilité des données de toutes les espèces non soumises à homologation. Les espèces qui sortent de la liste continueront donc d'être vérifiées mais selon une procédure plus souple (pas d'avis collégial nécessaire, ni de description / photo systématique).

D'autres ajustements de la liste tiennent compte des décisions récentes de la CAF (CROCHET *et al.* 2016) et d'observations récentes de nouveaux taxons en Limousin :

Le Sizerin flammé est de nouveau séparé en Sizerin cabaret (*Acanthis cabaret*) et Sizerin flammé (*Acanthis flammea*). Ces deux taxons ainsi que le Sizerin de type cabaret / flammé (*Acanthis cabaret / flammea*) sont soumis à homologation.

Le Pouillot véloce de Sibérie (*Phylloscopus collybita tristis*) et le Pouillot véloce de type sibérien (*Phylloscopus collybita tristis / « fulvescens »*) sont ajoutés à la liste officielle, du fait des mentions récentes.

Le Traquet motteux du Groenland (*Oenanthe oenanthe leucorhoa*) est ajouté à la liste. Les critères considérés comme déterminants sont ceux publiés par DUBOIS & MAUVIEUX (2016). Une bonne photo sera nécessaire à la validation de cette sous-espèce délicate et encore méconnue.

Pour les années à venir, il est décidé de ne plus publier les données d'espèces exotiques régulières (10 espèces concernées), et non soumises à homologation, au rapport annuel. Seules les observations d'espèces exotiques encore plus rares observées en nature seront publiées.

Le comité d'homologation salue le travail fourni par tous les vérificateurs, coordonnés par la SEPOL et la LPO Corrèze, qui examinent un nombre colossal de données. Enfin, les nombreux observateurs qui transmettent leurs données, et nourrissent ainsi les synthèses annuelles sur les oiseaux rares, sont vivement remerciés. La synthèse des observations d'oiseaux rares en 2016 est l'objet de ce rapport.

## PHOTOS

Les photographies sont aussi les bienvenues. Rappelons toutefois que rien ne peut remplacer une description écrite pour les espèces les plus délicates à identifier, pour déterminer l'âge et/ou le sexe d'un oiseau et pour garder une trace précise de son observation.

## BILAN DE L'ANNÉE 2016

La mise en place de Faune Limousin, à la fin du premier trimestre, a entraîné une augmentation du nombre de données ornithologiques qui s'est répercuté sur celui du nombre de données d'espèces rares. S'y ajoutent des données de la période 2009-2015 saisies courant 2016.

Trois nouvelles espèces apparaissent sur la liste des oiseaux du Limousin : l'Ibis

falcinelle *Plegadis falcinellus* cité sur 2 sites différents, le Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis* et le Harle couronné *Lophodytes cucullatus* homologué par le CHN catégorie E.

Sont homologuées pour la première fois des espèces déjà observées en Limousin avant la création du CHR : le Cygne de Bewick *Cygnus columbianus*, le Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*, le Grand labbe *Stercorarius skua* et le Goéland marin *Larus marinus*. Parmi les autres observations remarquables, on relève aussi celles d'Oies rieuses *Anser albifrons*, d'un Fuligule milouinan *Aythya marila*, d'un Fuligule hybride milouin x nyroca *Aythya ferina x nyroca*, de 3 Macreuses brunes *Melinitta fusca*, d'un Milan hybride noir x royal *Milvus migrans migrans x milvus milvus*, d'un Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* (2012), d'un Coucou geai *Clamator glandarius*. Il faut aussi retenir les mentions de Grèbes jougris *Podiceps grisegena*, Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*, Bécasseaux maubèches *Calidris canutus*, Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* (2010), Sterne caugek *Sterna sandvicensis*, Sterne naine *Sternula albifrons* (2009), Guifette leucoptère *Chidonias leucopterus* (2011-2016) ainsi que plusieurs citations de Moineaux soulcies *Petronia petronia*.

222 données ont été examinées dont 195 pour l'année 2016. Il y en avait 165 en 2015. Le taux d'acceptation est de 94 %.

## PRÉSENTATION DES DONNÉES

Les données sont présentées dans ce rapport de la manière suivante :

- nom français et scientifique, selon l'ordre systématique de la liste des Oiseaux de France établie par la CAF (Commission Avifaunistique Française), diffusée par la LPO et le MNHN ;
- entre parenthèses, les 2 premiers nombres correspondent au nombre de citations suivi du nombre d'individus homologués depuis 2009, année de création du CHR, 2016 exclu. Les 2 derniers nombres représentent le nombre de citations et le nombre d'individus homologués pour l'année 2016.
- classement selon l'ordre alphabétique des 3 départements (Creuse, Corrèze et Haute-Vienne) ;
- commune/lieu-dit ;
- nombre d'individus (si un, non mentionné) ;
- sexe, âge, forme ;
- date du premier contact, et éventuellement celle du dernier ;
- précision si l'oiseau a été bagué, photographié ou si son chant a fait l'objet d'un enregistrement ;
- une session de baguage compte comme une citation ;
- les données sont la propriété des observateurs ; figurent dans l'ordre les noms du découvreur (à défaut du rédacteur de la fiche) cité en premier, puis éventuellement des photographes et des observateurs ;
- à l'instar du CHN, les observations sur photo émanant des sites internet peuvent être homologuées, dans ce cas le prénom du photographe et d'autres observateurs ne sont pas mentionnés, ex : WNat/Marthon , Obslim./Marthon.

Dans chaque monographie seules les données régionales homologuées sont considérées à partir du 01/01/2009, date de mise en place du CHR.

*Abréviations utilisées :*

*ad. : adulte - fem. : femelle - com. pers. : communication personnelle - cple : couple - juv. : juvénile - imm. : immature - ind. : individu - H1 : 1<sup>er</sup> hiver - 1A : 1<sup>ère</sup> année - +1A : plus d'un an - 2A : 2<sup>e</sup> année - nupt. : nuptial - internupt. : internuptial. - obslim. : obslimousin - prob. : probable, repro : reproduction, env. : environ, s.p. : sans précision - chant. : chanteur.*

## **DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2016 ET CONCERNANT DES ESPÈCES DE CATÉGORIE A (espèces présentes en France à l'état sauvage).**

### **CYGNE DE BEWICK *Cygnus columbianus* (0/0 - 1/1).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 26/11/2016 (V. Primault, C. Munoz).

Cette espèce est homologuée pour la première fois, les dernières données limousines remontaient à l'hiver 1985/1986. La présence de cet oiseau fin novembre ne confirme pas la règle qui veut que le Cygne de Bewick apparaisse à nos latitudes lors des périodes de grands froids, cette année les températures ayant été particulièrement douces.

### **OIE RIEUSE *Anser albifrons* (3/6 - 1/4).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 4 ind (2ad. et 2juv.) du 03/11/2016 au 21/11/2016, photo (V. Primault, J.P. Toumazet, B. Brunet et al.).

Homologuée pour la 4<sup>ème</sup> fois et une nouvelle fois à l'Étang des Landes, cette famille d'Oies rieuses ayant stationné près de 3 semaines a fait le bonheur de nombreux observateurs. Pour la première fois un effectif aussi important est noté en Limousin. Comme lors des apparitions précédentes elle est survenue en fin d'automne lors de la phase de migration postnuptiale.



Oies rieuses *Anser albifrons*, ad. et juv., novembre 2016, Lussat (23) V. Primault.



Oies rieuses *Anser albifrons*, ad. et juv., novembre 2016, Lussat (23) B. Brunet.

**NETTE ROUSSE *Netta rufina* (18/41 - 12/20?).**

**Creuse** - Lussat/Étang des Landes, type fem. du 28/11/2015 au 16/01/2016, photo (J.P. Toumazet et al.),

- Lussat/Étang des Landes, type fem. le 18/02/2016 (A. Trompat),
- Lussat/Étang des Landes, mâle du 19/03/2016 au 20/03/2016 (G. Dubois, N. & R. Deschaumes et al.),
- Lussat/Étang des Landes, 11 ind. (dont 8 mâles) le 03/04/2016 (G. Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, cple du 26/03/2016 au 21/05/2016, photo (J.P. Toumazet, G. Dubois et al.),
- Lussat/Étang des Landes, mâle ad. du 25/05/2016 au 27/05/2016 (G. Dubois et al.),
- Lussat/Étang des Landes, cple le 05/06/2016, mâle seul le 06/06/2016 (G. Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, fem. du 24/06/2016 au 01/07/2016 (J.P. Toumazet),
- Lussat/Étang des Landes, mâle ad. le 14/09/2016 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, 3 ind. le 21/09/2016, photo (J.P. Toumazet),
- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. type fem. du 26/09/2016 au 09/10/2016, puis 1 ind. type fem. jusqu'au 23/10/2016 et du 31/10/2016 jusqu'au 06/11/2016 photo (G. Dubois, B. Brunet, J.P. Toumazet, V. Primault et al.).

**Haute-Vienne** - Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat, type fem. le 24/11/2016, photo (Ch. Mercier).

D'année en année, le nombre de citations et la durée de présence de l'espèce à l'Étang des Landes sont en progression constante, notamment au printemps, ce qui laisse toujours espérer une nidification prochaine.... Le renouvellement des oiseaux est délicat à évaluer, il est donc difficile de savoir le nombre d'individus exact qui ont transité à l'Étang des Landes.

La mention haut-viennoise démontre une nouvelle fois que la Nette rousse peut-être contactée un peu partout dans la région.



Nette rousse *Netta rufina*, cple, mai 2016,  
Lussat (23) J.P. Toumazet.



Nette rousse *Netta rufina*, fem., octobre 2016,  
Lussat (23) D. Philippon.

**FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila* (1/1 - 1/1).**

Corrèze - Peyrelevade/Étang de Rebière Nègre, ind. 1A du 15/11/2016 au 31/12/2016, photo (R. Petit, Ch. Mercier, L. Ton, L. Fleytou, M.L. Miège et al.).

Cette seconde homologation régionale à l'instar de la première est corrézienne. Le stationnement de cet individu durant sur une aussi longue période est remarquable. Il ne déroge pas à la règle qui veut que l'espèce soit le plus fréquemment signalée en Limousin de novembre à février. Toutefois, la première validation était survenue en avril 2009 à Neuvic. Depuis de nombreuses années le Fuligule milouinan n'est plus signalé à l'est et au nord du Limousin.





Fuligule milouinan *Aythya marila*, 1A, novembre 2016,  
Peyrelevade (19) Ch. Mercier.



Fuligule milouinan *Aythya marila*, 1A, décembre 2016,  
Peyrelevade (19) M.L. Miège.

**FULIGULE HYBRIDE MILOUIN X NYROCA *Aythya ferina x nycora* (0/0 - 1/1).**  
Haute-Vienne - Saint-Martin-le-Mault/Étang de la Mazère et Saint-Léger-  
Magnazeix/Étang de Murat, du 04/02/2016 au 03/03/2016, photo (Ch. Mercier).  
Cette observation constitue la première donnée documentée de cet hybride en  
Limousin. Le stationnement un mois durant est notable pour un taxon qui peut passer  
inaperçu.



Fuligule hybride Milouin x Nyroca *Aythya ferina x nyroca*, mars 2016, Saint-Martin-le-Mault (87) Ch. Mercier.

**MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca* (2/9 - 1/3).**

Haute-Vienne - Razès/Lac de Saint-Pardoux, 3 ind. type fem. le 15/12/2016, photo (Ch. Mercier).

Bel effectif pour la troisième homologation régionale car en général l'espèce est observée à l'unité. Les haltes surviennent de mi-novembre à mi-mars, elles sont toujours très brèves. Les macreuses en hivernage en France fréquentent essentiellement les côtes.



Macreuse brune *Melanitta fusca*, décembre 2016, Saint-Pardoux (87) Ch. Mercier.

**GARROT À ŒIL D'OR *Bucephala clangula* (23/25 - 6/5).**

Creuse - Lussat/Étang de Tête-de-Bœuf, 3 mâles le 21/02/2016 (G. Dubois),  
- Lussat/Étang de Tête-de-Bœuf, mâle du 21/02/2016 au 01/03/2016, photo (P. Duboc, G. Dubois),  
- Lussat/Étang de Tête-de-Bœuf, 2 mâles ad. le 12/03/2016 et le 19/03/2016 (L. Ton,

G. Dubois),

- Lussat/Étang de Tête-de-Bœuf, 2 mâles ad. et fem. du 20/03/2016 au 23/03/2016 photo (N. Deschaumes, A. Virondeau, G. Dubois),

- Lussat/Étang des Landes, 2 mâles ad. et fem. le 26/03/2016 (G. Dubois),

- Lussat/Étang de Tête-de-Bœuf, fem. du 30/11/2016 au 30/12/2016 (A. et J.P. Virondeau, G. Nonique-Desvergnès, C. Boissou, A. Audevard).

Ces dernières années, l'espèce est régulière en hivernage sur les étangs de la commune de Lussat. Le renouvellement est difficile à apprécier pour les observations de début d'année. On peut toutefois estimer qu'au moins 5 individus ont séjourné sur les étangs de la commune de Lussat.

Il n'est pratiquement plus observé sur les grands plans d'eau haut-viennois où autrefois il apparaissait fréquemment à la mauvaise saison.



Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*, mâle,  
février 2016, Lussat (23) P. Duboc.

**HARLE PIETTE *Mergellus albellus* (9/11 - 2/2).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. type fem. présence continue du 02/10/2015 jusqu'au 23/03/2016, photo (J.-P. et L. Toumazet et al.).

Depuis 2013, le Harle piette se montre régulièrement à l'Étang des Landes, avec des hivernages complets. Son arrivée, en Limousin est souvent liée aux vagues de froid. Les hivers étant de plus en plus doux il n'apparaît quasiment plus sur les autres sites où autrefois il était parfois possible de l'observer.



Harle piette *Mergellus albellus*, mars, Lussat (23)  
J.P. Toumazet.

**HARLE HUPPÉ *Mergus serrator* (4/5 - 1/1).**

**Creuse** - Lussat/Étang des Landes, type fem. le 27/12/2016, photo (B. Pellegrini, A. Corre, J.L et M. Pellegrini, J.P. et L. Toumazet, C. Boissou).

Cette unique donnée s'inscrit dans le pattern d'apparition de ce harle dans la région. Les individus de type femelle sont les plus fréquemment rencontrés, les mâles adultes sont beaucoup plus rares. Ce constat se vérifie d'ailleurs pour toutes les espèces de harles.

**HARLE BIÈVRE *Mergus merganser* (19/61 - 5/18).**

**Corrèze** - Argentat/Les gravières, cple ad. le 25/11/2016, photo (M.L. Miège).

**Creuse** - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. mâle et type fem. le 16/01/2016, photo (J.P. Toumazet),

- Noth/Étang de la Grande Gasine, type fem. le 10/11/2016 (M. Richer).

**Haute-Vienne** - Verneuil-sur-Vienne/Mayeras, 7 type fem. le 05/12/2016, photo (N. Lagarde),

- Limoges/Sur la Vienne, 6 ind. (3 mâles 1A, fem. ad., 2 fem.1A) le 31/12/2016, photo (L. Arnaud).

Bien que novembre et décembre 2016 aient été particulièrement doux, le Harle bièvre est apparu dans les 3 départements. Des effectifs importants ont été relevés sur la Vienne.


La présence de mâles est notable, généralement ce sont des femelles ou des types femelle qui sont rencontrés.



Harle bièvre *Mergus merganser*, mâle ad. janvier 2016,  
Lussat (23) J.P. Toumazet.



Harle bièvre *Mergus merganser*, cple novembre 2016,  
Argentat (19) M.L. Miège.



Harle bièvre *Mergus merganser*, décembre 2016,  
Limoges (87) L. Arnaud.

**PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* (2/3 - 3/4).**

**Corrèze** - Bort-les-Orgues/Les Aubazines-Basses, ind. 1A le 28/11/2016, photo (L. Ton, T. Leroy).

**Creuse** - Royère-de-Vassivière/Lac de la Vaud-Gelade, ind. 1A le 29/11/2016, photo (Ch. Mercier).

**Haute-Vienne/Creuse** - Beaumont-du-Lac et Royère-de-Vassivière/Lac de Vassivière, 2 ind. 1A du 06/12/2016 au 30/12/2016, photo (Ch. Mercier, B. Brunet, R. Petit, N. Lagarde, R. Beaubert, A. Audevard, L. Fleytou).

Après deux années blanches, le Plongeon catmarin effectue un retour remarquable avec l'arrivée, en fin d'année, de ces 4 individus. Bien que n'étant pas historiquement le plus commun des plongeurs en Limousin, il a été le seul à effectuer un passage dans la région en 2016. Il est intéressant de noter que les 3 départements sont concernés. Classiquement tous les individus signalés sont des oiseaux de premier hiver.



Plongeon catmarin *Gavia stellata*, ind. 1A novembre 2016,  
Bort-les-Orgues (19) L. Ton.



Plongeon catmarin *Gavia stellata*, ind. 1A décembre 2016,  
Beaumont-du-Lac (87) Ch. Mercier.

**GRÈBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (1/1 - 2/2).**

**Corrèze** - Peyrelevade/Étang de Rebière Nègre, ind. plum. nuptial du 18/05/2016 au 23/05/2016, photo (O. Villa, J.M. Pouradier, R. Petit, D. Dupont, G. Nonique-Desvergnès).

**Haute-Vienne** - Beaumont-du-Lac & Royère-de-Vassivière (87/23)/Lac de Vassivière, ind. 1A du 15/11/2016 au 31/12/2016, photo (Ch. Mercier, N. Lagarde, R. Petit, L. Fleytou, B. Brunet).

Absent en Limousin depuis 2010, le Grèbe jougris est homologué seulement pour la seconde fois. Le stationnement durant 5 jours de cet individu à Peyrelevade au mois de mai est étonnant. L'observation sur le lac de Vassivière est plus classique car généralement les observations sont hivernales et elles concernent de jeunes oiseaux. Ces dernières années, l'espèce se fait de plus en plus rare dans la région.



Grèbe jougris *Podiceps grisegena*, plum. nupt., mai 2016,  
Peyrelevade (19) R. Petit.



Grèbe jougris *Podiceps grisegena*, ind. 1A., décembre 2016,  
Beaumont-du-lac (87) Ch. Mercier.

**BUTOR ÉTOILÉ *Botaurus stellaris* (10/10 - 2/2).**

Corrèze - Lagraulière/Étang Neuf, le 18/12/2016, photo (Ph. Lebrun).

Haute-Vienne - Cieux/Étang de Cieux, du 30/11/2016 au 04/12/2016 (H. Bourdin, X. Millon).

Ces deux observations en décembre sont conformes au pattern d'apparition de l'espèce. Elles montrent une nouvelle fois que le Butor étoilé peut-être découvert en hiver sur des sites où il était totalement inattendu. Il peut passer inaperçu car il est très difficile à détecter.

En raison de la disparition des roselières très peu de sites sont aujourd'hui favorables à sa nidification. Depuis le début des années 1970 la reproduction n'a plus été avérée en Limousin. Les derniers indices de nidification ont été relevés à l'Étang des Landes en 1995.



Butor étoilé *Botaurus stellaris*, décembre 2016,  
Lagraulière (19) Ph. Lebrun.

**CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (12/14 - 1/1).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, mâle nupt. le 21/05/2016, photo (J.P. et L.



Toumazet),

Comme l'an passé l'espèce a été mentionnée à l'Étang des Landes. Cette observation survenue en période de reproduction laisse espérer une possibilité de nidification lors des prochaines années.

En France, les foyers de reproduction sont bien localisés, essentiellement méridionaux et atlantiques. Les plus proches se situent en Brenne, en Charente et dans l'Allier.



Crabier chevelu *Ardeola ralloides*, mâle, mai 2016,  
Lussat (23) J.P. Toumazet.

**IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (0/0 - 2/2).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. 2A du 02/04/2016 au 18/04/2016, photo (J.P. Toumazet, D. Philippon et al.).

Haute-Vienne - Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat, du 20/08/2016 au 30/08/2016, photos (Ch. Mercier, F. & C. Colin et al.).

Ces 2 observations, une à chacune des phases migratoires, sont exceptionnelles car l'ibis falcinelle apparaît pour la première fois dans le Limousin.

Ces dernières années la situation de l'espèce a beaucoup évolué en France. Il est nicheur sur le littoral méditerranéen notamment en Camargue. Il apparaît de plus en plus souvent au nord de notre région. Dans ces conditions il était inévitable qu'un jour cet ibis soit observé dans notre région.



Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*,  
août 2016, Saint-Léger-Magnazeix  
(87) F. & Ch Collin.



Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*, avril 2016,  
Lussat (23) D. Carlier.



Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*, avril 2016,  
Lussat (23) J.P. Toumazet.



Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*, avril 2016,  
Lussat (23) D. Carlier.

**SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (13/15 - 1/2).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 imm. du 03/10/2016 au 17/10/2016, photo (B. Brunet, J.P. Toumazet et al.).

Sensiblement à la même période qu'en 2015, l'espèce est observée à l'Étang des Landes. Le stationnement de ces 2 spatules durant 2 semaines est remarquable. Bien qu'étant rare en Limousin l'espèce y a été homologuée chaque année.



Spatule Blanche *Platalea leucorodia*, octobre 2016,  
Lussat (23) B. Brunet.



Spatule Blanche *Platalea leucorodia*, octobre 2016,  
Lussat (23) J.P. Toumazet.

**MILAN HYBRIDE NOIR x ROYAL *Milvus migrans migrans* x *Milvus milvus* (0/0 - 1/1).**

Corrèze - Saint-Merd-de-Laplaud/Belvédère de Roc Grand, le 27/04/2016 (A. Virondeau).

Pour la première fois cet hybride est signalé dans la région. Les cas d'hybridation avérés entre ces 2 espèces sont extrêmement rares, d'autant plus que l'identification de cet hybride est complexe et on peut supposer que quelques individus passent inaperçus dans les secteurs où Milans noirs et royaux sont bien présents. Bien qu'il n'y ait pas eu de photo les caractéristiques observées mêlaient à la fois des critères de Milan noir et de Milan royal.

**ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (6/6 - 1/1).**

Haute-Vienne - Dournazac/La Gaudonie, le 27/08/2016 (M. Carsac, J. Guillaudeux).

Il s'agit de la 7<sup>ème</sup> observation homologuée par le CHR depuis 2009, toutes ont été réalisées dans l'ouest de la Haute-Vienne où l'espèce pourrait s'installer dans les années à venir vue la rapidité avec laquelle elle a colonisé plusieurs régions françaises depuis son arrivée en Aquitaine dans les années 90 (N. ISSA & Y. MULLER, 2015).

**VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (28/161 - 7/16).**

Corrèze - Malemort-sur-Corrèze/Les Gorses, le 26/05/2016 (J-M. Bigaud),

- Saint-Yreix-le-Déjalat/Puy de Viossanges, 4 ind. le 19/06/2016 (R. Petit, O. Villa).

Creuse - Bétête/Les Bracons, imm. le 18/05/2016, photo (D. Morsynski),

- Champsanglard/La Roche Lambert, le 24/05/2016 (S. Desrier),

- Evaux-les-Bains/La Poste le 16/06/2016 (P. Duboc).

Haute-Vienne - Eymoutiers/Ruisseau du Mas, 7 ind. le 25/05/2016 (N. Gendre),

Peyrat-de-Bellac/la Colline, 25/05/2016 (O. Agard).

Après l'année 2014 bien modeste et l'année blanche de 2015, l'espèce est observée dans les 3 départements. Ce qui est plutôt rassurant pour ce vautour qui, sans être abondant, était observé régulièrement en Limousin les années précédentes.



Vautour fauve *Gyps fulvus*, mai 2016,  
Bétête (23) D. Morsynski

**BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (7/6 - 1/1).**

Haute-Vienne - Bujaleuf/Chez Garaud, imm. Le 12/04/2016, photo (C. Lambert).

Le Busard pâle est cité sans discontinuer depuis 2012, année de sa première apparition en Limousin. L'observation de cet individu en migration pré-nuptiale s'explique par l'expansion de l'espèce en Europe occidentale. A noter également que cette année, une femelle de Busard pâle, baguée en Finlande en 2015, a probablement survolé l'ouest du Limousin le 19 septembre selon les suivis satellitaires.

[https://www.luomus.fi/en/female-pallid-harrier-potku#Potku\\_NOW](https://www.luomus.fi/en/female-pallid-harrier-potku#Potku_NOW)



Busard pâle *Circus macrourus*, imm., avril 2016, Bujaleuf (87) C. Lambert.

**AIGLE POMARIN ou CRIARD *Aquila pomarina / clanga* ( 2/2 - 1/1).**

Corrèze - Branceilles/Ferrand, le 08/12/2016 (M. Vérité).

Pour les oiseaux en migration active observés de loin, il s'avère très délicat de faire la distinction entre l'Aigle criard et l'Aigle pomarin. Il s'agit seulement de la 3ème observation homologuée pour ce type d'aigle dans la région.

**AIGLE ROYAL *Aquila chrysaetos* (6/5 - 1/1).**

Corrèze - Sexcles/Riouzal, ind. 1A le 31/10/2016 (M. André, A. André).

Cet individu est apparu tardivement en saison, les 6 contacts précédents étaient survenus entre avril et juillet. Cette observation ne déroge pas à la règle qui veut que la majorité des observations limousines surviennent sur le plateau de Millevaches, dans les gorges de la Dordogne ou à proximité.

**MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (14/22 - 5/5).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 19/08/2016 (G. Dubois),

- Lussat/Étang des Landes, ad. le 08/09/2016, photo (B. Brunet),

- Lussat/Étang des Landes, le 10/09/2016, photo (L. Ton, E. Ducos),

- Lussat/Étang des Landes, du 04/10/2016 au 12/10/2016, photo (F. Desage, B. Brunet et al.).

Haute-Vienne - Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration 1 minimum du 27/03/16 au 10/04/16, photo (M. Ruchon, Ch. Mercier).

Les 4 mentions de l'Étang des Landes sont un peu décevantes dans la mesure où elles ont été réalisées en dehors de la période de reproduction. Les contacts réalisés les années précédentes pouvaient suggérer une nidification possible.

L'observation quasi quotidienne de l'espèce et la forte pression d'observation laissent planer un doute sur le nombre de marouettes présentes durant une semaine à Limoges. Ce visiteur d'été est peu abondant en France, très discret et localisé.



Marouette ponctuée *Porzana porzana*, avril 2016,  
Limoges (87) Ch. Mercier.



Marouette ponctuée *Porzana porzana*, octobre 2016,  
Lussat (87) F. Desage.

**HÛTRIER PIE *Haematopus ostralegus* (2/2 - 1/1).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 30/03/2016 (K. Guerbaa).

Cette 3<sup>ème</sup> homologation régionale est la première à l'Étang des Landes. Elle survient après 2 années blanches. Les 2 mentions précédentes, haut-viennoises, avaient été enregistrées le lac de Saint-Pardoux et l'étang de la Cruzille à Saint-Sylvestre. L'espèce a toujours été très rare à l'intérieur des terres.

**ÉCHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus* (22/42 - 9/20).**

**Corrèze** - Neuvic/Antiges, mâle le 04/04/2016, photo (L. Ton),

- Aubazine/Étang du Coiroux, 3 mâles ad. le 08/04/2016, photo (P. Marthon),

- Liginiac/Le Maury (lac de la Triouzoune), cple ad. le 09/05/2016 (N. Gauthier),

- Aubazine/Étang du Coiroux, mâle ad. le 17/05/2016, photo (P. Marthon),

**Creuse** - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 31/03/2016 (K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, le 03/04/2016 (G. Dubois),

- Lussat/Étang des Landes, 8 ind. le 04/04/2016, photo (J.P. Toumazet),

- Lussat/Étang des Landes, le 06/04/2016 (J.P. Toumazet),

- Lussat/Étang des Landes, le 16/04/2016 (K. Guerbaa).

Le record des nombres d'individus et de citations est dépassé grâce aux 5 mentions pour 16 individus à l'Étang des Landes. Quasiment chaque année l'Échasse blanche fait une brève escale au plan d'eau du Coiroux et au lac de Neuvic. Classiquement ces apparitions sont survenues lors de la migration pré-nuptiale, curieusement aucun contact n'est enregistré en Haute-Vienne.



Échasse blanche *Himantopus himantopus*, 3 mâles ad.,  
avril 2016, Aubazine (19) P. Marthon.

**AVOCETTE ÉLÉGANTE *Recurvirostra avosetta* (19/72 - 2/11).**

**Corrèze** - Aubazine/Étang du Coiroux, ad. le 07/01/2016 (P. Marthon).

**Creuse** - Lussat/Étang des Landes, 10 ind. le 27/03/2016, photo (F. Beignon).

Avec seulement 2 mentions l'année est en deçà des précédentes. Généralement l'espèce est contactée lors des 2 migrations. L'apparition, début janvier à Aubazine, s'explique probablement par une expansion de l'espèce en France en période d'hivernage.



Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*,  
mars 2016, Lussat (23) F. Beignon.

**GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus* (0/0 - 1/1).**

Corrèze - Aubazine/Étang du Coiroux, fem. du 12/05/2016 au 14/05/2016, photo (P. Marthon).

C'est la première fois que ce gravelot est homologué. Cette première apparition corrézienne fait suite à celles d'avril 2003 à l'étang des Landes (23) et celui de la Mazère (87) en mai 1997. Le Gravelot à collier interrompu est rare à l'intérieur des terres où il apparaît le plus fréquemment lors de la migration pré-nuptiale. Cette observation respecte donc la phénologie migratoire de l'espèce.



Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*,  
mai 2016, Aubazine (19) P. Marthon.

**PLUVIER ARGENTÉ *Pluvialis squatarola* (11/16 - 1/1).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, du 15/10/2016 au 16/10/2016, photo (B. Brunet, K. Guerbaa, V. Primault, M. Ruchon).

Après une année blanche, avec ce seul individu, l'année est bien modeste pour cette espèce qui a été homologuée pour la première fois en 2012. Toutes les citations émanent de l'étang des Landes, c'est lors du passage post-nuptial que le Pluvier argenté est le plus fréquemment observé. Les individus contactés en octobre sont le plus souvent des immatures, le passage des adultes s'effectuant quelques semaines auparavant.





Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*,  
octobre 2016, Lussat (23) B. Brunet.

**BÉCASSEAU MAUBÈCHE *Calidris canutus* (1/1 - 1/2).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. 1A du 09/09/2016 au 11/09/2016, puis ind. jusqu'au 17/09/2016, photo (L. Ton, E. Ducos, B. Brunet, J.P. Toumazet).

Homologué pour la première fois l'année dernière, déjà à l'Étang des Landes, la présence de ces 2 individus en halte migratoire est intéressante car généralement les observations concernent des individus isolés. Cette espèce maritime est peu fréquente à l'intérieur des terres.



Bécasseau maubèche *Calidris canutus*, juvénile,  
septembre 2016, Lussat (23) J.P. Toumazet.

**BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (4/6 - 4/5).**

Corrèze - Neuvic/Plage du lac, le 12/05/2016, photo (L. Ton),

- Aubazine/Étang du Coiroux, ad. le 13/05/2016, photo (P. Marthon),

- Neuvic/Plage du lac, 3 ind. le 14/05/2016, photo (L. Ton, N. Gauthier).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. 1A du 29/09/2016 au 30/09/2016, photo (J.P. Toumazet, B. Brunet, G. Dubois).

Avec au moins 5 individus l'année est exceptionnelle pour cette espèce rare à l'intérieur

des terres. Bien que déjà été homologuée à Neuvic en 2011, les 3 données corréziennes, survenues à la mi-mai, sont inattendues. En Limousin le Bécasseau sanderling peut-être rencontré aux 2 migrations, comme le confirme le stationnement d'un individu en septembre à l'Étang des Landes.



Bécasseau sanderling *Calidris alba*,  
mai 2016, Neuvic (19) N. Gauthier.

**BÉCASSEAU MINUTE *Calidris minuta* (35/67 - 6/9).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. 1A du 17/08/2016 au 18/08/2016 (B. Brunet, M. Ruchon),

- Lussat/Étang des Landes, 3 ind. le 24/08/2016, (J.P. Toumazet),
- Lussat/Étang des Landes, le 25/08/2016 (G. Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, le 04/09/2016 (G. Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. 1A le 10/09/2016 (L. Ton, E. Ducos),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A le 09/10/2016, photo (R. Bussière, B. Brunet et al.).

Année normale pour cette espèce régulière sur l'Étang des Landes, lors de la migration postnuptiale. Les mentions automnales sont bien plus courantes que les mentions printanières pour cette espèce.

**BÉCASSEAU COCORLI *Calidris ferrugina* (21/54 - 4/4).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 19/08/2016 (B. Brunet),

- Lussat/Étang des Landes, le 05/09/2016 (B. Brunet),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A, le 12/09/2016, photo (B. Brunet),
- Lussat/Étang des Landes, le 24/09/2016 (G. Dubois).

Retour à la normale pour cette espèce qui curieusement n'avait pas été contactée l'an passé. Ce bécasseau est généralement rencontré lors de la migration postnuptiale et quasiment toutes les données ont pour origine l'Étang des Landes.

**BÉCASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus* (14/18 - 6/7).**

- Corrèze - Saint-Viance/Le Coudert, le 02/01/2016 (L. Ton),
- Saint-Viance/Le Coudert, du 15/02/2016 au 20/02/16, photo (L. Ton, Ph. Hubert),
- Aubazine/Chastagnol, de 1 à 2 ind. du 05/11/2016 jusqu'au 30/11/2016 (P. Marthon, M.L. Miège).

**Creuse** - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 24/09/2016 (K. Guerbaa),

**Creuse** - Champagnat/Étang de la Naute, le 29/12/2016 (J. Yvernault).

**Haute-Vienne** - Saint-Vaulry/Moulin de Rousset, le 05/04/2016 (H. Bourdin).

Bien que signalée dans les 3 départements, il est fort probable qu'en raison de sa discrétion la présence de cette espèce soit sous-estimée.



Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus*, février 2016, Saint-Viance (19) Ph. Hubert.

**BARGE À QUEUE NOIRE *Limosa limosa* (10/78 - 5/5).**

**Creuse** - Lussat/Étang des Landes, le 24/08/2016, photo (J.P. Toumazet),

- Lussat/Étang des Landes, le 30/08/2016, photo (D. & J. Carlier),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A le 17/09/2016, photo (B. Brunet),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A du 20/09/2016 au 09/10/2016, photo (B. Brunet, J.P. Toumazet et al.).

**Haute-Vienne** - Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat, le 02/09/2016 (J. Renaud).

Pour la première année la Barge à queue noire est homologuée en Haute-Vienne. L'Étang des Landes est de loin le site le plus attractif. Une grande majorité des données concerne le passage postnuptial.



Barge à queue noire *Limosa limosa*, septembre 2016, Lussat (23) J.P. Toumazet.



Barge à queue noire *Limosa limosa*,  
octobre 2016, Lussat (23) B. Brunet.

**COURLIS CORLIEU *Hydrocoloeus minutus* (6/6 - 1/1).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, du 12/04/2016 au 19/04/2016 (K. Guerbaa, D. Carlier).

A l'intérieur des terres, où il est rare, le Courlis corlieu préfère les grandes zones humides. A l'instar de 80 % des données précédentes cette observation est survenue lors de la migration prénuptiale. Il n'avait pas été homologué à l'Étang des Landes depuis 2011.

**TOURNEPIERRE À COLLIER *Arenaria interpres* (3/3 - 1/1).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. 1A du 04/09/2016 au 10/09/2016 photos (G. Dubois, L. Ton, E. Ducos, B. Brunet, N & D. Verger).

Après 4 années blanches, l'espèce apparaît à nouveau. Toutes les homologations concernent des oiseaux juvéniles observés lors de la migration postnuptiale. Pourtant les données anciennes montrent que des contacts peuvent être réalisés lors des deux phases migratoires.



Tournepierre à collier *arenaria interpres*,  
septembre 2016, Lussat (23) B. Brunet.

**GRAND LABBE *Stercorarius skua* (0/0 - 1/1).**

Corrèze - Lissac-sur-Couze/Lac du Causse, ind. +2A le 10/05/2016, photo (M. MAS, D. Crémoux).

Cette apparition ne fait pas suite à une grande tempête hivernale comme c'est généralement le cas. Pourtant à l'instar d'anciennes observations cet oiseau était affaibli, transporté au centre de soins il n'a pas survécu.

**GOÉLAND Railleur *Larus genei* (1/1 - 1/1).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 18/08/2016 (K. Guerbaa, G. Pallier, M. Ruchon, I. Mahu).

Seconde homologation régionale, une nouvelle fois à l'Étang des Landes, pour ce laridé méditerranéen. A la différence du contact précédent cette observation n'est pas survenue lors de la migration prénuptiale.

**MOUETTE PYGMÉE *Hydrocoloeus minutus* (28/50 - 7/36).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, ad. du 12/04/2016 au 13/04/2016 (K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, 11 ad. le 15/04/2016 (K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A, le 19/08/2016, photo (J.P. Toumazet, B. Brunet, G. Dubois),

- Lussat/Étang des Landes, le 21/08/2016 (M. Ruchon),

- Lussat/Étang des Landes, 16 ind. 1A le 07/09/2016, photo (J.P. Toumazet),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A le 22/09/2016 (K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, 5 ind. le 29/09/2016, photo (B. Brunet).

Une nouvelle fois, toutes les mentions limousines de 2016 proviennent de l'Étang des Landes. Les mouettes pygmées se reproduisent dans l'est et le nord de l'Europe, régions qu'elles quittent en hiver. C'est lors des passages migratoires qu'on peut rencontrer l'espèce dans la région, même si les occasions sont rares et manifestement limitées à l'Étang des Landes. Classiquement, les contacts sont beaucoup plus nombreux lors de la migration postnuptiale.



Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus*, 1A,  
août 2016, Lussat (23) J.P. Toumazet.

**MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *Larus melanocephalus* (22/32 - 4/4).**

**Corrèze** - Sérandon/Barrage de la Triouzoune, ad. le 05/04/2016, photo (L. Ton, N. Gauthier),

- Albussac/Roche-de-Vic, ind. 1A le 26/08/2016, photo (D. Testaert),

**Creuse** - Lussat/Étang des Landes, ad. le 09/07/2016 (G. Dubois).

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A le 18/08/2016 (M. Ruchon, K. Guerbaa, B. Lacorre, Q. Giraud).

A la différence de 2015, la majorité des observations sont survenues lors de la migration postnuptiale qui est généralement la moins importante. L'observation d'un individu en migration active en Corrèze en août est totalement inattendue. La première apparition de l'espèce en Limousin remonte à 1996 et au fil des ans on perçoit une augmentation du nombre d'observations.



Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*, ad.,  
avril 2016, Sérandon (19) N. Gauthier.



Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*, 1A,  
août 2016, Albussac (19) D. Testaert.

**GOÉLAND cendré *Larus canus* (13/19 - 4/8).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 4 ind. (3 ad. et imm.) le 02/12/2016, photo (B. Brunet),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 2A le 03/12/2016, photo (L. Ton, E. Freyssinaud Mas de Feix et al.),

- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. (1 A et 2A) du 14/12/2016 au 17/12/2016 du (K. Guerbaa, J. Yvernault, F. et A. Van Rooij),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 2A le 27/12/2016, photo (B. Pellegrini, A. Corre, J-L et M. Pellegrini, A. Audevard).

Ce goéland nordique se rencontre essentiellement en Limousin de novembre à février. Conformément à la phénologie habituelle de l'espèce toutes ces observations sont survenues en décembre. Une nouvelle fois, l'Étang des Landes regroupe la totalité des données. L'arrivée d'un groupe de 4 individus est à signaler car généralement les contacts concernent des oiseaux isolés.



Goéland cendré *Larus canus*, 2 A,  
décembre 2016, Lussat (23) L. Ton.



Goéland cendré *Larus canus*,  
décembre 2016, Lussat (23) B. Brunet.

**GOÉLAND MARIN *Larus marinus* (0/0 - 1/1).**

Corrèze - Aubazine/Étangdu Coiroux, ad. le 23/02/2016 (P. Marthon).

Première homologation régionale pour ce goéland qui s'éloigne rarement des côtes atlantiques même en hivernage. Auparavant l'espèce avait été citée à 6 reprises et toujours avec des oiseaux solitaires ce qui est le plus souvent le cas à l'intérieur des terres.

**GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias leucopterus* (3/3 - 2/2).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, ad. le 06/05/2016 (M. Rizza, M. T. Heide),  
- Lussat/Étang des Landes, le 10/05/2016, photo (J.P. Toumazet et al.).

A l'instar des 3 homologations déjà enregistrées, elles sont survenues à l'Étang des Landes. Toutes les apparitions régionales ont eu lieu en mai, généralement lors de la première décade. Dans nos régions les citations concernent généralement des oiseaux isolés. Ce nicheur du sud-est de l'Europe demeure extrêmement rare chez nous.



Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*,  
mai 2016, Lussat (23) J.P. Toumazet.

**STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* (1/2 - 2/8).**

Haute-Vienne - Videix/Grand-Pré 6 ind. le 17/07/2016 (J.B. Couturier).

Creuse - Royère-de-Vassivière/La Vergne, 2 ind., le 14/08/2016 (J.C. Sautour).

L'unique homologation de cette sterne très rare à l'intérieur des terres remontait à mai 2014. Toutes les citations enregistrées dans la base de données de la SEPOL concernent des oiseaux observés lors du passage pré-nuptial. La date la plus tardive était un 22 juin. Cette année, pour la première fois en Limousin, la Sterne caugek est signalée en juillet et en août.

**STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo* (23/39 - 9/15).**

Corrèze - Neuvic/Antiges, ad. le 14/05/2016 (L. Ton).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 13/04/2016 (K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, 4 ad. le 15/04/2016 (K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, le 05/05/2016 (G. Dubois),

- Lussat/Étang des Landes, 3 ind. dont 2ad. le 06/06/2016 (A. Virondeau),

- Lussat/Étang des Landes, imm. le 07/06/2016 (K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 22/06/2016 (D. & J. Carlier),

- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 26/06/2016 (G. Dubois).

- Lussat/Étang des Landes, ad. le 09/07/2016 (G. Dubois).

Cette sterne est la plus commune à l'intérieur des terres. Depuis le début des années 2000 un accroissement important des observations est constaté en Limousin essentiellement lors du passage pré-nuptial. Une nouvelle fois l'Étang des Landes regroupe une grande majorité des données. Ce site est probablement le seul de la région à pouvoir accueillir durablement la Pierregarin.

**COUCOU GEAI *Clamator glandarius* (1/1 - 1/1).**

Corrèze - Peyrelevade/Étang de Rebière-Nègre, le 16/08/2016 (O. Villa).

Seconde apparition de cette espèce méditerranéenne en Limousin. La première donnée était survenue fin juillet 2011 à Aubazine en Corrèze. Le début d'été est un des moments le plus propice pour l'observer un peu partout en France, mais le Coucou geai demeure quand même très rare en dehors du midi méditerranéen.



**PETIT-DUC SCOPS *Otus scops* (2/2 - 3/3).**

**Corrèze** - Millevaches/Puy de la Tour, le 28/09/2016, mort choc avec véhicule, photo (T. Vansteenkeste),

- Chaumeil/Chastagnol, le 08/06/2016, (G. Nonique-Desvergnès).

**Creuse** - Saint-Loup/Fleuraguet, le 09/06/2016 au 11/06/2016, enregistrement du chant G. Dubois).

Ces trois contacts sont d'autant plus surprenants qu'ils ont été réalisés à l'est du Limousin et sur la Montagne Limousine, alors que le sud et l'ouest de la région lui sont plus favorables. Bien que n'ayant jamais été très abondante, ces dernières années, il semblerait que l'espèce se fasse de plus en plus rare.

**PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris* (15/17 - 3/4).**

**Corrèze** - Beynat/Puy d'Eyzat, le 12/04/2016 (P. Marthon),

- Voutezac/Sajueix, le 27/08/2016 (L. Ton).

**Haute-Vienne** - Linards/Grands-Champs-de-Laujaumont 2 ad. le 23/04/2016 (G. Labidoire).

La donnée haut-viennoise est la plus remarquable car les 3/4 des données homologuées proviennent du sud et du sud-ouest corrézien. Malheureusement cette espèce ne semble plus faire partie de notre avifaune nicheuse, une des causes est probablement la disparition du pâturage extensif dans les secteurs qu'elle occupée au sud de la Corrèze. Ses bastions de nidification sont essentiellement méditerranéens.

**BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrelli* (2/2 - 3/3).**

**Corrèze** - Chabignac/La carrière, le 21/02/16 (L. Ton),

- Ambrugeat/lac de Séchemaille, fem. +1A le 21/02/16 (R. Petit),

- Condat-sur-Ganaveix/Le Mons, le 28/02/16 (A. & S. Gendeau).

La première homologation régionale date de 2010. Ces 3 données sont survenues fin février quand ce taxon regagne ces quartiers de reproduction dans le nord-ouest de l'Europe. Ces dernières années une augmentation des observations est constatée en France.

**ACCENTEUR ALPIN *Prunella collaris* (26/16 - 1/1).**

**Corrèze** - Sérandon/Bélvédère de Gratte-Bruyère, le 23/03/2016, photo (L. Ton, C. Roy).

Le retour de cet oiseau montagnard est bien modeste mais il intervient après 2 années blanches. L'année 2012 et à degré moindre 2013 cumulent un nombre important de citations. Le relief accidenté des gorges de la Dordogne est parfaitement adapté à son hivernage.



Accenteur alpin *Prunella collaris*,  
février 2016, Sérandon (19) C. Roy

**GORGEBLEUE À MIROIR *Luscinia svecica* (89/160 - 5/>28).**

**Corrèze** - Voutezac/Le Moulin-Bas, mâle ad. le 19/03/2016 (L. Ton),

- Millevaches/Grands Prés, mâle ad. le 07/09/2016 (O. Villa).

**Creuse** - Lussat/Étang des Landes, de 1 à 3 ind. du 10/09/2016 au 12/09/2016 (L. Ton, E. Ducos, N. & D. Verger et al.).

- Lussat/Étang des Landes, 19 ind. (7 mâles 1A, 4 fem. 1A, fem +1A, 8 ind. SP 1A) bagués du 13/08/2016 au 26/08/2016, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa).

**Haute-Vienne** - Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, 21 citations entre le 21 mars et le 12 avril, et 10 citations entre le 29 août et le 9 septembre. Le maximum d'individus contactés le même jour est de 2, c'était les 21 et 30 mars et les 2 et 4 septembre.

L'attractivité de l'Étang des Landes et du petit marais proche de la station d'épuration de Limoges est une nouvelle fois démontrée lors des 2 phases migratoires. La donnée de Millevaches montre que l'espèce peut-être contactée à toutes les altitudes en Limousin. Une prospection plus approfondie sur les bassins des eaux riches en hélophytes et des secteurs buissonnants en milieux agricoles ouverts apporterait certainement d'autres découvertes de gorgebleues lors des haltes migratoires.



Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*, mâle, mars 2016, Limoges (87) N. Lagarde.

**CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis* (8/10 - 6/7).**

**Corrèze** - Sainte-Fortunade/Étang Barreau le 26/03/2016 (P. Marthon).

**Creuse** - Sagnat/Les Genètes, 2 ind. le 26/04/2016 (T. Cheyzeau),

- Lussat/Étang des Landes, type femelle le 10/09/2016 (L. Ton, E. Ducos),

- Lussat/Étang des Landes, le 29/09/2016 (K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, le 01/12/2016 (K. Guerbaa).

**Haute-Vienne** - Ambazac/Étang Jonas, du 27/12/2016 au 29/12/2016 (E. Freyssinaud Mas de Feix).

Année record en terme d'apparitions, l'augmentation des observations est probablement liée à la douceur des derniers hivers. En Limousin les habitats favorables sont

nombreux, une implantation durable de la Cisticole des joncs peut-être envisagée à conditions que les hivers ne soient pas trop rudes. L'espèce est désormais bien implantée dans les régions voisines notamment en Poitou-Charentes.

**LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE *Locustella luscinioides* (5/5 - 2/2).**

**Creuse** - Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 16/08/2016, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, ind. +1A bagué le 26/08/2016, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa).

Une nouvelle fois, grâce aux activités de baguage ce passereau paludicole est détecté à l'Étang des Landes lors de son passage postnuptial. Rares en Limousin sont les milieux pouvant l'accueillir. Ces oiseaux très discrets ne sont pas évidents à détecter.

**PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola* (2/2 - 1/1).**

**Creuse** - Lussat/Étang des Landes, ind. +1A bagué le 24/08/2016, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa).

Pour cette espèce très discrète, toutes les données sont fournies grâce à l'efficacité de l'équipe des bagueurs de l'Étang des Landes. Nichant en Europe orientale et hivernant en Afrique le passage est assez régulier mais il concerne probablement très peu d'individus en fin d'été.

**PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus* (119/477 - 14/<108).**

**Corrèze** - Meyssac/Les Cils (STPE), du 28/02/2016 au 07/03/2016, photo (M. Vérité),

- Saint-Viance/Le Couderc, le 31/08/2016 (L. Ton).

**Creuse** - Lussat/Étang des Landes, 22 citations du 24/03/2016 au 10/06/2016,

- Lussat/Étang des Landes, 12 citations du 15/06/2016 au 10/07/2016,

- Lussat/Étang des Landes, 7 citations du 15/08/2016 au 30/08/2016,

Nota : le maximum d'oiseaux contactés simultanément est de 3 ind. Le 25/05/2016 et le 22/06/2016,

- Lussat/Étang des Landes, 96 ind. bagués du 13/08/2016 au 07/10/2016, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A contrôlé le 17/08/2016 bague origine Angleterre, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A contrôlé le 24/08/2016 bague origine Belgique, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A contrôlé le 26/08/2016 bague origine Pays-Bas, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A contrôlé le 26/08/2016, bague origine France, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa).

**Haute-Vienne** - Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, 11 citations du 12/04/2016 au 28/04/2016. Le maximum d'oiseaux contactés simultanément est de 2 ind. les 16, 17 et 24/04/2016 2016.

- Nedde/Cité des insectes, le 27 août 2016 (J. Barataud),

- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, le 30 août 2016 (Ch. Mercier),

- La Jonchère-Saint-Maurice/Étang de la Jonchère, le 01/08/2016 (E. Freyssinaud Mas de Feix).

Observée dans les 3 départements, lors des deux passages migratoires, cette petite fauvette aquatique voit cette année une explosion du nombre de ses citations. Année record aussi au camp de baguage de l'Étang des Landes avec une centaine de Phragmites des joncs capturés. On retiendra aussi le contrôle de 3 individus de première

année originaires d'Angleterre, Belgique et Pays-Bas.

Avec de nombreuses données en période favorable, l'espèce est probablement nicheuse à l'Étang des Landes. Toutefois, le Limousin se trouve dans la partie méridionale de sa zone de nidification.



Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*,  
avril 2016, Limoges (87) E. Le Roy.

**ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* (1/1 - 1/1).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 13/08/2016, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa).

Pour la seconde année consécutive l'espèce est mentionnée à l'Étang des Landes, une nouvelle fois grâce à l'équipe des bagueurs. Ses affinités sont beaucoup plus nordiques qu'autrefois.

**ROUSSEROLLE TURDOÏDE *Acrocephalus arundinaceus* (6/8 - 4/6).**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. (1A et +1A) bagués le 13/08/2016, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 18/08/2016, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 23/08/2016, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),

- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. 1A bagués le 24/08/2016, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa).

Seuls les programmes de baguage à l'Étang des Landes ont permis de détecter cette rousserolle. Depuis 1977 sa reproduction n'a plus été documentée sur ce site. Un déclin de l'espèce est noté un peu partout en Europe.

**FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (10/10 - 3/3).**

Haute-Vienne - Meuzac/Lande du Cluzeau, le 23/01/16 (M. Buy),

- Bussière-Boffy/Butte de Frochet, min 1 ind. le 10/06/2016 (G. Labidoire),

- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, le 16/10/2016, photo (E. Le

Roy).

Dans la continuité de 2015, la Pitchou est encore bien représentée sur 2 de ses bastions traditionnels la Butte de Frochet et la Lande du Cluzeau. L'observation sur un petit marais à Limoges montre que l'espèce effectue des déplacements hors de ses sites traditionnels. La douceur des derniers hivers laisse envisager de nouvelles implantations de cette petite fauvette. Mais une période de gel ou de neige inhabituelle peut décimer une population qui se reconstituera très lentement.

**POUILLOT DE SIBÉRIE *Phylloscopus collybita tristis* (0/0 - 1/1).**

Haute-Vienne - Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, le 10/10/2016, photo (Ch. Mercier).

Après 2015, avec la première apparition d'un Pouillot de type sibérien, les ornithologues régionaux espéraient contacter le Pouillot de Sibérie. Les critères de reconnaissance de ces taxons aujourd'hui mieux définis et les progrès de l'ornithologie de terrain laissent envisager de nouvelles observations dans les prochaines années. Ce taxon est rarement observé à l'intérieur des terres où généralement la pression d'observation est moindre que sur les côtes océaniques notamment bretonnes.



Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis*,  
octobre 2016, Limoges (87) Ch. Mercier.

**RÉMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* (54/146 - 34/95).**

Corrèze - Vutezac/Le Moulin-Bas, mâle le 23/04/2016, photo (L. Ton).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 4 ind. le 08/04/2016, photo (D. Carlier),

- Lussat/Étang des Landes, plus de 20 citations du 27 septembre au 23 octobre 2016, une quinzaine d'ind. le 07/10/2016,

- Lussat/Brande de Tête-de-Bœuf, le 02/10/2016 (P. Duboc).

- Lussat/Étang des Landes, 50 ind. bagués du 28/09/2016 au 15/10/2016 baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, ind. +1A contrôlé le 01/10/2015, bagué en Espagne, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa).

**Haute-Vienne** - Limoges/Marais de la Basse, mâle ad. le 20/03/2016, photo (Ch. Mercier),

- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, le 01/04/2016 (E. Biarneix),
- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, mâle le 03/04/2016, photo (Ch. Mercier, Ph. Hubert, M. Leroy),
- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, 4 ind. dont mâle le 06/04/2016, photo (F. Desage, Ch. Mercier),
- Limoges/Marais de la Basse, 4 ind. le 06/04/2016 (F. Taboury),
- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, ind. 1A le 05/10/2016 (E. Le Roy),
- Verneuil-sur-Vienne/Les Granges, 4 ind. (mâle ad., fem. ad., 2 ind. 1A) le 07/10/2016, photo (E. Le Roy),
- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, 2 ind. (mâle ad. et 1A) du 08/10/2016 au 09/10/2016, photo (E. Le Roy),
- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, 2 mâles ad. Le 12/10/2016, photo (F. Desage).

Avec 49 individus l'année 2015 avait été remarquable, l'année 2016 est exceptionnelle avec près d'une centaine d'individus recensés dans la région. Le petit marais de la station d'épuration de Limoges et l'Étang des Landes fournissent la majorité des données. Les programmes de baguage de l'Étang des Landes fournissent la moitié des données. On retiendra aussi le contrôle de cette rémiz baguée en Espagne. Comme en 2015, la Corrèze enregistre une seule citation.



Rémiz penduline *Rémiz pendulinus*, avril 2016,  
Limoges (87) Ch. Mercier.

**MOINEAU SOULCIE *Petronia petronia* (1/1 - >7/16).**

**Corrèze** - Ayen/Sur le puy, le 21/02/2016 (L. Ton),

- Neuville/Pradix, de 1 ind. à 5 ind. du 03/07/2016 au 23/07/2016, puis 4 ind. Le 06/10/2016 et 2 ind. le 01/12/16, photo (M.L. Miège, D. Testaert),

- Albussac/Prézat, le 02/11/2016 (L. Ton),

- Chauffour-sur-Vell/Coquart, 2 ind. le 02/11/2016 (L. Ton, V. Escuriol),

- Albussac/Malmaury, le 07/11/2016 (D. Testaert).

Le secteur d'Albussac/Neuville enregistre la majorité des données. Il permet d'espérer que quelques populations se soient maintenues en Limousin. Des prospections ciblées dans le sud de la région permettraient d'affiner le statut de cette espèce très localisée.



Moineau soulcie *Petronia petronia*, juillet 2016,  
Neuville (19) M-L. Miège.

**SIZERIN FLAMMÉ *Carduelis flamma* (15/57 - 1/30).**

**Haute-Vienne** - Sauviat-sur-Vige/La Quaire, 30 ind, dont 4 ou 5 mâles adultes le 14/01/2016, photo (G. Labidoire).

Cet effectif est remarquable, mais avec la douceur répétitive des hivers cette espèce risque de devenir de plus en plus rare au fil des années.



Sizerin flammé *Carduelis flammae*, janvier 2016  
Sauviat-sur-Vige (87)  
G. Labidoire

**BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (12/27 - 4/6).**

**Corrèze** - Vutezac/Le Moulin-Bas, 3 ind. le 23/04/2016, photo (L. Ton),

- Saint-Viance/Lérigé, mâle le 24/04/2016 (L. Ton),

- Albussac/Le Mas, le 10/09/2016 (D. Testaert).

**Creuse** - Saint-Pierre-la-Feuille/La Barrière, mâle le 24/04/2016 (Ch. Lyons).

Ces observations sont survenues pratiquement à la même date lors de la migration pré-nuptiale. Ce sont probablement des oiseaux nordiques qui traversent notre pays. Dans certains pays scandinaves les populations sont au bord de l'extinction. Il niche encore dans le midi de la France mais ses effectifs ont fortement baissé. Depuis longtemps le Bruant ortolan ne niche plus en Limousin.

**DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2016 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE C  
(Espèces introduites ayant fait souche).**

**BERNACHE DU CANADA *Branta canadensis* (13/45 - 7/22).**

**Creuse** - Châtelus-Malvaleix/Le Mail, 2 ind. le 20/12/2016 (D. Morzynski).

**Haute-Vienne** - Saint-Just-le-Martel/Fontaguly, 4 ind. le 16/03/2016 (G. Labidoire),

- Benayes/Étang des Bois 4 ind. le 01/04/2016, photo (J. Minjoulat-Rey et E. Chatain),

- Saint-Just-le-Martel/Fontaguly, cple, couvaion les 13/04/2016 et 21/04/2016 (G. Labidoire, M. Buy),

- Benayes/Étang des Bois, le 29/04/2016, photo (J. Minjoulat-Rey et E. Chatain),

- Saint-Léonard-de-Noblat/Farebout, 5 ind. le 16/08/2016 (F. Lepetit),

- Saint-Léonard-de-Noblat/Passage à niveau n° 18, 3 ind. Le 28/08/2016 et le 15/09/2016 (F. Lepetit, C. Lambert).

Des individus issus des populations férales continuent d'apparaître ici et là. L'observation de décembre pourrait suggérer l'arrivée de migrants nordiques. Si on n'y prend garde on pourrait assister rapidement à une explosion des populations de cette



espèce allochtone.



Bernache du Canada *Branta canadensis*, septembre 2016, Saint-Léonard-de-Noblat (87) C. Lambert.

**OUETTE D'ÉGYPTE *Alopochen œgyptiaca* (11/25 - 2/5).**

Haute-Vienne - Compreignac/Moulin-de-Chabanne , 2 ind. le 18/02/2016 (J. Renaud),  
- Aixe-sur-Vienne/Pont sur la Vienne, 3 ind. du 14/09/2016 au 22/09/2016, photo (C. Boissou, E. Morange).

Chaque année, le plus souvent en Haute-Vienne quelques individus probablement échappés de captivité sont signalés.



Ouette d'Égypte *Alopochen œgyptiaca*, septembre 2016, Aixe-sur-Vienne (87) E. Morange.

**TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (18/34 - 7/9).**

Corrèze - Chanteix/Jardin Militolus, ind. en vol le 26/04/16 (J. Barataud).

Creuse - Lussat/Étang des Landes, fem. du 24/06/2016 au 15/08/2016 photo (J.P. Toumazet),

- Lussat/Étang des Landes, 2 fem. le 18/08/2016 (K. Guerbaa et al).

- Lussat/Étang des Landes, mâle ad. du 15/10/2016 au 27/10/2016 (B. Brunet, J.P. Toumazet, D. & J. Carlier).

Haute-Vienne - Peyrat-le-Château/Étang, le 03/06/2016 (G. Labidoire),

- Limoges/petit marais proche de la station d'épuration, le 25/04/2016 (Ch. Mercier),

- Saint-Jouvent/les Bordes, 3 ind. le 28/08/2016 (Ph. Hubert).

Pour la plupart de ces observations l'origine captive ne fait pas de doute. Les observations d'espèces allochtones sont récurrentes à Saint-Jouvent. L'oiseau de Chanteix pourrait éventuellement suggérer un individu sauvage en migration.



Tadorne de Casarca *Tadorna ferrugina*, juillet 2016, Lussat (23) J. P. Toumazet.

**CANARD MANDARIN *Aix galeruculata* (18/23 - 2/2).**

Corrèze - Servières-le-Château/Lac de Feyt, mâle ad. du 03/12/2016 au 05/12/2016, photo (M.L. Miège).

Haute-Vienne - Razés/Lac de Saint-Pardoux, fem. du 20/12/2016 au 30/12/2016 (N. Lagarde).

Bien que l'espèce ait déjà niché dans la région et que des oiseaux s'échappent régulièrement de captivité, l'hypothèse d'hivernants de populations nordiques également issues d'introduction ne peut pas totalement être exclue.



Canard mandarin *Aix galeruculata*, décembre 2016, Servières-le-Château (19) M.L. Miège.

**FAISAN VÉNÉRÉ *Syrnaticus reevesii* (0/0 - 1/1).**

Haute-Vienne - Pageas/La Betoulle, mâle le 28/04/2016, photo (Ch. Couartou),  
- Limoges/La Forêt, fem. le 13/12/2016 (C. Boissou).

Espèce originaire de Chine, les oiseaux observés en Limousin sont issus de lâchers cynégétiques. Le premier oiseau s'est montré agressif, comportement fréquent chez ces oiseaux d'origine captive.



Faisan vénéré *Syrmaticus reevesii*, avril 2016, Pageas (87)Ch. Couartou.

**DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2016 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE E (espèces dont l'origine est probablement captive).**

Les oiseaux mentionnés ci-dessous ne peuvent évidemment pas être considérés autrement que provenant de captivité...

**OIE À TÊTE BARRÉE *Anser indicus* (1/1 - 2/2).**

Haute-Vienne - Chaillac/Ile de Chaillac, le 20/03/2016 (D. Naudon),  
- Flavignac/Étang Saint-Fortunat, le 16/05/2016 (P. Précigout),

**CANARD DE CHILOÉ *Anas sibilatrix* (0/0 - 1/1).**

Corrèze - Argentat/Le Sablier, du 21/09/2016 au 04/10/2016, photo (M-L. Miège, D. Testaert).



Canard de Chiloé *Anas sibilatrix*, septembre 2016,  
Argentat (19) Ch. M.L. Miège.

**CANARD CAROLIN *Aix sponsa* (3/7 - 3/3).**

Corrèze - Égletons/Lac du Deiro, le 24/03/2016 (M. Mas),

- Saint-Viance/le Pradel, le 31/08/2016 (L. Ton),

- Soudeilles/Lac du Deiro, mâle ad. le 08/12/2016, photo (M.L. Miège).

Haute-Vienne - Nexon/Étang de la lande, le 15/01/2016 (J.M. Célérier).



Canard carolin *Aix sponsa*, décembre 2016,  
Égletons (19) M.L. Miège.

**PERRUQUE À COLLIER *Psittacula krameri* (4/4 - 2/3).**

Corrèze - Sérandon/Douniol le 23/11/2016 (M. Laprun).

Creuse - Montboucher/Védrenas 2 ind. le 23/12/2016 (G. Labidoire).

Bien que l'espèce fasse souche dans les grandes agglomérations, ces individus sans aucun doute, sont des échappés de captivité.

## OBSERVATIONS NON HOMOLOGUÉES DE 2016

Le CHR rappelle que la non-homologation ne préjuge pas de l'identité de l'oiseau et encore moins de la compétence ou de la crédibilité de l'observateur. Elle est généralement induite par le manque d'éléments descriptifs, voire l'absence totale de description. Il est donc conseillé d'apporter le plus d'informations possibles même si l'identification semble aisée. Une photo peut parfois s'avérer insuffisante.

**AIGLE POMARIN ou CRIARD *Aquila pomarina / clanga***

Corrèze - Sérandon/La Trainière, le 03/04/2016 et le 06/04/2016.

Les éléments fournis ne permettent pas de certifier formellement une de ces 2 espèces. Parmi les hypothèses évoquées celle d'un oiseau échappé de captivité ne peut-être exclue.

**FAUCON KOBÉZ *Falco vespertinus*.**

Corrèze - Liginiac/Le Coudeil, type fem. le 17/09/2016.

Les photos et la description manquent de robustesse pour éliminer avec certitude un Faucon hobereau, même si l'identification proposée paraît tout-à-fait possible.

**COURLIS CORLIEU *Hydrocoloeus minutus*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 04/04/2016.

Un couple de Courlis cendré était présent à cette période sur le site. La description ne permet pas d'éliminer totalement la confusion avec une femelle de Courlis cendré.

**BÉCASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus*.**

Haute-Vienne - Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat le 01/05/2016.

Absence de description.

**GOÉLAND BRUN *Larus fuscus*.**

Haute-Vienne - Saint-Yreix-la-Perche/Saint-Yreix-la-Perche le 29/02/2016.

Absence de description.

**STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*.**

Creuse - Royère-de-Vassivière/Le Plianchier, 2 ind. Le 07/08/2016.

Absence de description.

**HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 06/11/2016.

La description est insuffisante, la possibilité que cet oiseau soit un Hibou moyen-duc ne peut pas être totalement éliminée.

Haute-Vienne - Fromental/Bois du Lac, le 29/12/2016.

Le manque de critères déterminants ne permet pas de certifier l'espèce.

**PETIT-DUC SCOPS *Otus scops*.**

Haute-Vienne - Compreignac/Puy Chagot, le 04/10/2016.

Le seul critère du chant était insuffisant pour homologuer cette donnée. Au mois d'octobre la plupart des individus ont quitté notre région, les retardataires à cette période sont peu enclin à chanter, la phase de reproduction étant terminée depuis longtemps.

**COCHEVIS HUPPÉ *Galerida cristata*.**

Haute-Vienne - Mézières-sur-Issoire/La Sipièrre, le 07/07/2016.

Absence de description.

**PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris*.**

Corrèze - Saint-Cernin-de-Larche/Dolmen de la Palein, le 22/08/2016.

Des éléments sont concordants mais l'oiseau n'a pas été confirmé visuellement.

**RÉMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus*.**

Corrèze - Neuvic/Le Ponteil, le 05/10/2016.

L'oiseau était un peu loin, malgré quelques éléments concordants il n'a pas pu être confirmé visuellement.

Haute-Vienne - Isle/Mas de l'Aurence, le 27/09/2016.

La description est insuffisante d'autant plus que cette observation est survenue dans un milieu totalement inhabituel.

**BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*.**

Corrèze - Albussac/Le Mas, le 10/09/2016.

La description est insuffisante pour un oiseau non contrôlé visuellement.

**CANARD À COLLIER NOIR *Callonetta leucophrys*.**

Haute-Vienne - Aix-sur-Vienne/La Vienne au pont d'Aix-sur-Vienne, le 22/09/2016.

L'identification est peut-être la bonne, mais la photo ne permet pas de trancher sachant que l'hybridation ne peut pas être exclue.

**OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DES ANNÉES ANTÉRIEURES**

Le CHR du Limousin prend toujours en compte les observations effectuées depuis la date de sa création le 01/01/2009.

**OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE 2009**

**HARLE BIÈVRE *Mergus merganser*.**

Haute-Vienne - Beaumont du Lac/Lac de Vassivière, 3 ind. le 01/02/2009 (L. Fleytou).

**PLONGEON IMBRIM *Gavia immer*.**

Haute-Vienne - Saint-Pardoux/Le lac (bassin ouest), imm. le 04/01/2009, photo (Ch. Mercier),

- Saint-Pardoux/Le lac (bassin ouest), imm. le 29/12/2009, photo (Ch. Mercier).



Plongeon imbrin *Gavia immer*  
janvier 2009,  
Saint-Pardoux (87) Ch. Mercier.

**CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides*.**

- Lussat/Étang des Landes, le 09/07/2009 (G. Dubois).

**MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 28/08/2009 (Ch. Mercier),  
- Lussat/Étang des Landes, le 02/09/2009 (Ch. Mercier).

**STERNE NAINE *Sternula albifrons*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 08/05/2009 (L. Fleytou).

## OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE 2010

**PLUVIER ARGENTÉ *Pluvialis squatarola*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 08/10/2010 (Ch. Mercier).

**BÉCASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 16/09/2010 (N. Deschaumes).

**BÉCASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus*.**

Haute-Vienne - Magnac-Laval/La Sagne Coudou, le 25/12/2010 (Q. Guibert).

**MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla*.**

Haute-Vienne - Beaumont du Lac/Lac de Vassivière, ind. 1A le 04/12/2010 (Ch. Mercier).

**HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*.**

Haute-Vienne - Panazol/Place de Fargeas, le 28/09/2010 (Ch. Mercier).

**RÉMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. 1A le 08/10/2010, photo (Ch. Mercier).



Rémiz penduline *Remiz pendulinus*  
ind 1A, octobre 2010,  
Lussat (23) Ch. Mercier.

## OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE 2011

**GARROT À ŒIL D'OR *Bucephala clangula*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, fem. le 19/02/2011 (N. Deschaumes).

**SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 15/09/2011 (Ch. Mercier).

- Lussat/Étang des Landes, imm. le 29/09/2011 (Ch. Mercier).

**COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, imm. le 29/09/2011 (Ch. Mercier).

**GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias leucopterus*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, imm. le 24/04/2011 (G. Dubois).

## OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE 2012

**HARLE BIÈVRE *Mergus merganser*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, type fem. le 29/12/2012 (H. Samain, J. et J. Fombonnat).

**SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, imm. le 28/05/2012 (G. Dubois).

**BÉCASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 4 ind. 1A le 02/09/2012 (N. Deschaumes),

- Lussat/Étang des Landes, 8 ind. le 09/09/2012 (G. Dubois).

**BARGE À QUEUE NOIRE *Limosa limosa*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 09/09/2012 (G. Dubois).

**CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 09/09/2012 (G. Dubois).

**GOÉLAND BRUN *Larus fuscus*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 4ind. +1A le 29/12/2012 (H. Samain, J. et J. Fombonnat).

## OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE 2014

**SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 11/05/2014 (G. Dubois).

**BÉCASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 28/09/2014 (G. Dubois).

## OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE 2015

**BARGE À QUEUE NOIRE *Limosa limosa*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 10/04/2015 (G. Dubois).



**BÉCASSEAU MINUTE *Calidris minuta*.**

Creuse - Lussat/Étang des Landes, 3 ind. le 04/10/2015 (G. Dubois).

**OBSERVATIONS DES OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTÉES PAR LE COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL EN 2016**

**HARLE COURONNÉ *Lophodytes cucullatus* (catégorie E).**

Creuse - Saint-Agnan de Versillat/La Peyre, cple le 18/04/2016 (A. Bruere).



Harle couronné *Lophodytes cucullatus*,  
avril 2016,  
Saint-Agnan de Versillat (23)  
A. Bruere

**REMERCIEMENTS :**

*Le CHR du Limousin remercie chaleureusement celles et ceux qui ont contribué à sa bonne marche :*

- *tous les observatrices et les observateurs de plus en plus nombreux qui se sont prêtés au jeu.*
- *les photographes qui ont mis à disposition leurs clichés, souvent de remarquable qualité.*
- *Karim Guerbaa pour la transmission de ses données sur la réserve naturelle nationale de l'Étang des Landes, notamment celles de baguage,*
- *la SEPOL pour son soutien logistique et l'accès à sa base de données.*

**BIBLIOGRAPHIE**

COMMISSION AVIFAUNISTIQUE FRANÇAISE, 2011. Liste 2011 des Oiseaux de France du Paléarctique Occidental. *Ornithos* 18-3, I-XXVIII.

CROCHET P.-A., DUBOIS P. J., JIGUET F., LE MARECHAL P., PONS J.-M. & YESOU P. (2016). Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française (2014-2016). 14<sup>e</sup> rapport de la CAF. *Ornithos* 23-5 : 238-253.

DEUCEUNINCK B. & QUINTAINNE G. Canards et Foulques, WARD A. Cygnes, DRONNEAU C. Oies grises, MAHEO R. Bernaches, WETLAND INTERNATIONAL, 2014. Synthèse des dénombrements d'Anatidés et de Foulques hivernants en France à la mi-janvier 2013.

DUBOIS Ph.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. et YÉSOU P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, 224 pages.

DUBOIS P.J. & MAUVIEUX S. (2016). Le Traquet motteux du Groenland *Oenanthe oenanthe leucorhoa* : identification et statut en France. *Ornithos* 23-4 : 196-209.

GEROUDET P. & CUISIN M., 1999. *Les Palmipèdes d'Europe*. Quatrième édition revue et augmentée. Delachaux et Niestlé, Lausanne, 510 p.

JIGUET F., 2011. *100 oiseaux communs nicheurs de France*. Muséum national d'Histoire naturelle. Delachaux et Niestlé, 560 pages.

ISSA N. & MULLER Y. coord., 2015. *Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale*. Delachaux et Niestlé, 1408 p.

REGLADE M-A. et al, 2015. Les stationnements hivernaux du Busard pâle *Circus macrourus* en France (2006-2015). *Ornithos* 22-6, p 312-325.

SEPOL, 1993. *Atlas des Oiseaux Nicheurs en Limousin*. Editions Lucien Souny.

SEPOL, 2013. *Atlas des Oiseaux du Limousin. Quelles évolutions en 25 ans ?* Biotope, Mèze, 544 p.

SVENSSON L., MULLARNEY K. et ZETTERSTROM D., 2010. *Le Guide ornitho*. Delachaux et Niestlé.

Encyclopédie multimédia des oiseaux GEO, 2004. *A la découverte de tous les oiseaux d'Europe*. Montparnasse multimédia.

Sites internet consultés : <http://www.faune-auvergne.org/>

- <http://www.oiseaux.net/>

- <http://www.chn-france.org/index.php>

Site Web du CHN : <http://www.chn-france.org/index.php>