Les oiseaux rares en Limousin en 2015

Pipit de Richard *Anthus richardi* 1ère année, novembre 2015, Nexon (87), M. Naudon.

7ème rapport du Comité d'Homologation Régional du Limousin

PRÉAMBULE

Le Comité d'Homologation Régional a pour but de récolter et d'archiver les données circonstanciées d'espèces rares, occasionnelles ou observées hors des périodes habituelles dans le Limousin, afin de préciser leur statut à l'échelle régionale. Ces observations donnent lieu à la publication d'un rapport annuel mis à disposition de l'ensemble de la communauté ornithologique. Le CHR du Limousin sert également de relai pour les enquêtes nationales traitant d'espèces inhabituelles sur le plan national, telles que les travaux du Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR).

Ce septième rapport est la synthèse des observations ornithologiques réalisées dans la région en 2015. Sont aussi présentées à titre d'information les données homologuées par le CHN (Comité d'Homologation National) en Limousin, qui concernent donc des espèces encore plus rares.

La liste des espèces soumises à homologation en Limousin ainsi que les fiches d'homologation sont disponibles sur les sites Internet de la SEPOL et de la LPO Corrèze. Les fiches renseignées doivent être transmises au secrétariat du CHR : de préférence par mail à chrlimousin@hotmail.fr, ou par courrier à l'adresse : SEPOL, secrétariat du CHR, 11 rue Jauvion, 87 000 Limoges.

Depuis 2013 une place était vacante et Ch. Doucelin venant de se retirer 2 postes restaient à pourvoir au sein du Comité. Guy Labidoire et Morgan Boch nous ont rejoints. Le CHR Limousin est donc composé des 9 membres suivants : Morgan Boch, Raphaël Bussière, Fabrice Desage, Nicolas Gendre, Guy Labidoire, Pierre Marthon (secrétaire), Robin Petit, Jérôme Sottier, Anthony Virondeau (président). Afin d'assurer un renouvellement régulier des membres il serait souhaitable que de nouvelles personnes apparaîssent dans le comité. Ceux qui souhaitent intégrer le comité pour partager leurs compétences en ornithologie de terrain et faire progresser la connaissance de notre avifaune sont invités à en informer le plus rapidement possible un membre du CHR ou son secrétaire à chrlimousin@hotmail.fr.

LA RÉUNION PLÉNIÉRE

Elle s'est tenue le 27 février 2016 à Limoges.
Le relevé des décisions est le suivant :

- Examen des fiches en suspens et rapport 2015 et partage des tâches restantes pour la rédaction du rapport annuel.

- Renouvellement des membres et répartition des rôles

Prévu initialement fin 2015, le renouvellement des postes de président et de secrétaire a lieu ce jour, et est effectif pour une durée de 2 ans. Jérôme Sottier est élu président, Pierre Marthon est ré-élu secrétaire. Anthony Virondeau continuera à

assurer un rôle d'animation en lien avec le président.

● Mise en ligne du site internet Faune-Limousin

Cet outil mis en place par les associations naturalistes à l'initiative du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin, et auquel participent notamment les deux associations ornithologiques de la région, SEPOL et LPO Corrèze, devrait permettre d'augmenter le nombre de données saisies sur notre territoire, et par là-même le nombre de données à examiner pour le CHR.

Pour la validation des données d'oiseaux rares ou inhabituels, le fonctionnement suivant est décidé :

La possibilité de rédiger une fiche d'homologation est conservée.

Pour les utilisateurs de Faune Limousin, les données pourront être validées sans passer par la rédaction d'une fiche, si la donnée saisie comprend une description solide dans la partie commentaire, et / ou une photo permettant d'identifier sans ambigüité l'espèce, et / ou un enregistrement sonore.

Les membres du CHR examineront les données directement dans Faune Limousin, par l'intermédiaire d'un compte personnel sur le site.

Les membres du CHR seront prévenus de la saisie de données normalement soumises au CHR par des mails d'alerte envoyées automatiquement par Faune Limousin (si possible). A défaut, le secrétaire ou un autre membre sera chargé de fournir aux membres les références des données à valider, de façon régulière, de sorte que les membres n'aient qu'à accéder directement à la donnée via un lien Internet.

Par ailleurs, un onglet sur le CHR et ses activités, et contenant les rapports en ligne, sera mis en place sur Faune Limousin. En cas de fonctionnement satisfaisant CHR / Faune Limousin, ce système pourrait être adapté à l'autre logiciel utilisé antérieurement pour la saisie de données naturalistes (Wnat).

Le CHR continue également à se réserver la possibilité de travailler sur les données publiées dans Obs Limousin et accompagnées de photo ou d'enregistrement, sous réserve d'un accord explicite de l'observateur.

● Questions diverses

La liste des espèces à homologuer reste en l'état mais le CHR décide de ne plus travailler sur les espèces migratrices contactées hors dates habituelles, laissant ce travail au validateurs des sites internet de saisie en ligne (Faune Limousin et WNat).

PHOTOS

Les photographies sont aussi les bienvenues. Rappelons toutefois que rien ne peut remplacer une description écrite pour les espèces les plus délicates à identifier, pour déterminer l'âge et/ou le sexe d'un oiseau et pour garder une trace précise de son observation.

BILAN DE L'ANNÉE 2015

Une nouvelle espèce apparaît sur la liste des oiseaux du limousin : le Pipit de Richard. Sont homologuées pour la première fois des espèces déjà observées en limousin mais avant la création du CHR : le Pygargue à queue blanche, le Râle des genêts, le

Bécasseau maubèche, la Rousserolle verderolle.

On retiendra aussi les homologations d'un Aigle de type criard/pomarin, de la Sterne caspienne, du Phragmite aquatique, d'un Pouillot de type sibérien, d'un Pouillot à grand sourcils. Pour la seconde année consécutive on note l'apparition importante de Hiboux des marais.

Sur les 165 fiches traitées, seules 2 observations n'ont pas été homologuées.

PRÉSENTATION DES DONNÉES

Les données sont présentées dans ce rapport de la manière suivante :

- nom français et scientifique, selon l'ordre systématique de la liste des Oiseaux de France établie par la CAF (Commission Avifaunistique Française), diffusée par la LPO et le MNHN ;
- entre parenthèses, les 2 premiers nombres correspondent au nombre de citations suivi du nombre d'individus homologués depuis 2009, année de création du CHR, 2015 exclu. Les 2 derniers nombres représentent le nombre de citations et le nombre d'individus homologués pour l'année 2015 ;
- classement selon l'ordre alphabétique des 3 départements (Creuse, Corrèze et Haute-Vienne) ;
- commune/lieu-dit ;
- nombre d'individus (si un, non mentionné) ;
- sexe, âge, forme ;
- date du premier contact, et éventuellement celle du dernier ;
- précision si l'oiseau a été bagué, photographié ou si son chant a fait l'objet d'un enregistrement ;
- commentaires éventuels ;
- pour les données de baguage, une citation correspond à une journée de capture ;
- les données de baguage sont inscrites en bleu et en italique ;
- les données sont la propriété des observateurs ; figurent dans l'ordre les noms du découvreur (à défaut du rédacteur de la fiche) cité en premier, puis éventuellement des photographes et des observateurs ;
- à l'instar du CHN, les observations sur photo émanant des sites internet peuvent être homologuées, dans ce cas le prénom du photographe et d'autres observateurs ne sont pas mentionnés, ex : WNat/Marthon , Obslim./Marthon.

Dans chaque monographie **seules les informations concernant des données nationales et régionales homologuées sont considérées à partir du 01/01/2009,** date de mise en place du CHR.

Abréviations utilisées :

ad. : adulte - fem. : femelle - com. pers. : communication personnelle - cple : couple - juv. : juvénile - imm. : immature - ind. : individu - H1 : 1er hiver - 1A : 1ère année - +1A : plus d'un an - 2A : 2^{e} année - nupt. : nuptial - internupt. : internuptial. - obslim. : obslimousin - prob. : probable, repro : reproduction, env. : environ, s.p. : sans précision – chant. : chanteur.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2015 ET CONCERNANT DES ESPÈCES DE CATÉGORIE A (espèces présentes en France à l'état sauvage).

OIE RIEUSE *Anser albifrons* (2/3 - 1/3).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 3 ind. du 24/11/2015 au 12/12/2015 (K. Guerbaa, L. Ton, B. Michel et al.).
L'espèce reste très rare en Limousin, avec en moyenne, une donnée tous les 3 ans, depuis 2009. Le nombre d'individus est assez notable, ainsi que la durée du stationnement, sur un site, qui, lui, est sans surprises…

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (10/26 - 8/15).
Corrèze – Objat/Plan d'eau, cple le 09/03/2015, photo (D. Crémoux, J. Lafond).
Creuse - Lussat/étang des Landes, type fem. le 08/09/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. (2 fem. et mâle) le 17/09/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, fem. le 26/09/2015 (L. Ton, C. Roy, C. Couturier, B. Michel, Y. Corcelette),
- Lussat/étang des Landes, 2 type fem. le 06/10/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. (2 fem. et mâle) du 16/10/2015 au 20/10/2015 Photo (J.P. et L. Toumazet, K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, fem. ad. du 28/11/2015 au 31/12/2015 (L. Ton, B. Michel, K. Guerbaa, J.P. et L. Toumazet et al.).
Haute-Vienne – Flavignac/lac de Saint-Fortunat, cple le 20/03/2015 (P. Précigout).
La progression de la Nette rousse en France se répercute aussi en Limousin, avec en 2015, des données printanières pour la Haute-Vienne, et la Corrèze. L'étang des Landes confirme la régularité de l'espèce, avec un pattern d'apparition de plus en plus large. Pas de présence printanière en 2015 pour ce site, mais la nidification de l'espèce y est espérée pour les prochaines années…

Nette rousse N*etta rufina*, cple, mars 2015,
Objat (19) D. Crémoux.

GARROT À OEIL D'OR *Bucephala clangula* (19/20 – 3/4).

Creuse - Lussat/étang des Landes, mâle ad. du 13/02/2015 au 18/02/2015 (F. & L. Desage),

- Lussat/étang des Landes, cple ad. le 25/05/2015 (K. Guerbaa),

- Lussat/étang des Landes, mâle ad., bagué, du 09/06/2015 au 31/10/2015 (A. Virondeau, K. Guerbaa et al.).

Cette espèce nordique confirme sa régularité en petit nombre, sur l'étang des Landes en hiver, depuis environ 5 ans maintenant. Au printemps, quelques couples peuvent stationner de plus en plus tardivement, en mai ou en juin parfois, ce qui peut soulever des questions, ou des espoirs pour l'avenir… Le mâle adulte observé en juin, est probablement celui revu en été et en automne. Peu farouche, il portait une bague qui a entaché son origine sauvage…

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula,* octobre 2015,
Lussat (23) F. Desage.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula,* mâle octobre 2015, Lussat (23) J.P. Toumazet.

HARLE PIETTE *Mergellus albellus* (7/8 – 2/3).

Creuse - Lussat/étang des Landes, de 1 à 3 ind. type fem. du 14/12/2014, au 16/03/2015, photo (J.-P. et L. Toumazet),

- Lussat/étang des Landes, jusqu'à 3 ind. type fem. du 02/10/2015 au 30/12/2015 (20/11/2015 2 ind, 3 ind. le 20/10/2015 et le 01/12/2015, ind. le 31/12/2015), photo (K. Guerbaa, L. Ton, B. Michel J.P. et L. Toumazet et al.).

L'apparition du Harle piette en Limousin est souvent liée aux vagues de froid. Depuis 2013, l'espèce se montre plus régulière sur l'étang des Landes, avec des hivernages complets de 1 à 3 individus femelles. Les mâles adultes restent très rares dans la région.

Harle piette *Mergellus albellus,* novembre 2015, Lussat (23) J.P. Toumazet.

HARLE HUPPÉ *Mergus serrator* (2/2 – 2/3).

Creuse - Lussat/étang des Landes, 2 ind. type fem. du 02/11/2015 au 29/11/2015, photo (K. Guerbaa, J.P. et L. Toumazet, L. Ton, B. Michel, E. Fressinaud).

Haute-Vienne – Azat-le-Ris/étang de Boutilly, fem. 1A le 26/11/2015, photo (Ch. Mercier).

L'étang des Landes aura accueilli cet hiver, les 3 espèces de harles simultanément !

Le Harle huppé reste, des trois, le plus rare en Limousin, en raison de sa prédilection pour le littoral.

Les deux données de cette année, cadrent parfaitement avec le pattern d'apparition de l'espèce dans la région, et il n'est pas surprenant, qu'elles concernent une fois de plus, des femelles ou immatures, plutôt que des mâles adultes, beaucoup plus rares…

Harle huppé *Mergus serrator,* fem. 1A, novembre 2015,
Azat-le-Ris (87) Ch. Mercier.

Harle huppé *Mergus serrator,* novembre 2015,
Lussat (23) J.P. Toumazet.

HARLE BIÉVRE *Mergus merganser* (15/53 - 2/4).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 3 ind. (mâle et 2 ind. type fem.) du 04/01/2015 au 10/04/2015, photo (K. Guerbaa, J.-P. Toumazet),

- Lussat/étang des Landes, fem. H1 du 29/11/2015 au 30/12/2015, photo (L. Ton, K. Guerbaa et al.).

En 2015, seul l'étang des Landes a accueilli l'espèce, en début et en fin d'année.

Le nombre de mentions hivernales de cette espèce sur les grands lacs de la région est en diminution ces dernières années (lacs de Vassivière, Saint Pardoux, Neuvic…).

Est-ce dû à une pression d'observation déclinante, ou à la trop grande douceur des hivers ?

Harle bièvre *Mergus meganser,* fem. H1 décembre 2015,
Lussat (23) F. Desage.

GRÈBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (2/3 - 1/2).

Haute-Vienne – Saint-Pardoux/Étang de Saint-Pardoux, 2 ind. (H1 et indéterminé) le 06/12/2015, photos (Ch. Mercier).

Cette espèce nordique, toujours très rare en Limousin, n'avait pas été observée depuis 2010.

Un seul observateur chanceux a pu profiter de leur brève halte. Un des oiseaux avait un plumage particulièrement déroutant pour l'époque, avec une mue très en retard.

Grèbes esclavons *Podiceps auritus*, décembre 2015,
Saint-Pardoux (87) Ch. Mercier.

BUTOR ÉTOILÉ *Botaurus stellaris* (8/8 - 2/2).
Creuse – Lussat/étang de la Tête-de-Boeuf, le 15/11/2015, photo (Toumazet J.P. et L., A. Labrousse).
Haute-Vienne – Coussac-Bonneval/Étang de Marsaguet, le 11/01/2015 (R. Coutant, S. & G. Morelon).
Deux observations pour ce héron très difficile à détecter… Les deux mentions sont hivernales : novembre, sur un étang proche de Coussac-Bonneval en Haute-Vienne et janvier, à l'étang des Landes…
L'espèce semble ne plus s'être reproduite depuis longtemps dans la région, même si l'étang des Landes pourrait lui être favorable…
Le Butor étoilé est intimement lié aux grandes roselières… Sa répartition, pourvu qu'il trouve son milieu de prédilection, s'étend sur toute l'Europe, hormis les zones trop septentrionales…

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (9/11 - 2/2).
Creuse - Lussat/étang des Landes, mâle nupt. le 19/04/2015, photo (J.P. et L. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 09/06/2015 (K. Guerbaa).
Deux mentions, toutes à l'étang des Landes, en avril et juin… La période de la seconde observation pourrait sembler prometteuse dans la perspective d'une reproduction , mais l'oiseau n'a été observé qu'une seule fois…
L'espèce niche en France, de façon clairsemée, dans quelques foyers bien localisés, essentiellement méridionaux et atlantiques…

Crabier chevelu *Ardeola ralloides,* mâle, avril 2015,
Lussat (23) J.P. Toumazet.

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (10/12 – 1/1).
Creuse - Lussat/étang des Landes, le 30/09/2015 (K. Guerbaa).
Un individu est observé à l'étang des Landes à la fin du mois de septembre… Mention très exceptionnelle pour la région…
Reproducteur assez rare et localisé en France, dans quelques foyers de la côte atlantique…

ÉLANION BLANC *Elanus cæruleus* (5/5 – 1/1).
Haute-Vienne – Flavignac/Cessaguet, le 14/09/2015, photo (N. Lagarde).
Il s'agit de la 6ème observation homologuée par le CHR depuis 2009, et de la 4ème citation sur la commune de Flavignac, ceci étant en lien avec la pression d'observation durant le suivi de la migration postnuptiale. Toutes les observations ont été réalisées dans l'ouest de la Haute-Vienne où l'espèce pourrait s'installer dans les années à venir vu la rapidité avec laquelle elle a colonisé plusieurs régions françaises depuis son arrivée en Aquitaine dans les années 90 (N. ISSA & Y. MULLER, 2015).

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (0/0 – 1/1).
Creuse - Lussat/étang des Landes, H1 du 09/02/2015 au 10/02/2015, photo (K. Guerbaa, F. Biegnon).
Première observation de l'espèce homologuée par le CHR sur un site classique où l'espèce avait déjà été observée. Chez nos voisins auvergnats, les observations récentes ont été faites dans le val d'Allier (03) en hiver (Faune-Auvergne), il s'agit probablement de la même grande zone de halte hivernale pour des oiseaux immatures erratiques qui recherchent des étangs et rivières avec d'important rassemblement d'anatidés.

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla,*
H1, février 2015, Lussat (23) F. Biegnon.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (24/146 – 4/15).
Corrèze – Davignac/Laval, le 15/04/2015 (R. Petit),
- Saint-Yreix-le-Déjalat/pré du Grattadour le 22/04/2015 (O. Villa),
- Aubazine/Moulin de Mercier, Puy de Pauliac, le 12/06/2015 (P. et P. Marthon).
Haute-Vienne – Saint-Léger-la-Montagne/tourbière des Dauges, 12 ind. le 10/07/2015, photo (N. Lagarde).
L'espèce est observée tous les ans dans la région depuis 2009. Les citations concernent la plupart du temps des individus vus seuls, des groupes plus importants comme les 12 oiseaux de la tourbière des Dauges ne sont pas observés chaque année mais l'espèce est connue pour se déplacer à haute altitude et peut donc facilement passer inaperçue.

VAUTOUR MOINE Aegypius monachus (3/3 – 1/1).
Corrèze – Ambrugeat/La Sagne, le 15/04/2015 (R. Petit).
Il s'agit de la 4ème mention validée par le CHR depuis 2009 et la 3ème mention sur le plateau de Millevaches. Moins commun que le Vautour fauve il est également probable que le Vautour moine passe inaperçu lorsqu'il se déplace à haute altitude dans la région.

BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (4/4 - 3/2).
Corrèze – Saint-Solve/La Chapelle-Salamard, le 15/03/2015 (L. Ton).
Haute-Vienne – Gorre/lande de Massaloux, mâle 1A du 29/12/2014 au 04/01/2015, photo (F. Taboury, A. Virondeau, N. Lagarde, A. Desternes, Ch. Mercier *et al.*),
– Saint-Hilaire-les-Places/La brégère, mâle le 06/04/2015, photo (M. Naudon).
Bonne année pour cette espèce avec 3 citations. La donnée de la lande de Massaloux correspond à l'hivernage d'un mâle immature pendant l'hiver 2014/2015. Ces données s'inscrivent dans un contexte d'augmentation des données de migration en Europe de l'ouest (M-A REGLADE & al, 2015).

Busard pâle *Circus macrourus,* mâle, décembre, et janvier 2015, Gorre (87) Ch. Mercier.

AIGLE ROYAL *Aquila chrysaetos* (5/4 – 1/1).
Corrèze – Tarnac/ancien étang de Chabanne, imm. 2A à 4A le 17/07/2015 (R. Petit, O. Villa, G. Rodier).
Il s'agit de la 6ème mention de l'espèce à une date classique ou des immatures peuvent être contactés un peut partout en erratisme. La plupart des observations faites dans la région ont été réalisées sur le plateau de Millevaches et les gorges de la Dordogne.

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus* (2/2 – 2/2).
Corrèze – Liginiac/Le Coudeil, fem. ad. le 21/04/2015, photo (A. Vialle).
Haute-Vienne – Flavignac/Cessaguet, mâle 2A du 16/06/2015 au 18/06/2015, photo (F. Desage, L. Desage, Ch. Mercier, F. Ramade).
L'année 2015 a connu un afflux massif de Faucons kobez en France, majoritairement dans le sud-est du pays. Le Limousin est rarement concerné par le passage de cette espèce orientale mais quelques oiseaux s'égarent quand même chez nous de temps en temps comme ces deux individus.

Faucon kobez *Falco vespertinus,* fem., avril 2015, Liginiac (19) A. Vialle.

Faucon kobez *Falco vespertinus,* mâle, juin 2015,
Flavignac (87) F. Desage.

MAROUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (10/18 – 2/2).
Creuse - Lussat/étang des Landes, chant. le 29/04/2015 (K. Guerbaa),
Creuse - Lussat/étang des Landes, 1A le 12/08/2015 (B. Lacorre).
Deux observations à l'étang des Landes : un chanteur fin avril et un oiseau observé en août… La moisson est maigre cette année alors que l'espèce se reproduit très probablement sur le site…
Visiteur d'été peu abondant en France, très discret et localisé…

RÂLE DES GENÊTS Crex crex (0/0 - 1/1).
Haute-Vienne – Limoges/Parvis cathédrale, 1A le 16/09/2015, mort, photo (Ch. Durand).
En septembre le cadavre d'un oiseau est retrouvé à la cathédrale de Limoges… Seule mention depuis bien longtemps en Limousin où l'espèce avait littéralement disparu jusqu'alors… Il est probable que sans la prédation d'un faucon pèlerin et la découverte des restes en très bon état, la ligne du râle des genêts serait restée vierge quelques années encore dans les archives ornithologiques régionales…
Une très forte diminution des effectifs en Europe occidentale est en effet attestée pour ce visiteur d'été qui n'occupe plus que quelques secteurs très localisés en France, en Scandinavie et dans les îles britanniques…

Râle des genêts *Crex crex* 1A, septembre 2015,
Limoges (87) Ch. Durand.

ÉCHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus* (16/34 - 6/8).
Corrèze – Aubazine/étang du Coiroux, le 03/04/2015, photo (P. Marthon),
– Aubazine/étang du Coiroux, mâle ad. le 13/06/2015, photo (F. Guionie).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 3 ad. (mâle, fem., SP.) du 11/05/2015 au 28/05/2015 (N. Lagarde, K. Guerbaa).
Haute-Vienne – Limoges/lac d'Uzurat, le 19/04/2015, photo (M. Maurice),
– Linards/Mazermaud, mâle le 24/04/2015, photo (C. Kerjose),
– Limoges/lac d'Uzurat, le 07/07/2015, photo (M. Maurice).
L'échasse continue à se montrer en Limousin, de façon presque annuelle, au printemps, et en 2015, dans les trois départements.
Avec deux individus différents, le lac d'Uzurat, au nord de Limoges, montre qu'il peut réserver des surprises, malgré sa fréquentation humaine importante et des dérangements qui peuvent en découler. La donnée de juillet sur ce site est très précoce, alors que celle de juin à Aubazine, est, au contraire, assez tardive…

Échasse blanche *Himantopus himantopus*, mâle,
avril 2015, Limoges (87) M. Maurice.

Échasse blanche *Himantopus himantopus,* mâle,
Juin 2015, Aubazine (19) F. Guionie.

AVOCETTE ÉLÉGANTE *Recurvirostra avosetta* (16/69 - 3/3).
Corrèze – Aubazine/étang du Coiroux, ad. le 07/05/2015, photo (P. Marthon).
Creuse - Lussat/étang des Landes, du 18/11/2015 au 24/11/2015, bague de couleur, photo (J.P. et L. Toumazet, K. Guerbaa et al.).
Haute-Vienne – Saint-Germain-les-Belles/étang communal, le 05/05/2015 (N. Chamarat).
L'avocette est un peu plus régulière que l'échasse en Limousin, aux deux migrations. On notera la proximité des dates de Corrèze et de Haute-Vienne. La donnée de l'étang des Landes montre que l'espèce peut aussi s'observer assez tard en automne.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta,*
novembre 2015, Lussat (23) J.P. Toumazet.

BÉCASSEAU MAUBÈCHE *Calidris canutus* (0/0 - 1/1).
- Lussat/étang des Landes, juv. du 08/09/2015 au 11/09/2015, photo (K. Guerbaa).

Première mention de cette espèce depuis la création du CHR, pour cette espèce maritime qui reste très rare chez nous.

Bécasseau maubèche *Calidris canulus,* juvénile,
septembre 2015, Lussat (23) J.P. Toumazet.

BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (3/5 - 1/1).
Creuse - Lussat/étang des Landes, juv. du 06/10/2015 au 10/09/2015, photo (K. Guerbaa).
Espèce toujours rare et assez irrégulière. L'automne reste la saison la plus favorable pour croiser le sanderling. L'étang des Landes a le quasi-monopole de cette espèce en Limousin, et là encore, elle est loin d'y être annuelle…

Bécasseau sanderling *Calidris alba,*
septembre 2015, Lussat (23) J.P. Toumazet.

BÉCASSEAU MINUTE *Calidris minuta* (29/51 - 4/15).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 2 juv. le 29/09/2015 (K. Guerbaa),

- Lussat/étang des Landes, 2 ind. le 02/10/2015 (J.P. et L. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, 6 ind. le 20/11/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 5 ind. le 24/11/2015 (A. Virondeau).
Données classiques pour cette espèce tout à fait régulière sur l'étang des Landes, lors du passage des juvéniles en septembre. Les mentions automnales sont bien plus courantes que les mentions printanières pour cette espèce.

BÉCASSINE SOURDE *Lymnocryptes minimus* (8/12 - 5/5).
Corrèze – Saint-Viance/Le Coudert, du 25/01/2015 au 27/02/2015 (L. Ton),
- Chamboulive/Tavers le 19/02/2015, photo (E. Hennequin, O. Lefeuvre, M. Marande, O. Rascle),
- Lestards/Puy Bessat et Roubière Soubrane le 19/03/2015 (M. Bonhomme, E. Hennequin, O. Rascle, L. Drancourt),
- Aubazine/étang du Coiroux le 10/11/2015 (P. Marthon).
Haute-Vienne - Limoges/Marais proche de la station d'épuration, le 08/10/2015 (Ch. Mercier).
Ces quelques mentions sont probablement loin de refléter la fréquence réelle de l'espèce, en Limousin. Son extrême discrétion la rend difficilement détectable, alors qu'elle peut être présente sur nombre de secteurs. La mention dans le petit marais, aux portes de Limoges confirme que la Bécassine sourde peut « tomber » dans toutes les zones favorables…



Bécassine sourde *Lymnocryptes minimus,* février 2015,
Chamboulive (19) E. Hennequin.

MOUETTE PYGMÉE *Hydrocoloeus minutus* (25/41 - 3/9).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 7 ind. + 1A du 29/03/2015 au 01/04/2015 (K. Guerbaa, D. Naudon, Ph. Hubert, J. Vittier),
- Lussat/étang des Landes, 1A le 26/09/2015 (L. Ton),
- Lussat/étang des Landes, ad. du 25/11/2015 au 28/11/2015 (K. Guerbaa, L. Ton et al.).
Toutes les mentions limousines de 2015 proviennent de l'étang des Landes… Quelques

oiseaux (moins d'une dizaine), adultes et immatures, séjournent sur le site quelques jours à la charnière de mars et avril… C'est la seule mention prénuptiale…
Après la période de reproduction, deux individus isolés sont observés, le premier fin août et le second fin novembre, ce dernier stationnant quelques jours…
Les mouettes pygmées se reproduisent dans l'est et le nord de l'Europe, régions qu'elles quittent en hiver… C'est lors des passages migratoires qu'on peut rencontrer l'espèce dans la région, même si les occasions sont rares et manifestement limitées à l'étang des Landes…

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *Larus melanocephalus* (16/25 – 6/7).
Corrèze – Soursac/Nauzenac, ad. nuptial le 25/03/2015, photo (M. André),
– Aubazine/Etang du Coiroux, ad. le 29/04/2015, photo (P.Marthon).
Creuse - Lussat/étang des Landes, ad. le 29/03/2015, (M. Schreiber, J. Vittier, C. Esculier, M. Saulnier),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 30/03/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 2 ind. ad. le 31/03/2015, photo (D. Naudon),
- Lussat/étang des Landes, 1A le 09/07/2015 (A. Virondeau).
Cinq observations dans le cadre des déplacements prénuptiaux, entre le 25 mars et le 29 avril, le « pic » (si l'on peut s'exprimer ainsi) étant atteint fin mars… Toutes les observations portent sur un ou deux oiseaux… Trois contacts à l'étang des Landes, deux sur des plans d'eau corréziens… Les haltes semblent de courte durée, bien que les observations creusoises soient susceptibles de porter sur un même individu stationné quelques jours…
Après la reproduction, une seule observation au début du mois de juillet, avec un seul oiseau noté à l'étang des Landes…
L'espèce, à répartition atlantique et surtout méditerranéenne, ne fait que de brèves et rares incursions en Limousin…

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*,
mars 2015, Lussat (23) D Naudon.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus,*
avril 2015, Aubazine (19) P. Marthon.

GOÉLAND BRUN *Larus fuscus* (14/57 – 8/50).
Corrèze – Varetz/Z.A. Varetz, ad. le 04/03/2015 (L. Ton),
- Davignac/L'arbre Fourrat, ad. le 10/03/2015 (R. Petit),
- Aubazine/étang du Coiroux, 15 ind. le 29/03/2015 (P. Marthon),
- Aubazine/étang du Coiroux, 29 ind. le 02/04/2015 (P. Marthon),
- Saint-Solve/La Chapelle salamard, ad. le 14/04/2015 (L. Ton).
Creuse - Lussat/étang des Landes, ad. le 08/06/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 25/08/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 26/09/2015, photo (L. Ton).

Entre début mars et début avril, lors des déplacements prénuptiaux 5 observations sont effectuées, toutes en Corrèze… Les effectifs peuvent être parfois importants, comme en attestent les 29 oiseaux présents simultanément à l'étang du Coiroux, près d'Aubazine le 2 avril…
Hors période prénuptiale, 3 observations seulement, portant toutes sur des individus isolés, entre juin et septembre, à l'étang des Landes…
Le Goéland brun est l'un des laridés les plus susceptibles d'être rencontrés en Limousin, même s'il est loin d'y être commun… L'espèce est essentiellement atlantique et les oiseaux observés dans la région peuvent provenir des zones les plus septentrionales de l'aire de répartition, là où les populations ne sont pas sédentaires et doivent accomplir une migration souvent transcontinentale pour rejoindre leurs quartiers d'hiver…

Goéland brun *Larus fusus,*
septembre 2015, Lussat (23) L.Ton.

STERNE NAINE *Sternula albifrons* (2/2 - 1/1).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 1A le 30/06/2015 (K. Guerbaa).
Observation d'un individu, le 30 juin à l'étang des Landes, mention tout à fait notable en Limousin pour ce visiteur d'été à large répartition européenne…

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia* (1/1 – 1/1).
Creuse - Lussat/étang des Landes, ad. le 15/07/2015 (J. Moulinat).
Un oiseau est présent le 15 juillet à l'étang des Landes, ce qui constitue une observation tout à fait exceptionnelle pour la région…
Cette énorme sterne migratrice se reproduit en mer Baltique et au Proche-Orient… En théorie, elle n'a rien à faire en Limousin et est supposée suivre des routes nettement plus orientales, notamment le long des côtes méditerranéennes…

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo* (19/35 – 4/4).
Creuse - Lussat/étang des Landes, ad. le 09/04/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 11/05/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 09/06/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 06/07/2015 (K. Guerbaa).
Un oiseau est observé à quatre reprises à l'étang des landes entre avril et juillet … Mais s'agit-il à chaque fois du même individu ?... Peut-on envisager les velléités d'installation ?... L'avenir le dira peut-être…
Il s'agit en tout cas de la plus continentale des « vraies sternes » et des colonies sont installées à une distance relativement modeste, notamment sur la Loire… Bien plus que les données de latitude et de longitude, c'est l'absence de sites naturels favorables qui s'oppose à la présence régulière de cette espèce dans région…

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (22/26 - 8/45).
Creuse - Lussat/étang des Landes, ind. 01/01/2015 au 20/02/2015, photo (J.P. et L. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, 22 ind. le 05/01/2015 et le 12/01/2015, photo (K. Guerbaa, J.P. et L. Toumazet),
- Saint-Pierre le Bost/La petite Jupille, 13 ind. le 07/01/15, 6 ind. maximum était présents fin 2014 (Th. Nore),
- Budelière/Saget le 07/02/2015 (P. Duboc),
- Lussat/étang des Landes, mâle le 17/04/2015 (K. Guerbaa).
Haute-Vienne – Saint-Priest-Ligoure/Les Champs entre Lavaud et Texonnières, 2 ind. du 11/01/2015 au 18/01/2015, photo (M. Naudon),
– Flavignac/Cessaguet, le 19/03/2015 (N. Lagarde),
- Flavignac/La Terrade, de 1 à 4 ind. du 11/12/15 au 29/12/2015 à suivre, photos (F. Ramade, Ch. Mercier, M. D. I. Naudon et al.).
Hivernage avéré à l'étang des Landes en janvier, avec un maximum de 22 individus… 13 oiseaux observés pendant la même période près de Boussac, toujours dans le même département et le même secteur… Un autre oiseau signalé à Budelière, en février… L'est de la Creuse semble plutôt attractif pour l'espèce en hivernage… Parallèlement, deux individus au moins stationnent près de St-Priest-Ligoure en Haute-Vienne…
En période de migration, deux mentions : mars à Flavignac en Haute-Vienne, avril à l'étang des Landes, avec un seul individu à chaque fois…
L'hiver suivant, en décembre, 4 individus semblent séjourner près de Flavignac…

Les oiseaux observés en Limousin sont probablement des nicheurs d'Europe septentrionale qui ont quitté leurs lieux de reproduction pour l'hiver… Plus au sud, l'espèce est sédentaire…

Hibou des marais *Asio flammeus*, fem à gauche, mâle à droite.
décembre 2015, Flavignac (87) F. Ramade, M.&D. Naudon.

Hibou des marais *Asio flammeus*, décembre 2015, Saint-Flavignac (87) Ch. Mercier.

MARTINET À VENTRE BLANC *Apus melba* (2/2 - 2/2).
Corrèze – Saint-Yreix-le-Déjalat/Puy de Viossanges, 1A le 14/07/2015 (O. Villa),
– Sérandon/Belvédère de Gratte-Bruyère, le 16/09/2015 (L. Ton).
Il peut paraître surprenant que ce martinet qui possède une population reproductrice régulière sur la partie lotoise de la vallée de la Dordogne ne soit pas mentionné plus souvent en Corrèze.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (0/0 – 1/1).
Haute-Vienne – Nexon/Bosmarèches - Les Graisses, 1 A le 14/11/2015, photo (M. Naudon).
Il s'agit de la première mention limousine avérée de cette espèce originaire des steppes d'Asie centrale et orientale. Elle a eu lieu sur une commune voisine de celle de Flavignac, un secteur qui bénéficie d'une pression d'observations importante. Elle était espérée dans la mesure où le Pipit de Richard est devenu régulier au passage et en hivernage sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique et sur les rivages méditerranéens et même s'il demeure très rare à l'intérieur des terres. Signalons aussi une mention de l'espèce en mars 2015 sur la commune Picto-Charentaise de Lathus/St-Rémy qui jouxte le nord-ouest de la Haute-Vienne (C. Faivre, www.ornitho.fr).

Pipit de Richard *Anthus richardi*, 1A,
novembre 2015, Nexon (87) M. Naudon

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris* (12/14 – 3/3).
Corrèze – Voutezac/Sajueix, ind. en migration, le 27/08/2015(L. Ton),
- Saint-Viance/Le Vert, ad. le 19/09/2015 (L. Ton),
- Aubazine/Pauliac-Haut, ad. le 23/09/2015 (P. Marthon).
Une année normale et des dates très classiques pour cette espèce qui semble ne plus faire partie de notre avifaune nicheuse.

GORGEBLEUE À MIROIR *Luscinia svecica* (62/126 – 27/34).

Corrèze – Voutezac/plaine de Ceyrat, mâle ad. ssp. cyanecula le 29/03/2015 (L. Ton),
– Voutezac/Les Rebières, le 06/04/2015 (L. Ton),
– Voutezac/plaine de Ceyrat, le 06/04/2015 (L. Ton).
Creuse *- Lussat/étang des Landes, fem.1A le 11/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, G. Lacorre, C. Richer),*
- Lussat/étang des Landes, mâle 1A le 13/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier),
- Lussat/étang des Landes, prob. fem.1A le 16/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, mâle 1A le 17/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton),
- Lussat/étang des Landes, prob. mâle 1A le 18/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton),
- Lussat/étang des Landes, prob fem. 1A le 20/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton),
- Lussat/étang des Landes, fem. 1A le 21/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, B. Roggy),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. (fem. 1A et 2 prob. fem. 1A) le 22/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton, B. Roggy),
- Lussat/étang des Landes, mâle 1A le 24/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, J. Yvernault),
- Lussat/étang des Landes, 2 ind. (mâle 1A et prob. fem. 1A) le 25/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, I. Mahu),
- Lussat/étang des Landes, 2 ind. (mâle 1A et fem. 1A prob.) le 26/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, C. Esculier),
- Lussat/étang des Landes, prob. fem. 1A le 27/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, M. Ruchon),
- Lussat/étang des Landes, fem. le 27/08/2015 (J.P. et L. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, le 31/08/2015, photo (J.P. et L. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, 3 mâles 1A le 09/09/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa).
Haute-Vienne - Limoges/Marais proche de la station d'épuration, mâle ad. le 17/03/2015, ssp. cyanecula mais la ssp. *namnetum* n'est pas à exclure (A. Virondeau),
- Aixe-sur-Vienne/Rive droite sur la Vienne en amont du moulin du Géry, 24/03/2015 (G. Labidoire),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, mâle +1A, ssp cyanecula, le 17/04/2015 (G. Labidoire).
- Verneuil-sur-Vienne/1°08'06E/45°51'10", fem. le 19/04/2015 (M. Buy),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, 1A le 04/09/2015, photo (Ch. Mercier),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, 1A du 08/09/2015 au 09/09/2015, photo (Ch. Mercier),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, 2 ind. (mâle 1A et type fem.) le 10/09/2015, photo (N. Lagarde),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, fem. le 10/09/2015, photo (Ch. Mercier),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, 1A le 18/06/2015, photo (Ch. Mercier).
La focalisation des observateurs entraîne une logique montée des données pour cette espèce qui s'avère être une migratrice régulière tant au printemps qu'à l'automne sur

les deux sites « classiques » que sont l'étang des Landes (19 captures lors du camp de baguage de fin d'été) et le petit marais proche de la station d'épuration de Limoges mais aussi en d'autres lieux : de petits bassins d'épuration des eaux riches en hélophytes et des secteurs buissonnants en milieux agricoles ouverts.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*, mâle, septembre 2015, Limoges (87) N. Lagarde.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*, mâle, septembre 2015, Limoges (87) Ch. Mercier.

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis* (7/9 - 1/1).
Creuse – Lussat/Les Houillières, mâle le 17/03/2015 (R. Petit).
La Cisticole désormais bien implantée en Poitou-Charentes a toujours autant de réticence à s'installer en Limousin…

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola* (1/1 – 1/1).
***Creuse** - Lussat/étang des Landes, 1A le 22/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa).*

Le passage de cette espèce nicheuse en Europe orientale, hivernante en Afrique de l'ouest et classée « vulnérable » au plan mondial est probablement assez régulier en fin d'été mais ne doit concerner que de tout petits effectifs.

PHRAGMITE DES JONCS ***Acrocephalus schoenobaenus*** **(87/381 – 32/96).**
Creuse - Lussat/étang des Landes, le 14/04/2015, photo (D. et I. Naudon),
- Lussat/étang des Landes, 2 mâles chant. le 16/04/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, mâle chant. le 04/05/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, le 14/05/2015, photo (A. Vialle),
- Lussat/étang des Landes, mâle chant. le 28/05/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 2 mâles chant. le 05/06/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, mâle chant. du 01/07/2015 au 09/07/2015 (K. Guerbaa, A. Virondeau),
- Lussat/étang des Landes, 10 ind. (9 ind. 1A et + fem.+1A) le 10/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, G. Lacorre),
- Lussat/étang des Landes, 9 ind. (8 ind. 1A et +1A) le 11/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, G. Lacorre, C. Richer),
- Lussat/étang des Landes, 6 ind. 1A le 12/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, G. Lacorre),
- Lussat/étang des Landes, 1A le 13/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier),
- Lussat/étang des Landes, 5 ind. 1A le 15/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, A. Roche),
- Lussat/étang des Landes, 5 ind. 1A le 16/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, M. Ruchon, J. Sowa, C. Esculier),
- Lussat/étang des Landes, 5 ind. 1A le 17/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton, M. Ruchon, B. Roggy),
- Lussat/étang des Landes, 4 ind. 1A le 18/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, B. Roggy),
- Lussat/étang des Landes, mâle chant. le 19/08/2015 (J. P. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, le 09/09/2015, photo (J.P. et L. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. 1A le 19/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton, B.Roggy),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. (2 ind. +1A, 1A) le 20/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton),
- Lussat/étang des Landes, 5 ind. (2 ind.+1A dont 1 contrôle, 3 ind.1A dont 1 contrôle) le 21/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes, (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton),
- Lussat/étang des Landes, 4 ind. (+1A, 3 ind.1A) le 22/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton, B. Roggy),
- Lussat/étang des Landes, 1A le 24/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton, J. Yvernault),
- Lussat/étang des Landes, 8 ind. 1A le 25/08/2015, 2 ind. bagués en Grande-Bretagnelcamp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, M. André, I. Mahu),
- Lussat/étang des Landes, 2 ind. 1A le 26/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, M. André, C. Esculier),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. 1A le 27/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, M. Ruchon),
- Lussat/étang des Landes, 2 ind. 1A le 09/09/2015, camp de baguage RNN de l'étang

des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. 1A le 26/09/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, M. André),
- Lussat/étang des Landes, le 26/09/2015 (L. Ton).
Haute-Vienne - Limoges/Marais proche de la station d'épuration, mâle chant. du 28/04/2015 au 29/04/2015, photo et enregistrement du chant (N. Lagarde),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, le 14/04/2015, photo (Obslim./Leroy),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, 2 ind. + 1A (mâle et sp.) le 17/04/2015 (G. Labidoire),
- Verneuil-sur-Vienne/parc des troubadours, mâle chant. le 30/04/2015, photo (N. Lagarde).
Nicheuse rare et mentionnée seulement à l'étang des Landes cette année encore (2 chanteurs simultanés au maximum), cette petite fauvette aquatique est beaucoup plus abondante et largement répartie sur la région lors des 2 passages. Les 79 individus en migration postnuptiale capturés lors du camp de baguage de l'étang des Landes semblent constituer un nouveau record.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*,
avril 2015, Limoges (87) N. Lagarde.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*,
mai 2015, Lussat (23) A. Vialle.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* (0/0 – 1/1).
***Creuse** - Lussat/étang des Landes, 1A le 16/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Ch. Esculier).*
Cette espèce qui avait fait l'objet d'une surprenante mention de nidification en 2010 dans le nord de la Creuse fournit là sa première mention validée par le CHR grâce à l'efficace équipe des bagueurs de l'étang des Landes.

ROUSSEROLLE TURDOÏDE *Acrocephalus arundinaceus* (5/7 – 1/1).
***Creuse** - Lussat/étang des Landes, 1A le 13/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier).*
Toujours pas de concrétisation des velléités de réinstallation de l'espèce en tant que nicheuse sur l'étang des Landes…

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (4/4 – 1/1).
Corrèze – Chanteix/le Bourg (Saint-Martial), le 20/04/2015 (J. Barataud).
La grande rareté des mentions limousines ce cette espèce qui niche, dans notre pays, à l'est d'une ligne allant des Alpes maritimes au Contentin est toujours surprenante.

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (4/4 – 6/6).
Haute-Vienne – Cieux/lande de Ceinturat, le 12/02/2015 (R. Jilet),
– Vaulry/Moulin de Rousset, du 16/10/2015 au 17/10/2015 (H. Bourdin),
- Flavignac/Cessaguet du 16/10/2015 au 15/11/2015, photo (N. Lagarde, P. Précigout et al.),
- La Roche-l'Abeille/lande de Saint-Laurent le 07/11/2015 au 28/12/2015 (J. Vittier, A. Virondeau),
– Cieux/lande de Ceinturat le 23/12/2015 (D. Naudon),
– Gorre/lande de Massaloux du14/12/2015 au 16/12/2015 (B. Labidoire).
2015 aura marqué un vrai retour pour cette espèce sédentaire, très sensible aux gels prolongés et dont la population atlantique (Sylvia u. dartfordiensis) atteint chez nous une limite orientale fluctuant au gré de la dureté des hivers. A coté de lieux classiques pour l'espèce (Monts de Blond et leur périphérie, lande de Saint-Laurent à la Roche

l'Abeille-87) sont venus s'ajouter un autre site landeux géré par le CEN Limousin (lande de Massaloux) et le site de Flavignac où une Pitchou a tenu compagnie pendant un mois aux passionnés de l'observation des migrateurs, se cantonnant à une haie de ronces, ajoncs nains et fougères comme il y en a encore quelques unes sur ce secteur.

Fauvette pitchou S*ylvia undata*, octobre, novembre 2015, Flavignac (87) N . Lagarde.

POUILLOT DE TYPE SIBÉRIEN *Phylloscopus collybita* ssp (0/0 - 1/1).
Corrèze – Davignac/L'arbre Fourrat, le 13/03/2015, photo (R. Petit).
Il s'agit de la première mention limousine de cette sous-espèce dont les données françaises ont connu depuis le milieu des années 2000 une augmentation probablement due en partie aux progrès des ornithologues mais peut-être aussi à une modification en cours des voies de migration et d'hivernage (Dubois, 2015).

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inomatus* (1/1 - 1/1).
Corrèze – Lagraulière/Marais du Brezou, le 15/10/2015 (J. Barataud).
À l'instar de la première, cette seconde apparrition limousine est survenue en Corrèze. L'espèce est essentiellement contactée sur le littoral atlantique rarement à l'intérieur des terres où la pression d'observation est moins forte.

RÉMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* (33/97 - 21/49).
Corrèze – Chanteix/le Bourg (Saint-Martial), le 07/04/2015 (J. Barataud).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 2 ind. le 23/03/2015 (J.-P. Toumazet, F. Beignon),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 09/04/2015, baguée (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 7 ind. (mâle +1A, fem.+1A, prob. mâle +1A et 4 ind.1A) le 30/09/2015, ind. 1A bagué en Allemagne, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 2 prob. mâles 1A le 01/10/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. le 01/10/2015 (J.-P. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, 7 ind. (2 ind. 1A, 3 prob. mâles 1A et 2 prob. mâles +1A) le 02/10/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (K. Guerbaa, Q. Giraud),
- Lussat/étang des Landes, 7 ind. (mâle +1A, prob. fem. +1A, 5 ind. 1A dont 1 contrôlé) le 03/10/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, M. Ruchon),
- Lussat/étang des Landes, le 06/10/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 2 ind. le 11/10/2015 (A. Labrousse),

- Lussat/étang des Landes, mâle +1A le 17/10/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (K. Guerbaa, J. Yvernault).

Haute-Vienne – Limoges/Z.I. Magré, 2 mâles du 19/03/2015 au 20/03/2015 puis mâle du 21/03/2015 au 23/03/2015, photo (Ch. Mercier),

– Verneuil-sur-Vienne/Lagune de récupération des eaux à la bouteille-sud à Veyrac, 3 ind. (mâle, fem., Prob. Mâle) le 07/04/2015, photo (M. Buy),

- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, mâle ad. le 30/09/2015, photo (Ch. Mercier),

- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, type fem. le 01/10/2015, photo (D. et I. Naudon),

- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, mâle le 04/10/2015, photo (W-Nat/Naudon),

- Limoges/Marais de la basse, mâle ad. le 08/10/2015, contrôle sur photo : bagué en 2014 au Luxembourg (Ch. Mercier),

- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, 4 ind. le 08/10/2015 (F. Desage),

- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, 2 ind. mâle et fem. le 09/10/2015, photo (F. Faubert),

- Panazol/Marais de Morpiènas, mâle ad. le 10/10/2015, photo (Ch. Mercier),

- Limoges/Marais de la Basse, le 12/10/2015, photo (Ch. Mercier).

Grâce au camp de baguage de l'étang des Landes et à l'assiduité des observateurs limougeauds, 2015 a été marquée par un véritable "boom" des observations de rémiz. La prospection plus systématique des bassins de rétention d'eaux pluviales riches en massettes (Thyphas sp.) s'est avérée fructueuse et laisse augurer une poursuite de la hausse des observations de cette espèce dont les effectifs nicheurs en France se sont pourtant effondrés à tel point que l'espèce ne fait peut-être même plus partie de notre avifaune nicheuse ! Il faut, à ce sujet, remarquer l'apport de la photographie qui permet désormais la lecture sans capture des minuscules bagues métalliques posées sur les petits passereaux.

Rémiz penduline *Rémiz pendulinus*, mâle, mars 2015, Limoges (87) Ch. Mercier.

Rémiz penduline *Rémiz pendulinus*, octobre 2015,
Limoges (87) Ch. Mercier.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (10/25 – 2/2).
Corrèze – Voutezac/Ceyrat, mâle 1A le 18/04/2015, photo (L. Ton, D. Crémoux, A. Coriveau, J. Lafont, J.M. Célérier et al.).
Haute-Vienne – Vaulry/Moulin de Rousset, fem. le 03/05/2015 (H. Bourdin).
La baisse du nombre d'observations et du nombre d'individus contactés se confirme malheureusement pour cette espèce qui a déjà disparu de l'avifaune nicheuse limousine.

Bruant ortolan *Emberiza hortulana*, avril 2015,
Voutezac (19) L. Ton.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2015 DES ESPÈCES OBSERVÉES À DES DATES EXTRÊMES (Catégorie A).

BIHOREAU GRIS *Nycticorax Nycticorax*
Creuse - Lussat/étang des Landes, juv. le 04/12/2015 (K. Guerbaa).

MILAN NOIR *Milvus migrans*
Corrèze - Aubazine/Moulin de Mercier, le 27/01/2015 et le 30/01/2015 (P. Marthon).

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2015 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE C (Espèces introduites ayant fait souche).

BERNACHE DU CANADA *Branta canadensis* (11/42 - 2/3).
Haute-Vienne – Nexon/La Mazaurie**,** le 26/02/2015 (M. Naudon),
– Ladignac-le-long/Étang de Ladignac-le-long, 2 ind. le 01/04/2015 et le 14/04/2015, photo (J. Vittier).
Des individus issus des populations férales continuent d'apparaitre ici et là…

Bernache du Canada *Branta canadensis*, avril 2015,
Ladignac-le-Long (87) J. Vittier.

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (5/15 - 1/1).
Haute-Vienne – Le Palais-sur-Vienne/Le Bois brulé, le 18/01/2015 (Ph. Hubert, WNat).
Cet individu a été observé au même endroit et le même jour en 2014… Son origine captive ne fait aucun doute…

OUETTE D'EGYPTE Alopochen œgyptiaca (6/10 - 5/15).
Creuse – Lussat/étang des Landes, 7 ind. le 17/06/2015(K. Guerbaa).
Haute-Vienne – Limoges/Landouge, 2 ind. le 11/02/2015 (F. Taboury),
- Isle/Bas-Verthamont, 2 ind. le 22/02/2015, photo (N. Lagarde),
- Bosmie-l'Aiguille/Bords de Vienne, 2 ind. le 13/03/2015 (N. Lagarde),
– Limoges/route d'Angoulème 2 ind. le 10/05/2015, photo (F. Yvonne via G. Labidoire).
Le nombre de données est assez élevé au premier abord, mais il s'agit souvent des mêmes individus revus à des endroits différents…Le groupe de l'étang des Landes est le plus conséquent observé à ce jour en Limousin, pour cette espèce.

Ouette d'Égypte *Alopochen ægyptiaca*, février 2015,
Isle (87) N. Lagarde.

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (11/20 – 7/14).
Corrèze – Sérandon/Gratte-Bruyère, le 11/03/2015 (A. Lamarche).
Creuse – Lussat/étang des Landes, du 27/09/2015 au 20/12/2015 photo (F. Desage, K. Guerbaa, J.P. et L. Toumazet et al),
– Lussat/étang des Landes, 3 ind. (2 mâles et fem.) le 26/12/2015 photo (J.P. et L. Toumazet et al),
– Ahun/étang de Chapeaubert le 27/12/2015, photo (A. Mathieu).
Haute-Vienne – Saint-Jouvent/étang des Bordes, 5 ind. le 17/01/2015 (M. Coq),
– Saint-Jouvent/étang des Bordes, 2 type fem. le 08/02/2015 (R. Gauthier),
– Bersac sur Rivallier/Villard, fem. le 08/05/2015 (Ph. Goursaud, obslim).
Cette espèce provient la plupart du temps (toujours ?) de captivité, même si certains individus observés à de bonnes dates de migrations nourrissent souvent l'espoir d'être tombé sur des individus sauvages…A ce titre, l'individu de Serandon, qui migrait avec des cormorans, peut soulever des questions…

Tadorne de Casarca *Tadorna ferruginea*, décembre 2015, Lussat (23) J.P. Toumazet.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2015 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE E (espèces dont l'origine est probablement captive).

OIE À TÊTE BARRÉE Anser indicus (0/0 - 1/1).
Corrèze – Aubazine/Étang du Coiroux, ad. le 25/03/2015, photo (P. Marthon).
L'espèce ne peut évidemment pas être considérée autrement que provenant de captivité…

Oie à tête barrée *Anser indicus*, mars 2015, Aubazine (19) P. Marthon.

CANARD CAROLIN *Aix sponsa* (2/3 - 1/4).
Haute-Vienne – Limoges/Parc de l'Aurence, 4 ind. du 12/08/2015 au 18/10/15, photo

(S. Touze, M. Maurice).
L'espèce ne peut évidemment pas être considérée autrement que provenant de captivité…

Canard carolin *Aix sponza*, aout 2015,
Limoges (87) S. Touze.

PERRUCHE À COLLIER *Psittacula krameri* (3/3 - 1/1).
Haute-Vienne – Saint-Yreix-la-Perche/Avenue Michel Gondinet le 05/11/2015, photo (J.M. Célérier).
Bien que l'espèce fasse souche dans les grandes agglomérations, cet individu sans aucun doute, est échappé de captivité.

Perruche à collier *Psittacula krameri,* novembre 2015,
Saint-Yreix-la-perche (87) J.M. Célérier.

Perruche omnicolore *Platycercus eximius* (0/0 - 1/1).
Corrèze - Egletons/Avenue des papes limousins, du 02/03/2015 au 29/03/2015 (O. Villa).
L'espèce ne peut évidemment pas être considérée autrement que provenant de captivité…

OBSERVATIONS NON HOMOLOGUÉES DE 2015

Le CHR rappelle que la non-homologation ne préjuge pas de l'identité de l'oiseau et encore moins de la compétence ou de la crédibilité de l'observateur. Elle est généralement induite par

le manque d'éléments descriptifs, voire l'absence totale de description. Il est donc conseillé d'apporter le plus d'informations possibles même si l'identification semble aisée. Une photo peut parfois s'avérer insuffisante.

CYGNE DE BEWICK *Cygnus Columbianus*.
Corrèze – Peyrelevade/Plan d'eau du Chammet, 2 ind. le 13/10/2015.
Bonne fiche avec description précise et sincère fournie par un observateur expérimenté. Mais l'observation d'oiseaux vus uniquement en vol, dans des conditions médiocres, sans pouvoir juger de la coloration du bec, laisse planer un doute sur l'identification, que l'observateur lui-même laisse transparaître.

SIZERIN FLAMMÉ *Carduelis flammea* (16/59 – 1/1).
Corrèze – Sérandon/Gratte-Bruyère, le 28/10/2015.
L'identification proposée se base uniquement sur la reconnaissance du cri, et dans le cas présent la description du cri est considérée insuffisante.

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Le CHR du Limousin prend toujours en compte les observations effectuées depuis la date de sa création le 01/01/2009.

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE 2010

RÉMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus*.
Creuse - Lussat/étang des Landes, type fem. le 10/10/2010, photo (Ch. Mercier).

Rémiz penduline *remiz pendulinus,* octobre 2015,
Lussat (23) Ch. Mercier.

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE 2014

AIGLE CRIARD/POMARIN *Aquila clanga/pomarina*.
Haute-Vienne – Proximité de Bellac, le 02/10/2014 (A. Desternes).
La distinction entre Aigle criard et pomarin est délicate en particulier pour les oiseaux observés en migration.

REMERCIEMENTS :
Le CHR du Limousin remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué à sa bonne marche :
- tous les observateurs de plus en plus nombreux qui sont à la base de son fonctionnement,
- tous les photographes qui ont bien accepté de mettre à disposition leurs clichés, souvent de remarquable qualité.
- Karim Guerbaa pour la transmission de ses données sur la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes, notamment celles de baguage,
- la SEPOL pour son soutien logistique et l'accès à sa base de données.

BIBLIOGRAPHIE

COMMISSION AVIFAUNISTIQUE FRANÇAISE, 2011. *Liste 2011 des Oiseaux de France du Paléarctique Occidental Ornithos 18-3, I-XXVIII.*
DEUCEUNINCK B. & QUINTAINNE G. Canards et Foulques, WARD A. Cygnes, DR0NNEAU C. Oies grises, MAHEO R. Bernaches -- WETLAND INTERNATIONAL, 2014. *Synthèse des dénombrements d'Anatidés et de Foulques hivernants en France à la mi-janvier 2013.*
DUBOIS Ph.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. et YÉSOU P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, 560 pages.
ISSA N. & MULLER Y. coord., 2015. *Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale*. Delachaux et Niestlé, 1408 p.
REGLADE M-A. et al, 2015. *Les stationnements hivernaux du Busard pâle Circus macrourus en France* (2006-2015). Ornithos 22-6, p 312-325.
SEPOL, 1993. - *Atlas des Oiseaux Nicheurs en Limousin*. Editions Lucien Souny.
SEPOL, 2013. - *Atlas* des Oiseaux *du Limousin. Quelles évolutions en 25 ans ?* Biotope, Mèze, 544 p.
SVENSSON L., MULLARNEY K. et ZETTERSTROM D., 2010. *Le Guide ornitho*. Delachaux et Niestlé.
Encyclopédie multimédia des oiseaux GEO. A la découverte de tous les oiseaux d'Europe. Editions 2004, Montparnasse multimédia.

Site web : http://www.faune-auvergne.org/
Site Web : http://www.oiseaux.net/
Site Web du CHN : http://www.chn-france.org/index.php