

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES INUSUELLES EN ESTUAIRE LOIRE, DE 1974 A 1987

Gilles LERAY (Office National de la Chasse)

Tout d'abord, nous nous devons de préciser qu'ici, le sens Estuaire Loire est pris au sens large. Ses limites vont en effet de Couéron-Le Pellerin à la Pointe St-Gildas-Baie de la Baule. Bien que la majorité des observations provienne de l'Estuaire lui-même (Le Pellerin-St Nazaire), nous incluons donc les quelques données supplémentaires provenant de l'Estuaire externe.

L'Estuaire Loire est une zone humide d'importance internationale pour quatre espèces d'oiseaux d'eau (Sarcelle d'hiver, pilet, souchet et avocette). C'est également une zone d'importance nationale pour une quinzaine d'autres espèces. De plus, des espèces dont l'observation est peu courante ou rare, apparaissent sur l'Estuaire.

Pour ces espèces, que nous allons vous présenter, l'ordre suivra la liste de Peterson. Il est bien évident que nous ne ferons pas état des espèces habituelles de l'Estuaire Loire. De même, les espèces faisant l'objet de recensements réguliers ne seront pas étudiées.

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)

Cette espèce, courante au Croisic en automne/hiver, est peu courante en Estuaire Loire : une observation le 17 mars 1986, une autre le 7 novembre 1987 sur le canal de la Martinière, dans la réserve de Massereau.

PETREL TEMPETE (*Hydrobatas pelagicus*)

Le 23 août 1985, une centaine d'oiseaux entre la Pointe St-Gildas et le Pilier. Il a été observé en Estuaire Loire, en face Paimboeuf un lendemain de tempête automnale dans les années 1978-79 (la date exacte contenue

dans un carnet flotte peut-être encore sur les eaux de l'estuaire I). Il a été également observé le 16 octobre 1987 au sud du Banc de Bilho, après une tempête. Une autre observation au large, 150 oiseaux environ les 20 et 21 septembre 1987. Cette zone est certainement une zone d'alimentation importante : les oiseaux volent sur place, picorent, tournent en rond. En aucun cas ils ne volent suivant un cap bien précis. Il est possible qu'ils s'alimentent sur cette zone plusieurs jours de suite.

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*)

Vue régulièrement au passage, cet oiseau a niché à Vue en 1955. Elle a été observée en prairie de Tenue, le 12 avril 1980 (deux oiseaux, Yves Maneyrol com. pers.), et en avril-mai 1986 sur l'île de la Maréchale où les oiseaux ont stationné. Nicheuse à Lavau en 1989.

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*)

Quinze observations pour un total de 24 oiseaux ($1 < n < 3$). Elles sont observées le plus souvent en Estuaire Loire (Banc de Bilho, île Chevalier) ou sur la réserve de Massereau (quatre observations) ou sur la réserve des Baracons (une observation).

FLAMANT ROSE (*Phoenicopterus ruber*)

Un oiseau observé le 15 décembre 1984 sur le Banc de Bilho. Il pouvait s'agir d'un flamant du Chili (mauvaises conditions d'observation).

CYGNE SAUVAGE (*Cygnus cygnus*) - CYGNE DE BEWICK (*Cygnus bewickii*)

Pas de données officielles pour ces deux espèces, mais des observations hivernales par conditions météorologiques défavorables et classées en «species», peuvent représenter une de ces deux espèces, plus vraisemblablement la seconde, car plus souvent observée dans la région.

OIE DES MOISSONS (*Anser fabalis*)

Cette oie est peu courante en Estuaire Loire : cinq observations pour un total de vingt individus, en novembre, janvier ou février.

OIE A BEC COURT (*Anser brachyrhynchus*)

Aucune observation en Estuaire Loire pour cette espèce vue deux fois en Loire-Atlantique (G.O.L.A.).

OIE RIEUSE (*Anser albifrons*)

Une seule observation d'une seule oie, le 29 janvier 1979, qui accompagnait d'ailleurs quatre bernaches du Canada (Boret, Leray). Elle est notée ici et là, par petits groupes, occasionnellement en Loire-Atlantique.

OIE NAINE (*Anser erythropus*)

Aucune observation en Estuaire Loire, mais un oiseau bagué la même année a été trouvé mort le 24 décembre 1981 à Pornichet (cf espèces homologuées → article dans ce même bulletin).

BERNACHE DU CANADA (*Branta canadensis*)

Deux observations en Estuaire Loire : quatre oiseaux le 29 janvier 1979 à côté de l'île de St-Nicolas, en compagnie d'une oie rieuse (tiens, ça me rappelle quelque chose, mais quoi ? ...). La deuxième observation a lieu le 5 août 1986 sur les vasières de l'île de Pierre Rouge.

BERNACHE NONNETTE (*Branta leucopsis*)

Dix observations entre 1979 et 1983 (Yésou, Chépeau, Boret, Leray). Deux oiseaux ont stationné plus de deux mois ; un autre, un mois (novembre) sur la réserve du Massereau.

TADORNE CASARCA (*Tadorna ferruginea*)

Une observation en Estuaire Loire, le 15 février 1986 en face des prairies de Corsept. Cet oiseau pouvait s'être échappé de captivité !

SARCELLE SOUCROUROU (*Anas discors*)

Une observation sur la réserve des Baracons le 17 janvier 1980, sans doute un mâle immature (Boret, Chépeau, Leray). Migrateur ou échappé de captivité.

CANARD SIFFLEUR DU CHILI (*Anas sibilatrix*)

Une observation sur la réserve des Baracons en octobre et novembre 1987, son origine de parc ne fait aucun doute.

SARCELLE A AILES BLEUES DU NORD (*Anas cyanoptera septentrionalium*)

Egalement une seule observation de cet oiseau sur la réserve du Massereau, à partir du 18 février 1983 sur le bras du Migron. Une migration exceptionnelle est peu probable pour cette espèce.

FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*)

Une seule observation sur la réserve maritime d'Estuaire Loire, le 15 janvier 1979, pour deux oiseaux. Cet oiseau est semble-t-il plus fréquent au lac de Grandlieu.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*)

Cet oiseau est courant en baie de Bougneuf et Estuaire Vilaine en hivernage. Cependant, son observation est peu fréquente en dehors du littoral. En estuaire externe (en face de St-Brévin les Pins) on a pu en observer 122 le 17 février 1987 et 64 le 16 mars 1987 ; ce sont probablement des oiseaux qui ont amorcé leur migration pré-nuptiale. Les observations sur l'Estuaire lui-

mêmesont au nombre de 13, dont une sur la réserve du Massereau et deux sur la réserve des Baracons.

CANARD DE BARBARIE (*Cairina moschata*)

Une observation tout à fait exceptionnelle (le 18 janvier 1982) de cet oiseau, dans le milieu de l'Estuaire Loire, parmi les colverts et des siffleurs. Il faut mentionner qu'il volait parfaitement ce qui ne lui a pas permis de dîner avec nous... !

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*)

Dix observations en amont du pont de St-Nazaire, pour un total de 25 oiseaux ($1 < n < 10$) ; toutes les observations sont effectuées sur la réserve maritime, sauf une observation d'un oiseau au vol sur la Loire en face la centrale de Cordemais, le 17 octobre 1987. Le creusement du chenal de la Loire n'est pas étranger à l'observation de cette espèce qui se cantonne d'habitude sur des hauts fonds colonisés par les bivalves.

GARROT A OEIL D'OR (*Bucephala clangula*)

Six observations et huit oiseaux. Cet oiseau peut être observé indifféremment sur le canal de la Martinière, en Estuaire Loire, ou sur l'Estuaire externe, surtout lors des coups de froid hivernaux.

HARLE PIETTE (*Mergus albellus*)

Neuf observations qui regroupent 37 oiseaux. Lors de coups de froid importants, des troupes surviennent régulièrement, sur l'Estuaire, le canal de la Martinière ou les étangs du Massereau. Il est signalé aux mêmes époques sur les égangs de l'intérieur du département.

HARLE BIEVRE (*Mergus merganser*)

De même que le précédent, on peut l'observer, parfois en nombre lors des

coups de froid ($1 < n < 25$). Onze observations ont pu être réalisées, cinq en Estuaire, quatre au Massereau et deux sur la réserve des Baracons.

AIGLE CRIARD (*Aquila clanga*)

Un seul oiseau a été observé en Estuaire Loire, mais à l'occasion de 33 contacts ! Il a été présent sur la réserve du Massereau du 20 novembre 1976 au 6 avril 1977. Sa nourriture principale était constituée par des lapins (nombreux dans la réserve) et des canards, le plus souvent blessés par des chasseurs aux alentours de la réserve. Son territoire de chasse ne devait pas dépasser 20 ha.

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)

Une seule observation notée sur la réserve du Massereau le 25 octobre 1979. Une présence constante en Estuaire Loire permettrait sans doute de l'observer plus souvent.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE (*Haliaeetus albicilla*)

Rapace peu commun en hivernage, il n'est cité que quelques fois par la littérature (Blandin, Douaud). Nous ne l'avons jamais observé en Estuaire Loire, mais un individu immature a passé une partie de l'hiver 1983-84 en Grande Brière, observé à de nombreuses reprises.

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC (*Circaetus gallicus*)

Observé quelques fois en migration post-nuptiale (fin août/début septembre) en bord de Loire. Nos recherches ne nous ont pas permis de retrouver les dates précises de ces observations (à vérifier par Chépeau).

BALBUZARD PECHEUR (*Pandion haliaetus*)

Trois observations (19 juin 1979, 23 septembre 1976, 10 octobre 1987) en Estuaire Loire, notamment autour de la réserve du Massereau sont insuffisan-

tes pour quantifier le passage de cet oiseau, qui doit être régulier en Estuaire, aussi bien en migration printannière qu'automnale. Les observateurs du G.O.L.A. l'observent d'ailleurs régulièrement au-dessus de Nantes, le long de la Loire.

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*)

Au moins 40 observations en Estuaire Loire. Cet oiseau a été tout-à-fait facile à observer pendant les hivers 1975-76-, 1976-77, 1981-82, 1982-83. Actuellement, il semble seulement accidentel alors que les quatre hivers pré-cités ont permis chacun près d'une dizaine d'observations. Est-ce une fluctuation importante des populations, ou plutôt un erratisme important, notamment chez les jeunes ?

GRAND TETRAS (*Tetrao urogallus*)

L'observation de cet oiseau ... ERREUR ... ERREUR ... Veuillez passer au paragraphe suivant.

GRUE CENDREE (*Grus grus*)

Trois observations d'oiseaux en migration au mois de novembre sur la réserve du Massereau, dont la fameuse débandade du début novembre 1982, due au brouillard et surtout aux faux renseignements météo de notre audiovisuel national ! Egalement, une observation le 1er mars 1987 d'un vol de 17 grues cendrées à l'ouest de Paimboeuf se dirigeant plein nord-est.

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*)

Non, ce n'est pas une erreur de l'ordinateur, ni un fantasme amoureux de l'auteur. En effet, cette espèce n'est citée ici que pour l'observation d'une bécassine Isabelle sur la réserve du Massereau. Elle faisant partie d'un groupe de six oiseaux, et se réunissait sur le bord du canal de la Martinière. Est-ce le même oiseau que baguèrent nos valeureux confrères (Timoreau, Ibanez, pour ne point les citer !) l'année dernière sur les bords du lac de Grandlieu ? L'espoir d'une coïncidence est bien mince à notre avis...

BECASSINE DOUBLE (*Gallinago media*)

Le dernier oiseau connu avec certitude a été tué par un chasseur à l'automne 1987 au nord de la réserve du Massereau. On peut actuellement voir cet oiseau au musée du lac de Grandlieu.

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*)

Deux observations en Estuaire Loire, le 12 mars 1980 et le 17 novembre 1986, à chaque fois, pour un oiseau. Il est beaucoup plus courant en presque île guérandaise.

BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*)

Observé quelques fois sur le Banc du Bilho parmi les bécasseaux variables, il doit passer le plus souvent inaperçu, les comptages au télescope permettant de compter d'assez loin plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de variables, mais l'échantillonnage régulier se révélerait le plus souvent fastidieux.

BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*)

Cet oiseau est nettement plus courant que le précédent, notamment sur la plage de St-Brévin l'Océan (20 le 14 janvier 1987) par exemple. On peut également l'observer le long du Banc de Bilho, notamment lors de ses haltes migratoires (28 le 18 avril 1986). Il est observé régulièrement à St-Brévin, lorsqu'il n'entre pas en concurrence avec les promeneurs de chiens et autres chars à voile !

PHALAROPE A BEC LARGE (*Phalaropus fulicarius*)

Plus d'une dizaine d'observations en Loire-Atlantique, entre La Turballe et la Baie de Bougneuf et seulement deux observations à l'intérieur. Apparemment aucune en Estuaire Loire mais il a pu nous échapper...

PHALAROPE A BEC ETROIT (*Phalaropus lobatus*)

C'est encore pire, pas le moindre commencement du début d'une idée de l'endroit d'où on peut l'observer. Il peut dormir sur ses deux oreilles !!!

OEDICNEME CRIARD (*Burhinus oedicnemus*)

Une observation sur les remblais de Lavan (Boret, Leray) à la mi-mai 1984. Peu de zones en Estuaire Loire sont propices à cet oiseau et les remblais effectués peuvent permettre à des oiseaux erratiques d'y être observés.

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*)

Oiseau très courant en mer et surtout en haute mer, il n'a été observé qu'une seule fois en Estuaire Loire au sud du Banc de Bilho le 16 octobre 1987. C'est un oiseau rarissime en ces lieux !

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*)

Cet oiseau régulier en Estuaire Loire a été mentionné, car hormis ses observations migratoires, c'est un oiseau de mœurs océaniques pour nous. Il est régulier surtout au passage de printemps, de fin mars à la mi-mai. Ses migrations post-nuptiales sont plus diffuses.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*)

Oiseau apparemment assez courant à l'est de Nantes, le long de la Loire. Il est par contre beaucoup moins souvent noté à l'ouest. Il est par contre d'observation hivernale courante sur la réserve du Massereau (on peut voir de 30 à 60 individus) parmi les quelques centaines de pigeons ramiers. Il disparaît de cette zone en février/mars.

CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*)

Cette espèce était assez régulière sur la réserve du Massereau en 1974-75,

puisqu'on pouvait y voir jusqu'à huit couples sur 400 ha. Or, actuellement, il ne doit pas en rester plus d'un couple et celui-ci semble bien précaire ! Quelle est la cause de ce lent processus ? Ce sont sans doute ni les routes, ni les produits de traitement. Alors quoi ? ... le mystère reste entier.

MARTIN PECHEUR (*Alcedo atthis*)

Cette espèce, d'habitude courante, a vu ses effectifs fondre les trois hivers derniers (1984-85, 1985-86, 1986-87), les oiseaux se trouvant démunis de nourriture du fait de l'importance des plans d'eau gelés. Dernièrement, deux observations nous laisse penser que cet oiseau réapparaît doucement : un observé les 8 et 17 octobre 1987 sur les étangs du Massereau, un autre début novembre 1987 le long du canal de la Martinière. Si les prochains hivers sont plus cléments, les effectifs peuvent se reconstituer rapidement.

PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*)

Une seule observation le 29 septembre 1987 sur le Banc de Bilho alors que cet oiseau était considéré comme courant en Loire-Atlantique à la fin du siècle dernier. Les observations plus proches ont été effectuées sur la dune de Penbron fin août 1984 et 1985.

PIE GRIECHE GRISE (*Larus excubitor*)

Au moins quatre observations en Estuaire Loire, notamment sur la réserve du Massereau et au Carnet. Les observations ont eu lieu en octobre, novembre et janvier (deux contacts). Pour tous les autres passereaux, et particulièrement la fauvette du désert, le pouillot des genévriers, le bruant à sourcils jaunes ou la sylvette à croupion jaune, nos activités ne nous ont pas permis d'en faire un suivi extensif ; que les braves goloteux qui ont bien voulu me suivre jusqu'ici veuillent bien m'en excuser. Je m'en remets d'ailleurs à eux pour toutes ces nouvelles espèces que nous n'aurons pas le plaisir, j'espère, de voir en Estuaire Loire ! ...

BIBLIOGRAPHIE

Bulletins du G.O.L.A., n° 1 à 8, dans leur immense majorité !!!

