

NOTE SUR LES OBSERVATIONS DE MESANGES REMIZ EN ERRATISME POST NUPTIAL DANS L'OUEST DE LA FRANCE

P. DE GRISSAC

Le 11 Novembre 1983, en compagnie d'ornithologues du G.A.F.O., j'observai 5 Mésanges rémiz aux abords de la réserve de CHANTELOUP, en VENDEE.

Cette observation nous apparut alors comme très exceptionnelle. Plus tard, d'autres observations de Rémiz nous apprirent que le phénomène avait beaucoup plus d'ampleur que nous ne l'imaginions.

Cet automne 1983 sera donc marqué par l'apparition "massive" de la mésange Rémiz hors de ses zones de migration et d'erratisme habituelles. Cette "nouveauité" intéresse non seulement l'ouest et le sud ouest de la France mais aussi des pays voisins comme la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

La note qui va suivre ne se veut pas exhaustive, elle n'a pour but que de décrire succinctement le phénomène, surtout dans l'ouest de la France, à la lumière de quelques observations à notre disposition.

Une SYNTHÈSE NATIONALE, réalisée par Monsieur Alain FOMON, paraîtra dans un prochain N° d'O.R.F.O. Elle viendra largement compléter ce modeste travail.

LA MESANGE REMIZ DANS L'OUEST DE LA FRANCE:

En Loire-Atlantique, on trouve la première citation de cet oiseau dans "Notes sur les oiseaux de l'estuaire de la Loire" par le père Joseph DOUAUD (Alauda XXII 1954 p.132):

"2 ensemble dans les roseaux de l'île de la Garenne le 26/12 1950"

Cette donnée est d'ailleurs la seule qui soit notée dans "L'avifaune de la région Nantaise" de Stanislas KOWALSKI (Tome LXV III 1970 Bull. de la S.S.N.O.F.) où il est précisé, pour l'espèce:

"Accidentelle en erratisme hivernal"

Il est à signaler que le seul spécimen de Mésange Rémiz exposé dans les vitrines du Muséum de Nantes vient....de BULGARIE.


Pour l'Ouest de la France, les observations dont nous disposons, (il en manque sans doute quelques unes) ne font que confirmer le statut exceptionnel de la Rémiz dans cette région.

10 données entre 1950 et 1981

1950	déjà citée précédemment
1963	4 ou 5 oiseaux, dont 3 pris au filet, le 9/11 à OUESANT (ORFO 63)
1964	observation de Rémiz en Vendée en Février O. FOURNIER.
1970	le 17/10 à l'étang du Moulin Neuf (56) (Ar VRAN IV 1972)
1971	le 31/10 un ind. adulte () est capturé au Migron dans l'estuaire de la Loire par Mr. SAVOUREY.
1973	observation à l'étang de Perronay Hamillé (35) (Ar VRAN VI 1976)
1975	observation à l'étang de Trunvel Tréogat (29) (Ar VRAN X 1983)
1978 *	observation, fin du mois de Mai, d'un ind. adulte plus quelques autres, moins bien vu dans les roseaux, à Congor dans les marais de Guérande (Communication pers. R. GAUTRON)*
1981	deux observations, d'un individu à chaque fois, dans deux étangs des Deux Sèvres (79) M. FOUQUET.

* Cette observation qui serait un indice de nidification de l'espèce a suscité un doute et n'a pas été retenue à l'époque.

AIRE DE NIDIFICATION DE LA MESANGE REMIZ:



NIDIFICATION EN FRANCE DE LA MÉSANGE RÉMIZ:

Dans le tome 2 des passereaux d'Europe, GEROUDET cite la nidification de la Rémiz dans l'Hérault, le Gard, peut être dans l'Aude, surtout dans le delta de Camargue, vallée du Rhone, pour ne citer que les zones les plus importantes.

Actuellement la Mésange Rémiz ne niche plus en grande Camargue. Depuis les années 65/70 il y a eu un effondrement aussi brusque qu'inexpliqué qui fait que seulement quelques couples sont encore notés en "petite Camargue".

On trouve quelques colonies de pendulines, très localisées, en Languedoc et aussi dans les Pyrénées orientales.

L'espèce a niché en Haute Alsace et en Moselle.

MIGRATION ET ÉMIGRATION DE LA RÉMIZ:

La migration post et pré nuptiale de la Rémiz est connue en Suisse, à l'ouest du massif alpin, en Camargue et sur la côte languedocienne. (pour la Camargue, le pic de migration se situe en Mars) Ces passages sont ceux d'oiseaux orientaux comme l'atteste une reprise en Pologne d'un oiseau bagué en Camargue.

Chaque année des mésanges Rémiz sont capturées dans le centre de la France (abords de la Loire) mais ce passage semble toutefois marginal.

Dans "Nos Oiseaux" (9ème du Vol. XXV, Juin 1960) P. GEROUDET remarque que les Rémiz n'ont pas abordé le domaine Atlantique.

Dans le Tome 2 "les Passereaux d'Europe" (1973) il note encore l'extrême rareté des apparitions de la Rémiz dans les régions occidentales Françaises.

Pourtant, dans ces deux articles, GEROUDET insiste sur l'expansion remarquable des populations orientales de la Mésange Rémiz depuis le milieu du XXème siècle. Cette expansion entraînant une très forte augmentation des migrateurs et des erratiques de l'espèce.

Il conclut en envisageant une probable extension vers l'Ouest de l'aire de migration voire de nidification de la Rémiz.*

LES OBSERVATIONS A L'AUTOMNE 1983:

Jusqu'à ce jour, 8 données de Mésange Rémiz nous sont connues pour l'Ouest de la France. Il est certain que d'autres observations ne nous sont pas encore parvenues.

Nous devons nous attendre à des tentatives d'hivernage, notamment en Loire-Atlantique, qu'il sera bon de suivre.

* On peut aussi s'interroger, pour cette année sur le rôle joué par la météorologie: vents dominants Est-Sud-Est c.f. Les autres apparitions d'oiseaux orientaux dans l'ouest.??

1/10	Un chant entendu à Kergallan Plovan(29) P. MISIEK (com. S.S.N.O.F.)
11/11	3 individus, sans doute immatures, sont observés dans les marais de Machecoul (J.C. BEAUDOUIN, F. MOREAU, P. PAILLEY comm. pers.)*
11/11	5 individus, dont deux adultes, sont observés à Chanteloup Ile d'Olonne (de GRISSAC, JACQUEMIN, G. BALSME)
12/11	6 individus observés au même endroit (O. GIRARD O.N.C. Chanteloup)
15/12	3 individus sont capturés dans des filets dans un dortoir de Bruants des Roseaux (Emberiza schoeniclus) à Congor marais de Guérande (Y. CHEPEAU)
18/12	6 individus sans doute adultes au même endroit que le 15/12 (J.L. TRIMORLEAU, C. THOMAS, P. GURLIAT,
01/11	le chant de l'espèce est entendu à Beslé sur Vilaine(44) par Mr. NICOLAÛ- GUILLAUMET.
?	Arrivée de plusieurs centaines d'individus (2 ou 300) aux abords de la Gironde (A. FORMON) Charente-Maritime

*** 3+4 individus recontactés au même endroit le 27/12 (P. de GRISSAC, P. BORET, M. LEFRAN)

Cette "invasion" se fait sentir aussi dans des pays limitrophes que la Mésange Rémiz ne fréquentait que très occasionnellement au cours de ses déplacements migratoires, notamment la BELGIQUE et le LUXEMBOURG. Dans ce dernier pays, des contrôles de Rémiz bagués ont été fait: il est apparu que ces oiseaux venaient d'ALLEMAGNE Fédérale, d'ALLEMAGNE de l'Est et de POLOGNE. (C.R.P.B.,)

En SUISSE l'augmentation des Rémiz est très nette.

Toutes ces données ne sont que partielles, il sera bon de se reporter à la synthèse nationale de Mr. A. FORMON pour connaître le véritable "impact" de ce phénomène ornithologique.

CONCLUSION EN FORME DE QUESTIONS:

Il est sûr qu'alertés par ce "Rémiz Boum", les ornithologues vont en suivre l'évolution avec intérêt.

S'il paraît presque sûr aussi, que nous allons assister à des hivernages de Rémiz dans des zones nouvelles pour l'espèce, il est moins certain que ces hivernages débouchent sur de nouveaux sites de nidification.*

En effet la distribution de l'espèce montre assez clairement qu'elle paraît liée aux climats chauds et secs à la belle saison. GEROUDET constate qu'en SUISSE il y a une corrélation entre les prin-

* en fait, l'hivernage dans le 1/4 nord Ouest de la France semble devoir être assez marginal quantitativement par rapport à celui observé notamment en Charente Maritime.

temps secs et la présence de nicheurs dans ce pays.

Sans pouvoir, toutefois l'affirmer, on peut donc penser que le climat humide de nos régions ne favorisera pas l'installation de la mésange Rémiz, ou alors qu'à l'occasion de mois de Mai et Juin particulièrement beaux.

Ceci n'est, bien sûr qu'une hypothèse, nous avons dans beaucoup de domaines, la preuve de la capacité d'adaptation des espèces animales. Après la Panure à Moustaches (*Panurus biarmicus*), verront nous un jour la petite Rémiz affronter courageusement les tempêtes océaniques? Nous ne pouvons que le souhaiter!

IMPORTANT: La Mésange Rémiz est un oiseau assez discret et l'ornithologue peu habitué à l'espèce peut très bien "passer à côté".

La bonne connaissance des différents cris est une aide précieuse dans la découverte de l'espèce.

Cette Mésange peut fréquenter les roselières mais surtout les haies d'arbres (saules) bordant ces roselières où elle se nourrit d'insectes, de larves, d'araignées et de petites graines.

BIBLIOGRAPHIE:

- | | |
|---|-----------------------|
| "Les passereaux d'Europe" Tome II 1973 | P. GEROUDET |
| "Nos Oiseaux" N°270, 9ème de Vol. XXV 1960 | P. GEROUDET |
| "Guide des oiseaux de Camargue" | J. BONDEL P. ISENMANN |
| "Tous les oiseaux d'Europe" | B. BRUN A. SINGER |
| "Guide des Oiseaux d'Europe" | R. PETERSON |
| "Alauda" N°2 XXII 1954"..... | |
| "Notes sur les oiseaux de l'estuaire de la Loire" J. BOUAUD | |
| Bulletins "Ar Vran" (citations dans le texte) | |
| S.S.N.O.F. Bull. 1970 Tome LXVIII | S. KOWALSKI |
| Documents d'histoire naturelle OISEAUX | S.F.L. |

Remerciements à Olivier GIRARD (Technicien O.N.C. à la réserve de Chanteloup) ainsi qu'à Michel FOUQUET (idem), à Alain FORMON, R. GAUTRON, Y. CHEPEAU, C. THOMAS, J.C. BEAUDOUIN, Mlle J. ROUSSAIS (secrétaire de la section ornitho. S.S.N.O.F.), J.P. TARIS (O.N.C. Beziers).

TOUTES VOS DONNÉES DE MÉSANGES RÉMIZ SONT À TRANSMETTRE À:
Mr. Alain FORMON
Les Trois Jours 17 132 MÉSCHERS

