


COMITE D'HOMOLOGATION LOIRE-ATLANTIQUE et VENDEE

CH 44 - 85 

2013

# Les oiseaux rares en Loire-Atlantique et Vendée



© F. Portier

# Les oiseaux rares en Loire-Atlantique et Vendée en 2013

Willy RAITIÈRE et le CH44-85

## Quatrième rapport du comité d'homologation interdépartemental de Loire-Atlantique et Vendée

Voici le quatrième rapport des données homologuées par le comité inter-départemental de Loire-Atlantique et Vendée. Celui-ci concerne les données de l'année 2013. Ce comité, né de la fusion du CHD44 et du CHD85, a pris ses fonctions au 1er janvier 2010 et rassemble donc des ornithologues de Vendée et de Loire-Atlantique, chargés d'examiner les fiches concernant ces deux départements.

Trois associations sont partenaires et soutiennent le CH44-85 : les LPO Loire-Atlantique et Vendée ainsi que le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique (GNLA).

Pour l'année 2013, ce comité est composé des membres suivants :

- Eugène Archer (44)
- Mathieu Faveyrial (85)
- Bertrand Isaac (85)
- Frédéric Le Gallo (85) - Secrétaire du comité pour la Vendée
- Julien Mérot (44)
- Willy Raitière (44) - Secrétaire du comité pour la Loire-Atlantique
- Hugo Touzé (44)

Pour l'année 2013, le comité a examiné 93 fiches, parmi lesquelles 85 ont été validées, donnant un taux d'acceptation de 91,4 %.

Nous rappelons que seules les données homologuées sont présentées dans les rapports du CH44-85 et du CMR. Par ailleurs, nous vous informons que le comité a désormais cessé ses activités.

### FAITS MARQUANTS

Depuis la création du CH44-85 en 2010, 4 espèces font leur apparition dans le décompte : le **Goéland à ailes blanches** *Larus glaucoides* (cette espèce était auparavant du ressort du Comité d'Homologation National), le **Pipit à gorge rousse** *Anthus cervinus*, le **Crave à bec rouge** *Pyrhocorax pyrrhocorax*, et l'**Etourneau roselin** *Pastor roseus* (cette espèce était auparavant du ressort du Comité d'Homologation National). Par ailleurs, l'année 2013 est une

excellente année pour le **Goéland pontique** *Larus cachinnans*, le **Pouillot à grands sourcils** *Phylloscopus inornatus* et le **Bruant ortolan** *Emberiza hortulana*.

En ce qui concerne les espèces traitées par le Comité d'Homologation National, notons la première mention française du **Tarier de la caspienne** *Saxicola maurus variegatus* réalisée dans les marais de Guérande (44), ainsi que la première mention vendéenne du **Viréo à œil rouge** *Vireo olivaceus* (1 individu observé sur l'Île d'Yeu).

## LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre total de données homologués depuis la création du CH44-85 et celui des individus correspondants, à l'exception de l'année 2013. Les deux suivants représentent le nombre de données homologuées et le nombre d'individus correspondant pour 2013 par département.
3. Présentation des données par ordre chronologique d'observation (département, effectif, localité et date). Concernant le(s) nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique), la mention et al indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x) en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné au rapport du CH est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo).
4. Distribution générale de l'espèce (entre parenthèses) et statut dans les départements, puis commentaire.

La séquence taxonomique est celle de la liste des oiseaux du *Paléarctique occidental de la Commission de l'Avifaune Française* (CAF 2011). Les données concernant les races sont mentionnées comme "présentant les caractéristiques" de la sous-espèce concernée.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Cygne de Bewick - 1 individu le 26/02/2010, Saint-Joachim, Loire-Atlantique (J.L. Durin *et al.*, in LE GALLO et RAITIERE 2013).

\* Espèce soumise au CH44-85 hors de certaines zones géographiques.

\*\* Espèce soumise au CH44-85 pour une/des date(s) d'observation exceptionnelle(s).

### **Cygne chanteur** *Cygnus cygnus*

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)

2012 : 1 ad., phot., marais des Aises / St-Hilaire-de-Riez (85) du 22/12/12 au 25/03/2013 et non jusqu'au 02/01/2013 (G. Besseau *et al.*)

*(Se reproduit de l'Islande et la Scandinavie jusqu'au nord-est de la Sibérie, également en Mongolie).*

Cette espèce reste d'occurrence rare dans les deux départements. Le long stationnement de cet oiseau a permis à de nombreux observateurs de l'admirer.

### **Bernache cravant** *Branta bernicla*

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce "hrota", appelée Bernache à ventre pâle.

(15/17) (44 : 2/2 ; 85 : 1/2)

Loire-Atlantique : 1 ad. à la pointe de Pen Bé / Assérac du 10/11 au 01/12 (A. Gentric) ; 1 ad. dans le marais salant du Grévin / Guérande le 14/12 (J.-P. Tilly)

Vendée : 2 puis 1 ad. au Gois / Barbâtre du 26/11 au 26/12 (D. Robard et M. Grienenberger)

*(Canada arctique, Groenland, Spitzberg, Terre François-Joseph). Ce taxon est observé très régulièrement dans les deux départements. Cette année, les sites fréquentés sont très classiques (marais de Guérande et du Mès, île de Noirmoutier).*

### **Bernache cravant** *Branta bernicla*

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce "nigricans", appelée Bernache du Pacifique.

(6/4) (44 : 0/0 ; 85 : 4/3)

Vendée : 1 mâle ad. dans l'anse du Gois et sur le polder Sébastopol / Barbâtre du 06/01 au 09/04 (D. Robard) ; 1 ad. sur la vasière du Luzan et la RNN des marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île du 08/01 au 23/02 (E. Van Kalmthout) ; 1 ad. dans le secteur de l'anse du Gois et du polder Sébastopol / Barbâtre du 26/10 au 24/01/14 (D. Robard, M. Grienenberger *et al.*) et 1 mâle ad. sur le polder du Dain / Bouin du 13/12 au 06/02/14 (H. Touzé *et al.*)

2012 : 1 mâle prob. ad., à la Coupelasse / Bouin (85) du 29 au 01/01/13 (J.-Y. Frémont)

(Amérique arctique, Sibérie orientale). Hivernant rare mais très régulier sur les deux départements. L'oiseau fréquentant le secteur polder Sébastopol – anse du Gois est considéré comme étant le même individu.

### **Fuligule à bec cerclé** *Aythya collaris*

(7/6) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 mâle ad., phot., sur la station d'épuration du Salineau / Les Moutiers-en-Retz le 26/12 (R. Batard)

(Amérique du nord. S'égare régulièrement en Europe de l'Ouest, principalement dans les îles Britanniques).

Hivernant rare et irrégulier sur les deux départements. Les observations deviennent plus régulières ces dernières années, notamment en Loire-Atlantique.

### **Fuligule nyroca** *Aythya nyroca*

(8/9) (44 : 2/3 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 mâle ad., rade de Lambourg / Saint-Philbert-de-GrandLieu le 29/04 (E. Archer et A. Oates) ; sur le lac de Grand-Lieu, un couple était présent le 30/04 puis seul le mâle a été observé de manière régulière jusqu'au 22/05 (S. Reeber).

(Niche des Balkans et de l'Europe centrale jusqu'à l'Asie centrale, occasionnellement plus à l'ouest).

Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée ; plus régulier en Loire-Atlantique, notamment sur le Lac de Grand-Lieu.

### **Érismature rousse** *Oxyura jamaicensis* \*

(20/61) (44 : 3/4 ; 85 : 28/17)

Loire-Atlantique : en dehors du lac de Grand-Lieu, 1 mâle ad. à La Pierre du Bran / Saint-Joachim le 04/06 (E. Barussaud) ; 2 juv. le 13/08 sur la station de lagunage du Salineau / Les-Moutiers-en-Retz (D. Cléva) ; 1 femelle du 03 au 14/12 sur l'étang de Chahin / Sion-les-mines (J. Gauvin, K. Richard et P. Colin)

Vendée : Étang des Boucheries, jusqu'à 15 oiseaux dénombrés au maximum le 31/08 dont 1 nichée de 2 canetons. Après des tirs de régulation réalisés au début du mois de septembre (une douzaine d'oiseaux abattus) il restait encore 5 oiseaux le 06/09 (L. Chaillot, S. Mérand et al.)

2012 : 2 couples dont 1 avec 3 jeunes, phot., sur l'étang de Chahin / Sion-les-mines (44) du 25/06 au 20/08 (Faune-Loire-Atlantique.org)

*(Amérique du nord, introduite en Grande-Bretagne depuis 1960).*

Après une année sans observation, l'espèce est de nouveau notée en Loire-Atlantique en divers points du département (étangs du nord, Brière, littoral sud Loire). En Vendée, seul l'étang des Boucheries a accueilli l'espèce en 2013.


### **Grèbe jougris** *Podiceps grisegena*

(10/12) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 du 30/11 au 03/01/14 sur l'étang des Cosses / Saint-Martin-des-Noyers (P. Colin, M. et Mme Bariteau)

*(Dans le Paléarctique occidental, la population reproductrice s'étend de la Russie à l'Allemagne à l'ouest et à la Turquie au sud. Hivernent principalement le long des côtes du nord de l'Europe, de la mer Noire et de l'Adriatique).*

Migrateur et hivernant rare et irrégulier sur les deux départements. Le Grèbe jougris est généralement observé sur le littoral aussi, cette donnée concernant un oiseau sur un étang intérieur est originale.



Grèbe jougris *Podiceps grisegena*, Saint-Martin-des-Noyers, novembre 2013 (H. Touzé)

### **Ibis falcinelle** *Plegadis falcinellus*\*

(26/45) (44 : 1/7 ; 85 : 3/1)

Loire-Atlantique : jusqu'à 8 ind. observés en divers lieux du nord du Marais Breton à Bourgneuf-en-Retz et Bouin (85) entre le 08/10 et le 19/03/14 (V. Tanqueray, A. Doucet, G. Perruchas, R. Clavier)

Vendée : 5 puis 7 ind. au Daviaud puis au Pont Coton / La Barre-de-Monts du 26 au 28/09 (D. Robard, J. Pelloquin) puis entre le 08/10 et le 04/12 en divers lieux du nord du Marais Breton à Bourgneuf-en-Retz (44) et Bouin (V. Tanqueray, A. Doucet, G. Perruchas, R. Clavier) ; ce groupe incluait un individu bagué en Espagne ; 1 ind. sur le marais du Devin / L'Épine du 05 au 10/12 (D. Robard, J.-N. Pitaud).

2012 : 1 ind., phot., au Grand Pâtis / St-Mars-du-Désert (44) du 15 au 22/04 (Faune-Loire-Atlantique.org)

*(Se reproduit, en Europe, essentiellement dans l'est et le sud du continent. La plupart des oiseaux européens hivernent en Afrique tropicale ou à l'est de la Méditerranée. En France, l'espèce niche depuis 2006 en Camargue).*

Devenue régulière en Loire-Atlantique (l'Ibis falcinelle n'est plus soumis à homologation dans ce département à compter du 15/04/14), l'espèce fréquente désormais de plus en plus régulièrement la Vendée et notamment le marais breton.

### **Élanion blanc** *Elanus caeruleus*

(4/8) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. aux Brochettes / Treize-Septiers le 05/03 (P. Trécul, P., S. et F. Ouvrard)

2012 : 1 ind. observé depuis l'observatoire de St-Michel-en-l'Herm (85) le 21/10 (Faune-Vendee.org)

*(Europe, Afrique du Nord, Asie mineure).*

Espèce en forte expansion en France vers le nord. Après la nidification de l'espèce l'année précédente en Loire-Atlantique, c'est en Vendée que ce joli rapace est observé. Si les stationnements de l'espèce sont parfois longs, on ne peut pour autant pas encore parler de réelle installation dans nos départements puisque les individus observés ne font pas souche... pour le moment.

**Faucon kobez** *Falco vespertinus*

(1/1) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 femelle ad. sur l'île du Carnet / Frossay le 06/05 (W. Maillard)

*(Se reproduit essentiellement de la Hongrie jusqu'au fleuve Léna en Russie. Hiverné en Afrique australe).*

Migrateur occasionnel aux deux passages sur les deux départements, semblant plus régulier en Vendée qu'en Loire-Atlantique.

**Glaréole à collier** *Glareola pratincola*

(1/1) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ad. sur le lac de Maché / Maché le 28/09 (J.-Y. Barnagaud et M. Picard)

*(Niche sporadiquement du sud de l'Europe et du Maghreb jusqu'au Kazakhstan, Iran et Pakistan, ainsi qu'à travers l'Afrique, au sud du Sahara).*

Migrateur rare / irrégulier sur les deux départements aux deux passages. Si l'espèce est très rare en Loire-Atlantique, la Vendée accueille l'espèce tous les 2 ans environ.

**Pluvier guignard** *Charadrius morinellus*

(4/6) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 ad. sur la dune de la Tresson / La Guérinière le 08/04 (D. Robard et E. Gas) ; 1 juv. à la pointe de la Père / Île d'Yeu le 23/08 (M.-P. et X. Hindermeier, V. Auriaux)

2012 : 3 juv., phot., sur l'aérodrome / Île d'Yeu (85) le 08/10 (L. Jomat, C. Poirel, J. et S. Tillet)

*(Niche en Ecosse et de la Scandinavie jusqu'au sud-est de la Russie, à la Mongolie et à la Sibérie orientale. Hiverné des contreforts de l'Atlas marocain jusqu'à l'Iran en passant par tout le Maghreb, et sporadiquement dans le sud de l'Europe).*

Migrateur rare et irrégulier sur les deux départements aux deux passages, plus régulier en Vendée.

**Bécasseau tacheté** *Calidris melanotos*

(24/28) (44 : 3/3 ; 85 : 3/3)

Loire-Atlantique : sur le lac de Grand-Lieu : 1 juv. le 04/09, 1 juv. du 11 au 19/09 (S. Reeber), 1 juv. à La Gautière / Bourgneuf-en-Retz du 07 au 13/10 (V. Tanqueray)



Vendée : 1 ind. à la Prée Mizotière / Sainte-Radégonde-des-noyers le 09/05 (L. Barbaro, A. Thomas), 1 ind. au Marais Cadrit / Les Sables-d'Olonne du 28/08 au 02/09 (A. Barzic), 1 ind. sur le Lac de Maché - Apremont du 15 au 18/09 (F. Le Gallo)

*(Niche dans l'Arctique nord-américain, de l'ouest de la baie d'Hudson à l'Alaska et en Sibérie, à l'ouest jusqu'à la péninsule de Yamal. Hiverné en Amérique du sud, dans le sud-est de l'Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande).*

Rare et irrégulier au printemps mais désormais régulier à l'automne.

### **Chevalier stagnatile** *Tringa stagnatilis*

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)

2012 : 1 ad., phot., au Fresne / Bourgneuf-en-Retz (44) le 20/04 (Faune-Loire-Atlantique.org)

*(Se reproduit dans le centre de l'Eurasie, de l'est de la Biélorussie à l'est du lac Baïkal).*

Migrateur rare dans les deux départements. Semblant de moins en moins régulièrement observé en Vendée.

### **Labbe à longue queue** *Stercorarius longicaudus*

(3/3) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. de 1A à la pointe des Corbeaux / Île d'Yeu le 22/10 (M.-P. Hindermeier)

*(La sous-espèce nominale se reproduit de la Scandinavie et Russie arctiques et subarctiques jusqu'au delta de la Léna, en Sibérie).*

Espèce très rare dans les deux départements. L'Île d'Yeu voit passer l'espèce pour la deuxième année consécutive.

### **Goéland railleur** *Chroicocephalus genei*

(4/1) (44 : 0/0 ; 85 : 1/0)

Vendée : 1 ad. séjournant annuellement sur l'île de Noirmoutier depuis 2003

*(Se reproduit du Sénégal à la mer Méditerranée et jusqu'au Moyen-Orient, Kazakhstan et Pakistan).*

Il s'agit de l'individu découvert en 2003 et qui ne quitte désormais plus l'île.

### **Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis***

(9/7) (44 : 1/1 ; 85 : 1/0)

Loire-Atlantique : 1 ad. sur l'étang du Bois Joalland / Saint-Nazaire le 17/03 (J. Bourlès)  
Vendée : 1 ad. sur le marais Chessé / Noirmoutier-en-l'Île du 18/02 au 06/04 (D. Robard,  
E. Gas, B. Thibeaud)

*(Niche dans le centre, le sud-ouest et l'est de l'Amérique du Nord. Hivernant et migrateur néarctique rare fréquentant surtout les zones côtières. Très occasionnel dans les terres).*  
Hivernant et migrateur rare et irrégulier sur les deux départements. Certains secteurs vendéens comme l'île de Noirmoutier accueillent tout de même l'espèce annuellement. L'oiseau noirmoutrin n'a pas été comptabilisé car il s'agit probablement d'un hivernant habituel.

### **Goéland pontique *Larus cachinnans***

(3/3) (44 : 5/5 ; 85 : 3/3)

Loire-Atlantique : plusieurs données en provenance du centre d'enfouissement technique des Briouilles / Treffieux et de ses alentours : 1 oiseau de 2<sup>me</sup> année civile, phot., (bagué le 25/05/12 à Kozielno, Paczkow, Pologne) du 02/01 au 23/02 (W. Raitière, J. Mérot et Y. Brilland), 1 2<sup>me</sup> année civile, phot., (bagué le 29/05/12 à Jankowice, Zwirownia, Babice, Pologne) du 02/01 au 26/03 (W. Raitière et Y. Brilland), 1 2<sup>me</sup> année civile, phot., le 15/01 (W. Raitière), 1 2<sup>me</sup> année civile, phot., le 19/01 (W. Raitière) et 1 1<sup>re</sup> année civile, phot., le 20/11 (W. Raitière et Y. Brilland)

Vendée : 1 2<sup>me</sup> année civile, phot., à Sion sur l'océan / Saint-Hilaire-de-Riez le 17/02 (G. Besseau) ; 1 2<sup>me</sup> année civile, phot., (bagué le 25/05/12 à Kozielno, Paczkow, Pologne) le 16/03 sur le marais du Fenouiller / Le Fenouiller (G. Besseau) ; 1 1<sup>re</sup> année civile, phot., (bagué le 28/05/13 à Nové Mlýny II, Mušov, Jihomoravský en République Tchèque) à la Paracou / Les Sables-d'Olonne le 11/09 (A. Barzic)

2009 : 1 ad. (bagué le 06/06/06 à Jankowice, Zwirownia, Babice, Pologne), phot., sur la plage Clémenceau / Saint-Vincent-sur-Jard (85) le 27/01 (J.-C. Croisé), précédemment refusé, désormais accepté après examen de nouveaux éléments

*(Niche de la mer Noire jusqu'au Kazakhstan. S'est installé récemment près de Moscou ainsi qu'en Pologne et en Allemagne. Hiverné dans le golfe Persique, en mer Rouge et en effectif moindre dans le centre, le nord et l'ouest de l'Europe).*

La meilleure connaissance de l'espèce ainsi que les suivis plus fréquents des groupes de Laridés sur le littoral ou sur les décharges montrent que l'espèce est régulière sur les deux départements.



Goéland pontique *Larus cachinnans*, Jans, janvier 2013 (W. Raitière)

### **Goéland bourgmestre** *Larus hyperboreus*

(7/7) (44 : 0/0 ; 85 : 3/3)

Vendée : 1 ind. de 2A du 22 au 25/02 dans le port de St Gilles-Croix-de-Vie (G. Besseau) ; 1 ind. de 1A du 29/12 au 26/02/14 au barrage du Moulin Papon / La Roche-sur-Yon puis dans le secteur du Logis de St-Mars / La Chaize-le-Vicomte (M. Bibard, T. You) ; 1 ind. de 1A dans le port des Sables-d'Olonne le 30/12 (B. Paepegaey)

*(Niche au Groenland et en Islande puis de l'île Jan Mayern et du Spitzberg jusqu'en Sibérie. Hivernent surtout dans le nord de l'Atlantique jusqu'en Grande-Bretagne ; effectifs réduits plus au sud, présence occasionnelle en Suisse, en mer Caspienne et en Méditerranée).*

Hivernant rare et irrégulier en Loire-Atlantique, assez régulier en Vendée. La donnée vendéenne de La Roche-sur-Yon est une des rares observations de l'espèce à l'intérieur des terres. Il s'agit toutefois de la deuxième concernant un oiseau observé au dortoir sur le barrage du Moulin Papon après un immature le 21 janvier 2000.

### **Goéland à ailes blanches** *Larus glaucoides*

(0/0) (44 : 3/3 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : plusieurs données en provenance du centre d'enfouissement technique des Brioules / Treffieux et de ses alentours : 1 ind de 2A du 19/01 au 22/03 (W. Raitière, J. Mérot et Y. Brilland) ; 1 ind. de 2A du 25/01 au 22/03 (W. Raitière et J. Mérot) ; 1 ind de 2A du 06 au 22/03 (W. Raitière, J. Mérot et Y. Brilland)

Vendée : 1 ind. de 2A, phot., sur la plage de la Tourette / Île d'Yeu du 29 au 31/10, retrouvé mort le 11/11 (F. Portier et X. Hindermeier)

*(Niche de l'arctique canadien au Groenland. Hiverne surtout dans le nord de l'Atlantique, des Etats-Unis à la Norvège).*

Il s'agit de la première apparition de l'espèce suite à sa suppression au 1er janvier 2013 de la liste des espèces soumises à homologation au niveau national. Hivernant rare mais régulier Vendée, nettement plus irrégulier en Loire-Atlantique. Le suivi des décharges permet de contacter l'espèce de façon plus régulière, notamment en Loire-Atlantique.

### **Sterne hansel** *Gelochelidon nilotica*

(5/6) (44 : 0/0 ; 85 : 2/3)

Vendée : 1 ad. du 18 au 22/04 sur la station de lagunage de La Tranche-sur-mer (F. Portier) ; 2 ad. en vol au-dessus de la dune de la Grande Conche / Île d'Yeu le 28/04 (X. Hindermeier).

*(Du sud de l'Europe au Kazakhstan, au sous-continent indien et au nord-est de la Chine; également en petit nombre en Allemagne et au Danemark).*

Migratrice rare et irrégulière sur les deux départements.

### **Sterne de Dougall** *Sterna dougallii*

(5/9) (44 : 0/0 ; 85 : 4/4)

Vendée : plusieurs données ont été recueillies sur le polder de Sébastopol / Barbâtre : 1 ad. du 13 au 15/05 (D. Robard), 1 ad. le 29/06 (D. Robard), 1 ad. du 07 au 09.07 (D. Robard et A. Trompat) ; 1 ad. le 23/06 à la pointe de l'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'île (D. Robard) ; 1 ad. le 18/08 à la pointe du But / Île d'Yeu (M.-P. et X. Hindermeier)

*(Des côtes est de l'Amérique du nord et des Antilles au nord du Venezuela, aux Açores et dans le nord-ouest de l'Europe).*

Migrateur occasionnel sur les deux départements. La colonie de sternes du polder de Sébastopol attire régulièrement cette espèce.

### **Guifette leucoptère** *Chlidonias leucopterus*

(27/46) (44 : 7/13 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : plusieurs individus sur le lac de Grand-Lieu : 3 ad. les 23 et 24/05, 1 ad. le 29/04, 2 ad. les 02 et 03/05, 1 1A le 24/08 et 2 1A du 26 au 28/08 (S. Reeber) ; 3 ad. au Camp d'Aine / Trignac le 18/05 (D. Cléva *et al.*) ; 1 ad. sur le grand réservoir de Vioreau / Joué-sur-Erdre le 21/06 (R. Batard)

Vendée : 1 ind. de 1A du 29/08 au 01/09 à la station de lagunage de Jard-sur-Mer (M. Pirio)

*(Niche de l'Europe de l'Est à la Sibérie orientale (région de l'Amour)).*

Hiverné principalement en Afrique tropicale). En Loire-Atlantique, l'espèce est désormais très régulière sur le lac de Grand-Lieu ainsi qu'en Brière. L'espèce reste rare, bien que régulière en Vendée aux deux passages.

### **Macareux moine** *Fratercula arctica*

(1/1) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ad. observé au large des îles de Noirmoutier et de Yeu (coord. géo. 46,80167 ; - 2,67748) le 09/10 (E. Ouvrard, Q. Lelièvre et A. Boué)

*(La sous-espèce nominale niche en Grande-Bretagne, Irlande, îles Féroé, sud de la Norvège, îles Anglo-Normandes et Bretagne).*

Cette observation concernant 1 individu vivant observé au large montre que la présence de l'espèce est probablement plus régulière que ne le montrent les quelques données récoltées depuis la côte. Malheureusement pour les observateurs, les Macareux moines sont présents principalement au large, hors de portée des longues-vues des ornithologues.

### **Coucou-geai** *Clamator glandarius*

(12/12) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 ad. dans le secteur du marais de la Chèvrerie / Noirmoutier-en-l'île le 24/04 (F. Leblois et D. Serrano) ; 1 ad. du 04/05 au 13/05 aux Mauviollières / L'Epine (D. Robard et E. Gas)

*(Europe méridionale, Moyen-Orient, Afrique du nord).*

Migrateur rare mais de plus en plus régulier au printemps, notamment en Vendée. Le secteur des Mauviollières à L'Epine accueille son deuxième individu en 2 ans, à chaque fois au printemps.

**Petit-Duc scops *Otus scops* \***

(3/3) (44 : 0/0; 85 : 1/1)

Vendée : 1 chanteur à proximité du marais Mottou / Île d'Yeu le 06/07 (M.-P. et X. Hindermeyer)

*(La sous-espèce nominale se reproduit de la France à la Volga, au nord des Pyrénées, de la Grèce et de la Turquie).*

Il s'agit seulement de la 4ème donnée circonstanciée sur l'Île d'Yeu. Des recherches ciblées sur cette espèce permettront peut-être de redécouvrir des preuves de reproduction (l'espèce était nicheuse jusqu'en 1984 au moins) sur cette île à l'avenir.

**Martinet à ventre blanc *Apus melba***

(3/4) (44 : 0/0; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. à la Maison de Clémenceau / Saint-Vincent-sur-Jard le 06/10 (M. Pirio)

*(Sud de l'Europe, Asie mineure et Afrique du nord).*

Migrateur rare et irrégulier sur les deux départements.

**Pipit de Richard *Anthus richardi***

(6/11) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. sur la dune de la Plage de la Tourette / Île d'Yeu le 23/10 (M.-P. et X. Hindermeyer)

2011 : 1 ind. sur les dunes des Granges / Olonne-sur-Mer (85) le 21/11 (D. Desmots)

*(La sous-espèce type niche de la Sibérie occidentale à la Mongolie et hiverne principalement au Pakistan, en Inde, Chine et Asie du Sud-Est, mais aussi assez régulièrement très à l'ouest de ces quartiers habituels (Espagne, Afrique du Nord...)).*

Migrateur et hivernant rare et irrégulier sur les deux départements. Ces données automnales et littorales sont classiques.

**Pipit à gorge rousse** *Anthus cervinus*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

2012 : 1 ind. de 1A, phot., dans le marais de la Guerche / Île d'Yeu (85) du 09 au 11/10  
(L. Jomat, C. Poirel, J. Tillet)

*(Niche dans la toundra arctique et sub-arctique, de la Norvège à l'Alaska ; hiverne principalement dans les zones tropicales d'Afrique et d'Asie du sud-est).*

Migrateur rare et irrégulier sur les deux départements. Il s'agit de la première donnée concernant cette espèce depuis la création du comité.



Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*, Île d'Yeu, octobre 2012 (J. Tillet)

**Bergeronnette printanière** *Motacilla flava*

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce "*thunbergi*", appelée Bergeronnette printanière nordique.

(1/1) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 mâle ad. dans le marais de la Guerche / Île d'Yeu du 26 au 28/04 (X. Hindermeyer)

2012 : 1 mâle ad. sur la plage de Ker Châlon / Île d'Yeu (85) le 04/05 (F. Portier)

*(de la Norvège au nord de la Sibérie).*

Migrateur rare et irrégulier sur les deux départements. Il s'agit de la deuxième et troisième donnée pour la Vendée. Taxon à rechercher en Loire-Atlantique, au printemps en particulier.

### **Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola***

(9/9) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)

Rappel : espèce soumise à homologation uniquement en dehors des opérations de baguage.

2012 : 1 ind. à la balise des Moutons / Donges (44) le 22/08 (C. Giacomo) ; 1 ind. de 1A à la Grande Bayaille / St-Philbert-de-Grand-Lieu (44 ; lac de Grand-Lieu) le 12/08 (H. Touzé et W. Raitière)

*(Niche dans les états Baltes, en Biélorussie et en Russie, ainsi qu'en Pologne, en Hongrie et en Allemagne. Hiverné en Afrique de l'Ouest, au moins dans le delta du Sénégal).*

Seules les données d'oiseaux non capturés sont traitées dans ce rapport. Les opérations de baguage menées dans les deux départements montrent que l'espèce est de passage régulier durant le mois d'août dans les principales zones humides, littorales ou non.

### **Hypolaïs icterine *Hippolaïs icterina***

(4/4) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 ind. de 1A, capt. et phot., le 22/08 dans le marais de Pompas / Herbignac (A. Gentric et A. Gergaud)

Vendée : 1 ind. le 16/08 à la décharge de l'Île d'Yeu (M.-P. et X. Hindermeyer)

2012 : 1 ind. de 1A aux Tabernaudes / Île d'Yeu (85) le 01/09 (F. Portier)

*(Nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et l'est de l'Oural).*

Très rare sur les deux départements.





Hypolaïs icterine *Hippolais icterina*, Herbignac, août 2013 (A. Gentric)

**Fauvette passerinette** *Sylvia cantillans*

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 mâle ad. dans la dépression de la Grande Conche / Île d'Yeu le 09/10 (F. Portier)

(Europe méditerranéenne).

Il s'agit seulement de la deuxième observation vendéenne et de la première pour l'Île d'Yeu.

**Fauvette babillarde** *Sylvia curruca*

(5/5) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. le 07/10 à la pointe des Corbeaux / Île d'Yeu (B. Isaac et J.-M. Guilpain)

(Nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et l'est de l'Oural).

Très rare sur les deux départements. L'espèce est cependant régulièrement observée sur l'île d'Yeu à l'automne.

### **Pouillot à grands sourcils** *Phylloscopus inornatus*

(38/40) (44 : 1/1 ; 85 : 22/24)

Loire-Atlantique : 1 ind. dans la saulaie de la saline de Gau / La Turballe du 26/10 au 10/11 (L. Bellion, T. Heugas et al.)

Vendée : 1 ind. dans la dépression de la dune de la Grande Conche / Île d'Yeu le 04/10 (M. Faveyrial) ; 1 ind. à la pointe des Corbeaux / Île d'Yeu le 07/10 (B. Isaac et J.-M. Guilpain) ; 1 ind. dans le camping / Île d'Yeu le 07 et 08/10 (F. Portier) ; 1 ind. au marais de la Guerche / Île d'Yeu le 08/10 (F. Portier) ; 1 ind. impasse de la Borgne / Île d'Yeu le 08 et 09/10 (F. Portier et al.) ; 1 ind. impasse de la Borgne / Île d'Yeu du 12 au 14/10 (X. Hindermeyer et F. Portier) ; 1 ind. dans le marais de la Croix / Île d'Yeu le 12/10 (X. Hindermeyer et F. Portier) ; 2 ind. dans le marais de la Guerche / Île d'Yeu le 13/10 puis 1 seul le 14/10 (F. Portier et X. Hindermeyer) ; 2 ind. dans la dépression de la dune de la Grande Conche / Île d'Yeu le 13/10 (X. Hindermeyer et F. Portier) ; 1 ind. dans le vallon des Broches / Île d'Yeu le 14/10 (X. Hindermeyer et F. Portier) ; 1 ind. dans le camping / Île d'Yeu le 14/10 (X. Hindermeyer) ; 1 ind. impasse de la Borgne / Île d'Yeu le 20/10 (X. Hindermeyer) ; 1 ind. aux Grands Prés de la Grange / Jard-sur-mer le 20/10 (M. Pirió) ; 1 ind. aux Agaures / Les Sables-d'Olonne (85) les 23 et 24/10 (A. Barzic) ; 1 ind. à la station d'épuration / Île d'Yeu le 25/10 (X., M.-P. et A. Hindermeyer) ; 1 ind. dans la saulaie des Poupounes / Île d'Yeu le 25/10 (X., M.-P. et A. Hindermeyer) ; 2 ind. dans le vallon des Broches / Île d'Yeu le 25/10 (X., M.-P. et A. Hindermeyer) ; 1 ind. dans la saulaie de St-Sauveur / Île d'Yeu le 25/10 (X., M.-P. et A. Hindermeyer) ; 1 ind. dans la dépression de la dune de la Grande Conche / Île d'Yeu le 25/10 (X., M.-P. et A. Hindermeyer) ; 1 ind. dans le chemin de la Gallée / Île d'Yeu le 30/10 (F. Portier) ; 1 ind. dans la dépression de la dune de la Grande Conche / Île d'Yeu le 22/11 (F. Portier)

2012 : 1 ind. dans la dépression de la dune de la Grande Conche / Île d'Yeu (85) les 12 et 13/10 (L. Jomat, C. Poirel, J. et S. Tillet)

*(Niche dans le nord de la Russie, de la Petchora et de l'Oural à l'ouest, jusqu'à l'Anadyr et la mer d'Orkhotsk à l'est et au sud jusqu'à la Mongolie et au nord-est de la Chine. Hiverne dans le sud-est de l'Asie).*

Espèce emblématique rare mais très régulière chaque automne en Vendée, plus exceptionnelle curieusement en Loire-Atlantique. L'année 2013 est de nouveau une très bonne année pour cette espèce en Vendée. Comme souvent, l'île d'Yeu rassemble la majorité des données avec 22 individus en 2013. La donnée de 2012 porte à 13 le nombre d'individus observés sur l'île d'Yeu cette année-là.

### **Pouillot de Bonelli** *Phylloscopus bonelli*

(7/9) (44 : 2/2 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ind. chanteur du 10 au 12/05 en forêt d'Ancenis / Riaillé (V. Tanqueray et Y. Brilland) ; 1 ad. le 23/07 dans le marais de Guérande à la Paroisse (W. Maillard)

*(Nord-ouest de l'Afrique, nord et centre de l'Europe).*

Migrateur rare, principalement observé au printemps. Les données concernent principalement des individus chanteurs en migration pré-nuptiale. Des cantonnements prolongés peuvent parfois être observés. Aucune preuve de reproduction récente n'a cependant été rapportée dans les deux départements.

### **Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator*

(20/22) (44 : 2/2 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 ind. de la ssp. *senator* à Fort Aguet / St-Brévin-les-pins le 13/04 (L. Gourdel) ; 1 ind. de la ssp. *senator* aux Grands Prés / Varades le 16/05 (V. Tanqueray)

Vendée : 1 mâle probable ad. de la ssp. *senator* à Cailla / Barbâtre du 17 au 20/04 (D. Robard et B. Thibeaud)

*(Europe de l'ouest et îles de la Méditerranée).*

Migrateur rare aux deux passages, régulier en Vendée. L'île d'Yeu et de Noirmoutier demeurent les sites vendéens les plus attractifs pour contacter cette espèce. La présence de l'espèce semble de plus en plus régulière en Loire-Atlantique.

### **Crave à bec rouge** *Pyrhocorax pyrrhocorax*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/2)

Vendée : 2 ad. en divers points de la côte sauvage de l'Île d'Yeu du 30/06 au 17/09 (X. Hindermeyer, S. Desmarest et V. Auriaux)

*(Présent en France dans les zones montagneuses et les falaises littorales de Bretagne).*

Espèce très rare sur le littoral atlantique en dehors de ses zones de reproduction finistériennes. Il s'agit de la 4<sup>me</sup> mention de l'espèce en Vendée, la précédente datant de 1999 à la Chaize-le-Vicomte (Hindermeyer *et al.*, 2014). Notons que deux autres observations de Crave à bec rouge sur le littoral vendéen, réalisées également en 2013 ne sont pas remontées au CH44-85.



Crave à bec rouge *Pyrrhocorax pyrrhocorax*, Île d'Yeu, septembre 2013 (F. Portier)

**Etourneau unicolore** *Sturnus unicolor*

(4/4) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ad. à la pointe de l'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'île le 12/10 (D. Robard)

2012 : 1 mâle ad. du 18 au 20/10 dans le village de Ker Châlon / Île d'Yeu (85) (F. Portier, M. Faveyrial)

*(Niche dans le Maghreb, en Espagne, Sicile, Sardaigne, Corse et dans le sud de la France).*

L'espèce avait déjà été observée en 2011 sur les îles de Noirmoutier et d'Yeu. Il est possible qu'il s'agisse des mêmes individus qui fréquentent toujours ces sites cependant il est troublant que ceux-ci ne soient pas observés en dehors des dates présentées ci-dessus. Ces oiseaux ont donc été considérés comme de nouveaux individus.

### **Etourneau roselin** *Pastor roseus*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 3/3)

Vendée : 1 juv. dans le port de l'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'île le 04/09 (D. Robard) ; 1 juv. sur les plages des Bossilles et de la Borgne / Île d'Yeu le 07 et 08/09 (M.-P. et X. Hindermeyer) ; 1 juv. plage de la Fosse / Barbâtre le 15/09 (D. Robard)

*(Europe du sud-est, Asie du sud-ouest).*

Précédemment soumise à homologation au niveau national, l'espèce fait son apparition dans le rapport du CH44-85 pour la première fois suite à sa suppression de la liste nationale. Les dates de présence et les sites fréquentés en 2013 sont conformes à ce que l'on connaît de l'espèce. Notons que si l'Etourneau roselin est régulier en Vendée, il reste très rare en Loire-Atlantique.

### **Bruant ortolan** *Emberiza hortulana*

(16/22) (44 : 0/0; 85 : 10/12)

Vendée : 1 mâle ad. sur le polder de Sébastopol / Barbâtre le 14/04 (D. Robard) ; 1 ind. de 1A à Puyrajou / Venansault le 28/08 (F. Portier) ; 2 ind. sur la dune de la Grande Conche / Île d'Yeu le 28/08 (M.-P. et X. Hindermeyer). Plusieurs individus ont été capturés et bagués le long du canal de Luçon / Triaize : 2 le 31/08, 1 le 01/09, 1 le 02/09, 1 le 03/09, 1 le 05/09, 1 le 11/09, 1 le 12/09 (J. Gonin)

2011 : 1 ind. à La Barre / La Chapelle-Achard (85) le 21/08 (B. Dallet)

*(Europe de l'ouest à la Turquie).*

Migrateur peu commun sur les deux départements. L'espèce peut être observée aux deux passages, y compris en dehors du littoral. L'espèce est plus régulièrement notée en Vendée qu'en Loire-Atlantique.

## Liste des données non homologuées

### **Bernache cravant à ventre pâle** *Branta bernicla hrota*

1 ind. en baie de Pont Mahé / Assérac (44) le 02/01 – Description jugée insuffisante.

### **Bernache cravant du Pacifique** *Branta bernicla nigricans*

1 ind. dans le Petit Traict / Guérande (44) le 26/01 – Si le site est classique, il manque trop d'éléments permettant de trancher en faveur de ce taxon.

### **Fuligule nyroca** *Aythya nyroca*

1 f. sur la station de lagunage de Jard-sur-mer (85) le 24/11 – L'individu présente des caractères de cette espèce mais il ne nous est pas possible d'exclure la possibilité d'un hybride. Pas de photo disponible.

### **Elanion blanc** *Elanus caeruleus*

1 ind. dans le lotissement du Ranzay / Nantes (44) le 24/07 – La description n'est pas conforme avec l'espèce proposée.

### **Labbe à longue queue** *Stercorarius longicaudus*

1 imm. depuis la jetée du Tréhic / Le Croisic (44) le 29/10 – Certains éléments vont dans le bon sens mais la description est jugée insuffisante.

### **Goéland à bec cerclé** *Larus delawarensis*

1 ad. sur la station de lagunage de Jard-sur-Mer (85) le 20/01 – Les photos fournies montrent un Goéland argenté.

### **Goéland pontique** *Larus cachinnans*

1 imm. au port de St-Lumine-de-coutais (44) le 14/05 – Oiseau en plumage trop dégradé et photos insuffisantes pour être certain de l'identification.

### **Jaseur boréal** *Bombycilla garrulus*

1 ind. dans le quartier de l'Eraudière à Nantes (44) le 18/12/12 – La description est jugée insuffisante pour cette espèce si remarquable.

### **Mésange boréale** *Poecile montanus*

1 ind. enregistré à Terre Rouge / Carquefou le 17/01 – Malgré des vocalises inhabituelles, il s'agit d'une Mésange nonnette. Identification confirmée par Magnus Robb, expert sollicité par le comité.

## Liste des données homologuées par le Comité d'Homologation National en 2013

Les données ci-dessous sont issues du rapport 2013 du Comité d'Homologation National (Kayser, Verneau & le CHN 2015) et concernent les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée.

### **Oie à Bec Court** *Anser brachyrhynchus*

Loire-Atlantique : 2 ind. au port de St-Lumine-de-Coutais (lac de Grand-Lieu) le 21/05 (W. Maillard et P. Ouvrard)

Vendée : 1 ind. à Lairoux du 16/02 au 07/03 (P. Trotignon)

2012 : 1 ad. dans les prairies de l'estuaire de la Loire à Lavau-sur-Loire (44) le 13/02 (O. Penard, G. Gaudichon, P.-A. Cottrant)

### **Oie rieuse du Groënland** *Anser albifrons flavirostris*

2012 : 1 ad. dans les mizottes de Triaize (85) le 16/01 (F. Portier)

### **Canard à front blanc** *Anas americana*

Loire-Atlantique : 1 femelle ad. sur le lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44) le 20/03 (S. Reeber)

Vendée : 4 mâles et 5 femelles dans le marais salé / Île d'Yeu (85) du 10 au 12/11 puis 1 femelle le 13/11 (X. et M.-P. Hindermeier et al.)

### **Sarcelle à ailes vertes** *Anas carolinensis*

Vendée : 2 mâles ad. sur la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (85) du 31/01 au 25/03 (P. Trotignon)

2012 : 1 mâle ad. au Gorgeais / Lairoux (85) le 11/03 et non les 03 et 11/03 (F. Veyrunes, K. Schmale, G. Welch et al.)

### **Sarcelle à ailes bleues** *Anas discors*

Loire-Atlantique : 1 femelle prob. sur le lac de Grand-Lieu / St-Philbert-de-Grand-Lieu (44) le 17/09 (S. Reeber)

**Sarcelle marbrée** *Marmaronetta angustirostris*

Loire-Atlantique : 1 type femelle sur le lac de Grand-Lieu / St-Lumine-de-Coutais (44) le 13/05 (S. Reeber)

**Fuligule à tête noire** *Aythya affinis*

Loire-Atlantique : 1 femelle le 11/01 et 1 mâle de 2ème année le 15/04 sur le lac de Grand-Lieu / St-Philbert-de-Grand-Lieu (44) (S. Reeber)

**Macreuse à front blanc** *Melanitta perspicillata*

Vendée : 1 femelle du 03 au 22/01 à la Roche Biron / Brétignolles-sur-mer (N. Biron) et 1 ind. à Givrand le 19/01 (www.ornithos.fr)

**Busard pâle** *Circus macrourus*

2012 : 1 mâle ad. à Benet (85) le 21/08 (F. Caquineau) et non à Bennet

**Aigle criard** *Aquila clanga*

Vendée : 1 ad. à St-Denis-du-Payré le 25/05 (P. Trotignon)

**Pluvier bronzé** *Pluvialis dominica*

Loire-Atlantique : 1 ind. de 2A en bordure du lac de Grand-Lieu / St-Mars-de-Coutais du 14 au 19 mai (S. Reeber)

Vendée : 1 ad. dans le marais des Loirs / Olonne-sur-mer le 05/09 (O. Girard)

**Bécasseau rousset** *Tryngites subruficollis*

Vendée: 1 ind. de +1A sur le lac de Maché-Apremont / Maché du 4 au 14/09 (F. Portier, D. Cléva et al.) puis 1 ind. de 1A au même endroit du 25 au 30/09 (F. Portier, D. Cléva et al.)

**Chevalier bargette** *Tringa cinerea*

Vendée : 1 ad. à St-Denis-du-Payré le 16/05 (P. Trotignon)

**Mouette de Bonaparte** *Chroicocephalus philadelphia*

Loire-Atlantique: 1 ind. de 2A sur la lac de Grand-Lieu / St-Mars-de-Coutais le 16/05 (A. Oates et E. Archer)



**Mouette atricille** *Larus atricilla*

Vendée : 1 ind. de 2A à l'Aiguillon-sur-mer du 12 au 14/11 (www.ornitho.fr)

**Goéland à ailes blanches** *Larus glaucoides*

2012 : 1 ind. de 2A à St-Gilles-Croix-de-Vie (85) le 09/05 (www.ornitho.fr)

**Goéland de kumlien** *Larus glaucoides kumlieni*

Loire-Atlantique : 1 ind. de 2A au Bout de la Rue / Guérande le 21/02 (W. Raitière)

**Sterne élégante** *Sterna elegans*

Vendée : 1 ind. le 12 et le 26/05 (www.ornitho.fr) puis 1 ad. du 09/06 au 02/07 au polder Sébastopol / Barbâtre (D. Robard, J. Gernigon, H. Hindermeier et al.)

**Bergeronnette des balkans** *Motacilla flava feldegg*

Vendée : 1 mâle ad. sur la station d'épuration de Barbâtre le 09/06 (D. Robard et M. Guimbretière)

**Tarier de la caspienne** *Saxicola maurus variegatus*

Loire-Atlantique : 1 mâle à Sissable / Guérande du 29/01 au 07/04 (W. Raitière, H. Guennec et E. Archer)

**Traquet pie** *Oenanthe pleschanka*

Loire-Atlantique : 1 mâle sur l'île de Rostu / Mesquer le 04/04 (C. Lehy)

**Pouillot brun** *Phylloscopus fuscatus*

Loire-Atlantique : 1 ind. capturé sur le lac de Grand-Lieu / St-Philbert-de-Grand-Lieu le 30/10 (O. Poisson, Y. Brilland et al.)

**Viréo à œil rouge** *Vireo olivaceus*

Vendée : 1 ind. dans le vallon des Broches / Île d'Yeu le 11/10 (J. Tillet)

**Roselin cramois** *Carpodacus erythrinus*

Vendée : 1 ind. de 1A à Port Joinville / Île d'Yeu le 05/10 (X. et M.-P. Hindermeier)

## BIBLIOGRAPHIE

- 📖 Bellion P., 2013. Reproduction du Coucou geai *Clamator glandarius* en Loire-Atlantique. *Ornithos* 20(1) : 64-65.
- 📖 CAF, 2011. Liste des oiseaux du Paléarctique occidental. *Ornithos* 18(3) : I-XXVIII.
- 📖 Cléva D. et Naud C., 2014. Suivi d'un couple reproducteur d'Elanion blanc *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789) en Loire-Atlantique. *Chronique naturaliste du GNLA - années 2012 et 2013* : 9-18.
- 📖 Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Olioso G. et Yésou P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, 560 p.
- 📖 Hindermeyer X. et M.-P., Auriaux V., Desmarest S. et Portier F., 2014. Premières données de Crave à bec rouge à l'Île d'Yeu (Vendée). *La Gorgebleue 2.0*, 006-FV2014, 7 p., [www.faune-vendee.org](http://www.faune-vendee.org).
- 📖 Kayser Y., Paepegaey B. et le CHN, 2014. Les oiseaux rares en France en 2012. *Ornithos* 21(2) : 65-107.

Willy RAITIÈRE - 62, Rougerand 44590 SAINT-VINCENT-DES-LANDES  
([wild\\_wild\\_will\\_2000@yahoo.fr](mailto:wild_wild_will_2000@yahoo.fr))

– septembre 2017 –

### Remerciements :

Le comité remercie l'ensemble des observateurs qui ont adressé leurs fiches.