

LES OISEAUX RARES EN LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDEE EN 2010

Frédéric PORTIER, Willy RAITIERE et le CH44-85

Premier rapport du comité d'homologation interdépartemental de Loire-Atlantique et Vendée

Voici le premier rapport des données homologuées en 2010 par le nouveau comité interdépartemental de Loire-Atlantique et Vendée. Ce comité, né de la fusion du CHD44 et du CHD85, a pris ses fonctions au 1^{er} janvier 2010 et rassemble donc des ornithologues de Vendée et de Loire-Atlantique, chargés d'examiner les fiches concernant ces deux départements.

Trois associations sont désormais partenaires et soutiennent le CH44-85: les LPO Loire-Atlantique et Vendée ainsi que le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique (GNLA).

Pour l'année 2010, ce comité, composé des membres suivants : Didier Desmots, Pierre-Paul Evrard, Bertrand Isaac, Willy Maillard, Julien Mérot, Frédéric Portier et Willy Raitière (respectivement secrétaire pour la Vendée et secrétaire pour la Loire-Atlantique), a examiné 154 fiches, parmi lesquelles 141 ont été validées et 13 ont été rejetées, donnant un taux d'acceptation de 91,5 %.

Nous rappelons que seules les données homologuées sont présentées dans les rapports du CH44-85 et du CMR et invitons les observateurs qui ne l'auraient pas encore fait à transmettre leurs fiches à l'adresse suivante : ch44_85@yahoo.fr, même si les données sont antérieures à 2010.

FAITS MARQUANTS :

L'année 2010 est un très bon cru car elle apporte les premières données départementales pour les espèces suivantes :

- le Puffin de Macaronésie pour la Vendée ;
- la Bergeronnette citrine pour la Loire-Atlantique ;
- le Robin à flancs roux pour la Vendée ;
- l'Hypolaïs rama pour la Vendée ;
- la Fauvette passerinette pour la Vendée ;
- le Pouillot ibérique pour les deux départements.

A noter également un afflux important de Bruants lapons avec pas moins de 16 oiseaux différents observés entre le 18 septembre et le 26 octobre 2010, principalement sur l'île d'Yeu (Vendée).

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.

2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre total de données homologués depuis la création du CH44-85 et celui des individus correspondants, à l'exception de l'année 2010. Les deux suivants représentent le nombre de données homologuées et le nombre d'individus correspondant pour 2010 par département.

3. Présentation des données par ordre chronologique d'observation (département, effectif, localité et date). Concernant le(s) nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique), la mention *et al* indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x) en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné au rapport du CH est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo).

4. Distribution générale de l'espèce (entre parenthèses) et statut dans les départements, puis commentaire.

La séquence taxonomique est celle de la liste du Comité de l'Avifaune Française (CAF, 2007).

Les données concernant les races sont mentionnées comme "présentant les caractéristiques" de la sous-espèce concernée.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : **Cygne de Bewick** - 1 individu le 26/02/2010, Saint-Joachim , Loire-Atlantique (J.L. Dourin *et al*, in PORTIER ET RAITIERE 2012).

* Espèce soumise au CH44-85 hors de certaines zones géographiques.

** Espèce soumise au CH44-85 pour une/des date(s) d'observation exceptionnelle(s).

CYGNE DE BEWICK *Cygnus colombianus*

(0/0) (44: 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 le 26/02 à la Bosse Verte / Saint-Joachim (Jean-Luc Dourin, Alain Troffigué).

(Se reproduit en Sibérie arctique à l'est de la péninsule de Kola ; hiverne dans les îles Britanniques, du nord de la France au nord-est de l'Allemagne, et ponctuellement plus au sud). Hivernant rare en Loire-Atlantique, très rare et très irrégulier en Vendée, la dernière donnée remontant à 2003. Concernant cette donnée 2010, le site, la date et l'effectif sont classiques pour cette espèce en Loire-Atlantique.

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis*

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce « rossicus », appelée : Oie de Toundra

(0/0) (44: 3/5 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 ad sur l'île de Pierre Rouge / Lavau-sur-Loire le 22/12 (Hugo Touzé) ; 1 ad sur le lac de Grand-Lieu le 25/12 (Sébastien Reeber) ; 2 ad et 1 juv sur la vasière de Corsept le 26/12 (Dominique Tavenon).

Vendée : 1 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré du 10/01 au 15/02 (Luc Chaillot, Jean Cloutour).

(Scandinavie, Sibérie). Migratrice et hivernante rare, surtout en Vendée. A rechercher l'hiver dans le sud de ce département.



Bernache cravant à ventre pâle *Branta bernicla hrota*, Batz-sur-mer, mars 2010 (F. Halligon).

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce "hrota", appelée Bernache à ventre pâle.

(0/0) (44 :1/1 ; 85 : 2/2)

Loire-Atlantique : 1 ad au pont du Yoro / Batz-sur-mer le 13/03 (François Halligon).

Vendée : 1 ad sur le polder Sébastopol / Barbâtre le 09/12 (Dominique Robard) et un oiseau de 1^{er} hiver au même endroit du 09/12 au 29/01/11 (Dominique Robard et Frédéric Portier).

(Canada arctique, Groenland, Spitzberg, Terre François-Joseph). Ce taxon est observé très régulièrement dans les deux départements. Certains secteurs accueillent le taxon chaque année comme les traicts de Mesquer et du Croisic en Loire-Atlantique et l'île de Noirmoutier, la baie de Bourgneuf et la baie de Jard-sur-mer en Vendée.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce "nigricans", appelée Bernache du Pacifique.

(0/0) (44 :3/3 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ad dans la baie de St-Goustan / Le Croisic le 01/02 (Olivier Marié) ; 1 mâle ad du 12/11 au 06/02/11 depuis la butte du Pô / Guérande (Hugo Touzé) et 1 mâle probable ad à Pen Bé / Assérac du 06/11 au 15/01/11 (Alain Gentric, Philippe Della Valle, Antoine Gergaud, Hugo Touzé).


(Amérique arctique, Sibérie orientale). Hivernant rare mais très régulier sur les deux départements. Pour la Loire-Atlantique, il s'agit sans doute des oiseaux revenant chaque année dans les traicts du Croisic et la baie de Pen Bé. Les données vendéennes ne sont pas encore parvenues au comité.

FULIGULE A BEC CERCLE *Aythya collaris*

(0/0) (44 :3/2 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 mâle adulte du 07 au 10/01 sur l'étang Aumée / Fégréac (Willy Raitière) ; 2 mâles adultes sur le Lac de Grand-Lieu du 10 au 17/01 (Sébastien Reeber).

(Amérique du nord. S'égaré régulièrement en Europe de l'Ouest, principalement dans les îles Britanniques). Hivernant rare et irrégulier sur les deux départements. Avec 3 oiseaux différents, 2010 est un bon cru pour l'espèce en Loire-Atlantique.



Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, mâle adulte, Fégréac, janvier 2010 (H. Touzé).

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

(0/0) (44 :4/4 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : le lac de Grand-Lieu est le seul site ayant accueilli l'espèce avec 1 femelle le 10/01 (Sébastien Reeber), 1 mâle adulte du 14/05 au 02/06 (Hugo Touzé, Sébastien Reeber), 1 mâle adulte le 15/10 (Sébastien Reeber) et 1 mâle adulte le 27/12 (Sébastien Reeber).

Vendée : 1 mâle adulte sur la station d'épuration de la Salaisière à Noirmoutier-en-l'Île du 11 au 17/01 (Dominique Robard, Emmanuel Gas).

(Niche des Balkans et de l'Europe centrale jusqu'à l'Asie centrale, occasionnellement plus à l'ouest). Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée ; sans doute plus régulier en Loire-Atlantique. Sites et dates classiques pour ces 5 données.

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* *

(0/0) (44 :11/19 ; 85 : 1/23)

Loire-Atlantique : en dehors du lac de Grand-Lieu, 2 mâles et 1 femelle étaient le 07/08 sur l'étang de la Blisière / Soudan (David Grandière, Paul-Emmanuel Chauveau) ; 1 mâle adulte aux Grands Perrets / Corsept le 03/12 (Willy Maillard) ; 1 femelle à l'étang de Gâtineaux / Saint-Michel-Chef-Chef le 03/12 (Willy Maillard) ; 1 femelle sur l'étang de Beaumont / Issé le 08/11 (Willy Raitière) ; 1 femelle du 04 au 10/12 puis 2 femelles du 15 au 25/12 puis 2 femelles et 1 mâle de 1^{re} année du 29/12 au 12/01/11 au puis 2 femelles du 17 au 28/01/11 puis 1 femelle et 1 mâle de 2^{me} année le 11/02/11 sur l'étang de Beaumont / Issé (Willy Raitière *et al.*) ; 2 femelles sur le réservoir de Vioreau / Joué-sur-Erdre le 03 et 04/12 (Julien Mérot *et al.*) ; 1 femelle le 12/12 observée depuis l'île de Mazerolles / Sucé-sur-Erdre (Olivier Poisson).

Vendée : l'étang des Boucheries / Les Landes-Génusson rassemble la totalité des données avec un maximum de 17 adultes et 6 poussins le 28/08. L'espèce est présente sur le site de manière quasi-continue entre le 18 juin et le 14 novembre (Luc Chaillot, Gérald et Antoine Reboul).

(Amérique du nord, introduite en Grande-Bretagne depuis 1960). Espèce surtout notée en automne et en hiver sur les deux départements sur les plans d'eau et lagunes de l'intérieur des terres. Plus rare sur le littoral.

La fin de l'année 2010 concentre un nombre inhabituel d'Erismatures rousses dans les deux départements.

*Note du comité : la qualité des fiches reçues concernant cette espèce étant régulièrement insuffisante pour exclure l'Erismature à tête blanche *Oxyura leucocephala*, le CH44-85 diffusera prochainement un document d'aide à l'identification, à destination des observateurs.*

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

(0/0) (44 :3/3 ; 85 : 4/6)

Loire-Atlantique : 1 oiseau le 14/03 au lac de Grand-Lieu (Sébastien Reeber) ; 1 le 04/04 dans la rade du Croisic / la Turballe (Willy Raitière) et 1 le 19/04 sur le lac de Grand-Lieu (Sébastien Reeber).

Vendée : 1 adulte le 04/02 plage de la Petite Conche / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier) ; 3 oiseaux du 22 au 25/02 plages des Iliaux et des Ovaires / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeyer) ; 1 le 26/02 à la pointe de l'Aiguillon / l'Aiguillon-sur-mer (Jacques Pellerin) ; 1 passe en vol devant le Phare de l'Armandèche / les Sables-d'Olonnes le 30/10 (Frédéric Le Gallo).

(Dans le Paléarctique occidental, la population reproductrice s'étend de la Russie à l'Allemagne à l'ouest et à la Turquie au sud. Hivernent principalement le long des côtes du nord de l'Europe, de la mer Noire et de l'Adriatique). Migrateur et hivernant rare et irrégulier sur les deux départements. Avec 6 oiseaux, l'année 2010 est un bon cru pour l'espèce en Vendée.

PUFFIN MAJEUR *Puffinus gravis*

(0/0) (44 :0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 individu observé lors d'une sortie sur le bateau de pêche Le Filo au large des Sables-d'Olonnes le 21/08 (Thomas Perrier).

(Niche dans quelques îles de l'Atlantique Sud : Inaccessible, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough). Migrateur très rare et très irrégulier, observé le plus souvent au large de nos côtes.



Puffin majeur *Puffinus gravis*, Les Sables-d'Olonne, août 2010 (T. Perrier).

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus*:

(0/0) (44 :11/15 ; 85 : 2/5)

Loire-Atlantique : 2 adultes le 01/01 à Lyarne / les Moutiers-en-Retz (Franck Latraube) ; 1 oiseau navigue entre les marais de Pompas / Herbignac et le dortoir du Rosay / Mesquer entre le 11/01 et le 16/03 (Olivier et Louise Briand, Christian Kerihuel *et al.*) ; 1 adulte fréquentant le dortoir de Lyarne et le port du Collet / les Moutiers-en-Retz du 07/02 au 05/03 (Raphaël Chaussis) ; 1 le 29/04 au Fondreau / Bourgneuf-en-Retz (Michel Hubaut) ; en Brière, 1 oiseau était le 06/04 au Millaud / St-Joachim (Didier Montfort) ; du côté de Grand-Lieu, 1 adulte était le 03/05 à Passay / la Chevrolière, 1 oiseau de 2^{me} année était présent en divers endroits du lac entre le 15/05 et le 14/08, rejoint par 1 autre oiseau de 2^{me} année entre le 09/07 et le 14/08 puis par 1 adulte entre le 05 et le 14/08 (Sébastien Reeber, André Doucet, Hugo Touzé, Yves Duault) ; 4 adultes étaient le 17/08 à proximité du carrefour entre les routes du Grand Marais et du Petit-Fresnes / Bourgneuf-en-Retz (Jean-Yves Frémont), oiseaux déjà observés quelques jours auparavant dans le même secteur mais du côté vendéen (cf. ci-dessous) ; 1 le 17/09 au port du Collet / les Moutiers-en-Retz (Willy Raitière).

Vendée : 4 oiseaux le 15 et 16/08 puis 1 le 29/08 à la Nue / Bouin (Guy Perruchas, Frédéric Portier).

(Se reproduit, en Europe, essentiellement dans l'est et le sud du continent. La plupart des oiseaux européens hivernent en Afrique tropicale ou à l'est de la Méditerranée. En France, l'espèce niche depuis 2006 en Camargue). L'espèce devient de plus en plus régulière en Loire-Atlantique notamment où l'espèce s'est reproduite sur le lac de Grand-Lieu en 2011 (Reeber, 2011). Demeure rare et irrégulière en Vendée.

Note du comité : La qualité des fiches reçues concernant cette espèce étant régulièrement insuffisante pour exclure les autres espèces d'ibis de type « falcinelle » (Ibis de la Puna Plegadis ridgwayi et Ibis à face blanche Plegadis chihi) pouvant être échappés de captivité, le CH44-85 diffusera très prochainement un document d'aide à l'identification, à destination des observateurs.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus*

(0/0) (44 :1/1 ; 85 : 1/4)

Loire-Atlantique : 1 oiseau le 12/06 aux Cassières / St Herblon, à proximité du marais de Grée (Hugo Touzé).

Vendée : 4 oiseaux le 12/06 à la Brétinière / la Roche-sur-Yon (Tim Autin).

(Europe, Afrique du nord, Moyen-Orient, ouest de l'Asie). Migrateur très rare, mais de plus en plus régulier ces dernières années en juin sur nos départements. A rechercher donc en fin de printemps-début d'été particulièrement.

AIGLE BOTTE *Aquila pennata*

(0/0) (44 :2/2 ; 85 : 2/3)

Loire-Atlantique : 1 oiseau de forme claire le 02/05 au port de St Lumine-de-Coutais (Brice Normand *et al.*) ; 1 oiseau de forme claire le 14/05 à la Chaussée Neuve / Saint-André-des-Eaux (Alexandre, Françoise et Guillaume Corbeau).

Vendée : 1 individu du 23/05 au 08/08 puis 1 couple (1 individu clair et l'autre sombre) du 21/08 au 05/09 dans le bocage vendéen (localité tenue secrète ; Michel Bibard).

(Europe, Afrique du nord, Asie centrale). Migrateur rare sur les deux départements. La nidification n'a toujours pas été prouvée en Vendée. Avec deux oiseaux notés au cours du printemps en Loire-Atlantique, c'est une bonne année pour l'espèce et pour ce département.

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus*

(0/0) (44 :0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 femelle de 2^e année le 21/05 à la Chèvrerie / L'Ile-d'Yeu (Frédéric Portier).

(Se reproduit essentiellement de la Hongrie jusqu'au fleuve Léna en Russie. Hiverné en Afrique australe). A niché avec succès en Vendée en 1993. Migrateur occasionnel aux deux passages sur les deux départements. Il s'agit de la troisième mention de l'espèce pour l'île d'Yeu.

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus*

(0/0) (44 :1/1 ; 85 : 2/2)

Loire-Atlantique : 1 oiseau de 2^e année le 23/05 dans le Traict de Rostu / Mesquer (Alain Gentric).

Vendée : 1 adulte probable sur le polder de St Cérans / Bouin du 08 au 11/03 (André Doucet, Olivier Penard et al.) ; 1 mâle de 2^e année du 23 au 25/04 plage de la Grande Côte / la Barre-de-Monts (Frédéric Portier, Paul-Emmanuel Chauveau *et al.*).

(Niche en Ecosse et de la Scandinavie jusqu'au sud-est de la Russie, à la Mongolie et à la Sibérie orientale. Hiverné des contreforts de l'Atlas marocain jusqu'à l'Iran en passant par tout le Maghreb, et sporadiquement dans le sud de l'Europe). Migrateur rare et irrégulier sur les deux départements aux deux passages.



Pluvier guignard *Charadrius morinellus*, Bouin, mars 2010 (O. Penard).

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos*

(0/0) (44 :7/7 ; 85 : 2/2)

Loire-Atlantique : toutes les données se rapportent au lac de Grand-Lieu avec 1 oiseau de 1^{re} année du 07 au 09/09, 1 oiseau de 1^{re} année le 09/09, 1 oiseau de 1^{re} année du 12 au 17/09, 1 oiseau de 1^{re} année du 14 au 17/09, 1 oiseau de 1^{re} année du 15 au 16/09, 1 oiseau de 1^{re} année du 02 au 08/10 et 1 oiseau de 1^{re} année le 03/10 (Sébastien Reeber).

Vendée : 1 oiseau de 1^{re} année du 08 au 09/09 sur le lac de Maché-Apremont / Maché (Frédéric Portier) ; 1 oiseau de 1^{re} année du 18 au 19/09 sur le marais de la Guerche / Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeier, Renaud Baeta *et al.*).

(Niche dans l'Arctique nord-américain, de l'ouest de la baie d'Hudson à l'Alaska et en Sibérie, à l'ouest jusqu'à la péninsule de Yamal. Hivernent en Amérique du sud, dans le sud-est de l'Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande) Rares et irrégulier aux deux passages, particulièrement au printemps ; plus régulier à l'automne. Avec 7 oiseaux pour la Loire-Atlantique et 2 pour la Vendée, 2010 est une année plutôt productive pour l'espèce. Le Lac de Grand-Lieu et celui de Maché-Apremont sont des sites classiques pour voir ce bécasseau néarctique entre août et septembre. En revanche, pour l'île d'Yeu, il s'agit de la première mention pour cette espèce.

GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 adulte le 03/02 au lac de Grand-Lieu (Sébastien Reeber).

Vendée : 1 oiseau de 2^e année le 13/05 dans l'Anse du Gois / Barbâtre (Didier Desmots et André Barzic).

(Niche dans le centre, le sud-ouest et l'est de l'Amérique du Nord. Hivernant et migrateur néarctique rare fréquentant surtout les zones côtières. Très occasionnel dans les terres). Hivernant et migrateur rare et irrégulier sur les deux départements. Certains secteurs vendéens comme l'île de Noirmoutier accueillent tout de même l'espèce annuellement.

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans*

(0/0) (44 1/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 oiseau de 2^e année le 14/02 au marais de Grée / St Herblon (Hugo Touzé).

Vendée : 1 oiseau de 1^{re} année le 17/12 sur la plage des Présidents / les Sables-d'Olonnes (Jean-Claude Croisé).

(Niche de la mer Noire jusqu'au Kazakhstan. S'est installé récemment près de Moscou ainsi qu'en Pologne et en Allemagne. Hivernent dans le golfe Persique, en mer Rouge et en effectif moindre dans le centre, le nord et l'ouest de l'Europe). Très rare sur les deux départements. A rechercher en hiver dans les bandes de laridés sur le littoral ou sur les décharges des deux départements.

Note du comité : les connaissances croissantes concernant l'identification de cette espèce laissent espérer de plus nombreuses observations dans le futur. Attention cependant, certains plumages sont assez difficiles à identifier et la présence d'oiseaux hybrides n'est pas à sous-estimer, même si les oiseaux sont bagués.

GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*

(0/0) (44 :1/1 ; 85 : 2/2)

Loire-Atlantique : 1 oiseau de 2^e année le 26/02 sur l'étang de la Provostière / Riaillé (Paul Lenrume, Pierre Leroy).

Vendée : 1 oiseau de 1^{re} année le 12/11 à la Pointe de l'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'île (Dominique Robard) ; 1 oiseau de 1^{re} année le 01/12 sur le lac du Tanchet / Les Sables-d'Olonnes (André Barzic).

(Niche au Groenland et en Islande puis de l'île Jan Mayern et du Spitzberg jusqu'en Sibérie. Hivernent surtout dans le nord de l'Atlantique jusqu'en Grande-Bretagne ; effectifs réduits plus au sud, présence occasionnelle en Suisse, en mer Caspienne et en Méditerranée). Hivernant rare et irrégulier en Loire-Atlantique, assez régulier en Vendée.

La localisation est plutôt originale pour l'oiseau de Loire-Atlantique.



Goéland bourgmestre *Larus glaucoides*, Noirmoutier-en-l'île, novembre 2010 (D. Robard).

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica*

(0/0) (44 :0/0 ; 85 : 1/2)

Vendée: 2 oiseaux de 2^e année le 01/07 sur la Réserve Naturelle Nationale / St Denis-du-Payré (Théophile You).

(Du sud de l'Europe au Kazakhstan, au sous-continent indien et au nord-est de la Chine; également en petit nombre en Allemagne et au Danemark). Migratrice rare et irrégulière sur les deux départements. La date précoce plaide pour de jeunes oiseaux non nicheurs en erratisme.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii*

(0/0) (44 :2/4 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 3 adultes le 31/08 à la pointe du Croisic / Le Croisic (Anthony Guérard) ; 1 adulte le 04/09 à la pointe de St-Gildas / Préfailles (Aymeric Mousseau).

(Des côtes est de l'Amérique du nord et des Antilles au nord du Venezuela, aux Açores et dans le nord-ouest de l'Europe). Migrateur occasionnel sur les deux départements. Le secteur Baie de Bourgneuf / Ile de Noirmoutier confirme son attractivité pour l'espèce. L'espèce est à rechercher sur le littoral, dans les regroupements de sternes surtout à la fin de l'été.

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus*

(0/0) (44 :10/22 ; 85 : 2/2)

Loire-Atlantique : sur Grand-Lieu tout d'abord avec 4 adultes du 26 au 27/04, 1 adulte du 28/04 au 02/05, 2 adultes le 03/05, 3 adultes du 04 au 05/05, 4 adultes du 08 au 15/05, 2 adultes du 16 au 19/05, 2 adultes le 22/06, 1 oiseau de 1^{re} année le 07/09 (Sébastien Reeber) ; 1 adulte aux Raimons / Guérande le 07/05 (Gabriel Couroussé) ; 1 couple adulte à la Chaussée Neuve / St André-des-Eaux le 13/06 (Gabriel Couroussé *et al.*).

Vendée : 1 adulte du 22 au 24/04 à la station d'épuration de la Tranche-sur-Mer (Mickaël Faucher) et 1 oiseau de 1^{re} année le 05/09 au même endroit (Frédéric Portier).

(Niche de l'Europe de l'Est à la Sibérie orientale (région de l'Amour). Hivernent principalement en Afrique tropicale). En Loire-Atlantique, l'espèce tente de se reproduire chaque année depuis l'installation d'un couple en Brière en 2009 (Dourin, Montfort, Reeber, & Troffigué, 2008). En revanche l'espèce reste rare et irrégulière en Vendée aux deux passages.

MERGULE NAIN *Alle alle*

(0/0) (44 :0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 devant le Phare de l'Armandèche / les Sables-d'Olonnes le 12/11 (Luc Chaillot *et al.*) ; 1 trouvé mort sur la plage du Veillon / Talmont-St-Hilaire le 21/11 (Luc Chaillot).

(Niche depuis le haut Arctique canadien et le nord du Groenland jusqu'au Spitzberg et à la Nouvelle-Zemble). Occasionnel en hiver sur les deux départements.

COUCOU-GEAI *Clamator glandarius*

(0/0) (44 :1/1; 85 : 4/4)

Loire-Atlantique : 1 adulte du 20 au 24/04 à Penmont / St-Molf (Olivier Marié).

Vendée : 1 oiseau de 2^e année le 16/04 à l'île Chauvet / Bois-de-Céné (Alain Gérard) ; 1 oiseau de 2^e année dans les marais salants de l'Île-d'Olonne le 24/04 (Mickaël Dia) ; 1 adulte dans le marais du Jaunay / Givrand du 24 au 25/04 (Gérard Besseau) ; 1 oiseau de 2^e année le 14/05 entre l'Aubraie et Montportreau / Les Sables-d'Olonne (Michel Bibard).

(Europe méridionale, Moyen-Orient, Afrique du nord). Migrateur rare mais de plus en plus régulier au printemps. A niché en Vendée déjà à deux reprises.

MARTINET A VENTRE BLANC *Apus melba*

(0/0) (44 :1/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 le 16/07 sur le lac de Grand-Lieu (Sébastien Reeber).

Vendée : 1 le 24/10 à la Pointe de la Gournaise / L'Île-d'Yeu (Hugo Touzé).

(Sud de l'Europe, Asie mineure et Afrique du nord). Migrateur rare sur les deux départements. L'année 2010 apporte les premières mentions pour le lac de Grand-Lieu et pour l'île d'Yeu.



Martinet à ventre blanc *Apus melba*, Ile d'Yeu, octobre 2010 (H. Touzé).

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi*

(0/0) (44 :0/0 ; 85 : 1/6)

Vendée : 2 adultes et 4 immatures dans le marais du Jaunay / Givrand du 17/10 au 01/03/11 (Gérard Besseau *et al.*).

(La sous-espèce type niche de la Sibérie occidentale à la Mongolie et hiverne principalement au Pakistan, en Inde, Chine et Asie du Sud-Est, mais aussi assez régulièrement très à l'ouest de ces quartiers habituels (Espagne, Afrique du Nord...)). Migrateur et hivernant rare et irrégulier sur les deux départements. Le premier cas d'hivernage complet de 6 oiseaux sur un secteur de marais rétro-littoral de type prairial en Vendée laisse présager le nombre d'oiseaux passant inaperçus !

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris* *

(0/0) (44 : 2/3 ; 85 : espèce non soumise à homologation)

Loire-Atlantique : 2 adultes à la Grande Falaise / La Turballe le 06/05 puis 1 mâle seul du 07/05 au 29/08 (Aymeric Mousseau *et al.*).

(De l'Europe de l'ouest à l'Iran, la Sibérie et le nord-ouest du Kazakhstan). Encore des données recueillies sur la dune de Pen Bron à la Turballe, site ayant vu la reproduction de l'espèce en 2009 (Mérot & Raitière, 2010).

A compter du 1^{er} janvier 2012, l'espèce ne sera plus soumise à homologation en Loire-Atlantique.

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*

(0/0) (44 :0/0 ; 85 : 3/3)

Vendée : 1 adulte le 20/04 aux Pierres jumelles du Château / L'Ile-d'Yeu (Frédéric Portier *et al.*) ; 1 adulte le 22/04 à la Pierre des Amporelles / L'Ile-d'Yeu (Xavier et Marie-Paule Hindermeier, Frédéric Portier) ; 1 au Vieux Château / L'Ile-d'Yeu le 09/10 (Georges Olioso).

(Se reproduit dans la Toundra arctique ; les populations occidentales migrent surtout par la Méditerranée centrale et hivernent en Afrique dans la zone sahélienne ; quelques individus atteignent les îles Canaries). Très occasionnel sur les deux départements. Année exceptionnelle pour la Vendée avec 3 données et toutes sur l'île d'Yeu !



Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*, Île d'Yeu, avril 2010 (F. Portier).

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce "cinereocapilla", appelée Bergeronnette d'Italie

(0/0) (44 :1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 mâle adulte à Lanhio / Guérande le 12/06 (Anthony Oates).

(Italie, nord-ouest de la Yougoslavie). Migrateur rare et irrégulier sur les deux départements.

JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus*

(0/0) (44 :0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 sur le parking de la gendarmerie / St Jean-de-Monts du 27 au 29/12 (Charlie Robin).

(La sous-espèce type niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Lors de migrations partielles ou d'invasions, l'espèce atteint le sud de la Scandinavie, le Benelux ou l'ensemble de l'Europe centrale). Hivernant très rare dans les deux départements. Les observations de Jaseur boréal dépendent de phénomènes invasifs réguliers chez cette espèce cependant, l'ouest de la France est rarement concerné par ce type d'évènement.

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*

(0/0) (44 :2/2 ; 85 : 1/1)

Rappel : espèce soumise à homologation uniquement en dehors des opérations de baguage.

Loire-Atlantique : 1 individu a été observée le 12/09 à Rostu / Mesquer (Alain Gentric) et 1 oiseau de 1^{re} année dans la roselière de Donges est le 28/08 (Julien Mérot *et al.*).

Vendée : 1 individu a été observée le 26/08 à la Belle-Henriette / la Faute-sur-Mer (Thomas Perrier).

(Niche dans les états Baltes, en Biélorussie et en Russie, ainsi qu'en Pologne, en Hongrie et en Allemagne. Hivernent en Afrique de l'Ouest, au moins dans le delta du Sénégal). Seules les données d'oiseaux non capturés sont traitées dans ce rapport. Les opérations de baguage menées dans les deux départements montrent que l'espèce est de passage très fréquent durant le mois d'août dans les principales zones humides littorales. En 2010, 285 individus ont été bagués en Loire-Atlantique sur les différents camps de baguage du département ((Le Nevé *et al.*). Ainsi les observations visuelles de cette espèce discrète ne reflètent pas du tout la réalité du passage de cette espèce.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris*

(0/0) (44 :1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 oiseau de 1^{re} année capturée le 24/08 dans la roselière de Donges est puis contrôlée au même endroit le lendemain (Julien Foucher *et al.*).

(Nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et l'est de l'Oural). Très rare sur les deux départements.

Cette observation constitue la troisième mention de l'espèce en Loire-Atlantique. Les deux précédentes données concernaient l'observation d'un mâle chanteur le 30/05/04 au lac de Murin / Massérac et la capture d'un oiseau de première année le 07/08/04 au Massereau / Frossay.



Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*, 1^{re} année, Donges, août 2010 (ACROLA).

FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantillans*

(0/0) (44 :1/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 mâle le 28/04 à l'Angle Essort / St Julien-de-Concelles (Vincent Tanqueray).

Vendée : 1 mâle du 18 au 22/04 au polder Sébastopol / Barbâtre (Dominique Robard, Luc Chataigner).

(Europe méditerranéenne). La donnée vendéenne constitue la première observation de l'espèce pour le département tandis que la donnée de Loire-Atlantique est seulement la deuxième depuis la capture d'un mâle le 30/03/1965 sur l'île Dumet (Recorbet (1992).

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

(0/0) (44 :0/0 ; 85 :2/2)

Vendée : 1 le 13/10 dans la dune de la Grande Conche / Yeu (Georges Olios) et 1 le 24/10 dans la vallée de l'Ecours / Brem-sur-Mer (Gérard Besseau, Philippe Rouillier).

(Nord et est de l'Europe, Russie et Moyen-Orient). Migrateur rare sur les deux départements. L'espèce est peut-être plus régulière en Vendée qu'en Loire-Atlantique surtout à l'automne.

POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus*

(0/0) (44 :0/0 ; 85 : 4/4)

Vendée : 1 le 24/08 dans le Bois des sapins / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeyer) ; 1 le 02/10 à St Nicolas-de-Brem / Brem-sur-Mer (Frédéric Portier) ; 1 le 09/10 aux Loges / L'Ile-d'Yeu Yeu (Georges Olioso) et 1 le 10/10 à la Bergerie / L'Ile-d'Yeu (Frédéric Portier).

(Niche dans le nord de la Russie, de la Petchora et de l'Oural à l'ouest, jusqu'à l'Anadyr et la mer d'Orkhotsk à l'est et au sud jusqu'à la Mongolie et au nord-est de la Chine. Hiverné dans le sud-est de l'Asie). Espèce emblématique rare mais régulière chaque automne en Vendée, plus exceptionnel curieusement en Loire-Atlantique (manque de prospection ?). Le littoral rassemble la majorité des observations. La donnée du 24/08 sur l'île d'Yeu est exceptionnellement précoce pour cette espèce qui est principalement observée à partir de début d'octobre. Curieusement aucune donnée en provenance du site des Agaures / Les Sables d'Olonne, qui a déjà accueilli l'espèce à des dizaines de reprises.

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*

(0/0) (44 :0/0 ; 85 : 4/5)

Vendée : 1 mâle le 28/04 à la Grissonnière / Vouvant (Mickaël Faucher) ; 1 mâle probable le 29/04 en forêt de Graslas / La Copechagnière (Frédéric Le Gallo) ; 2 mâles le 24/05 dans le bois des Gâts / Saligny (Luc Chaillot) ; 1 le 28/08 au camping / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeyer).

(Nord-ouest de l'Afrique, nord et centre de l'Europe). Migrateur devenu rare au printemps. Les données concernent principalement des oiseaux observés au printemps, cependant, les preuves de reproduction sont devenues très rares pour cette espèce qui nichait encore il n'y a pas si longtemps dans les deux départements.

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*

Individus présentant les caractéristiques du groupe "abietinus / 'fluvescens' / tristis ", appelé Pouillot véloce de type sibérien

(0/0) (44 :0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 le 1^{er} janvier aux Loges / Saint-Hilaire-des-Loges (Gérard Besseau).

(Scandinavie, Sibérie). Migrateur et hivernant rare bien que régulier dans les deux départements.

A compter du 1^{er} janvier 2012, les oiseaux de ce type ne sont plus pris en compte par le comité. En effet, le plus souvent, les connaissances liées à ces taxons ne permettent pas de trancher en faveur de l'un ou l'autre.

POUILLOT IBERIQUE *Phylloscopus ibericus*

(0/0) (44 :1/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 mâle du 26/04 au 01/05 à la Rotte aux loups / St Mars-la-Jaille (Loïc Bellion *et al.*).

Vendée : 1 mâle du 13 au 17/04 à la Chapelle de Bourdevert / St Gervais (Alain Gérard, Frédéric Portier).

(Péninsule ibérique, Afrique du nord et sud-ouest de la France). Ces données fournissent les premières observations de cette espèce pour les deux départements.

GOBEMOUCHE A COLLIER *Ficedula albicollis*

(0/0) (44 :0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée: 1 femelle au camping / L'Ile-d'Yeu le 10/10 (Frédéric Portier).

(De l'est de la France à l'Oural d'ouest en est). Migrateur très rare, surtout à l'automne sur les deux départements. A rechercher en septembre sur le littoral lors des stationnements importants de Gobemouches noirs *Ficedula hypoleuca*. Il s'agit de la première donnée de l'espèce pour l'île d'Yeu.

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*

(0/0) (44 :1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 le 15/10 en forêt du Gâvre (Jean-Paul et Annick Mérot).

(Europe de l'ouest à l'ouest de la Sibérie). Migrateur rare sur les deux départements. Hivernant occasionnel en Vendée. Site classique pour cette espèce en Loire-Atlantique.

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator*

(0/0) (44 :2/3 ; 85 : 5/5)

Loire-Atlantique : 1 couple de la sous-espèce nominale au Marais / Ancenis du 18/06 au 16/07 (Yann Brilland *et al.*) ; 1 mâle sur les Prés Couronnés / Bouée le 18/06 (Jean-Luc Chil *et al.*).

Vendée : 1 femelle adulte de la sous-espèce nominale le 21/04 à la carrière / L'Ile-d'Yeu (Frédéric Portier) ; 1 oiseau de 1^{re} année le 05/09 à la Croix / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeyer) ; 1 oiseau de 1^{re} année le 11/09 à la Croix / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeyer) ; 1 oiseau de 1^{re} année du 11 au 12/09 à Perdrette / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeyer) et 1 oiseau de 1^{re} année le 18/09 à Perdrette / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeyer).

(Europe de l'ouest et îles de la Méditerranée). Migrateur rare aux deux passages. Nichait au siècle dernier dans les deux départements. Le couple du marais de Grée / Ancenis a sans doute tenté de se reproduire mais malheureusement sans succès puisqu'aucun jeune n'a été observé. L'Ile d'Yeu demeure le site vendéen le plus attractif pour contacter cette espèce.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

(0/0) (44 :1/1 ; 85 : 15/15)

Loire-Atlantique : 1 en migration active le 26/10 à Lyarne / Les Moutiers-en-Retz (Sébastien Reeber).

Vendée : arrivée groupée le 18/09 avec 1 oiseau en vol migratoire observé depuis la dune de la Tresson / La Guérinière (Frédéric Portier), 1 oiseau posé puis en vol sur la dune de la Fosse / Barbâtre (Frédéric Portier), 1 oiseau en vol à la Pierre à Monsieur / L'Ile-d'Yeu (Marie-Paule et Xavier Hindermeier) et 2 oiseaux posés à la Pierre des Amporelles / L'Ile-d'Yeu (Renaud Baeta et al.) ; 1 adulte le 02/10 à la Pointe de l'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'île (Dominique Robard) ; 1 le 09/10 à Roche Biron / Brétignolles-sur-mer (Gérard Besseau) ; 1 le 07/10 aux Tchinettes / L'Ile-d'Yeu (Georges Olios) ; 1 le 13/10 à la Pointe des Corbeaux / L'Ile-d'Yeu (Georges Olios) ; 1 le 17/10 aux Terres Gâchées / Lairoux (fide Yves Gaugris) ; 2 posés le 20/10 aux Trupailles / L'Ile-d'Yeu (Frédéric Portier) ; 1 en migration active le 20/10 à l'aérodrome / L'Ile-d'Yeu (Frédéric Portier) ; 1 posé le 21/10 à la Pierre à Monsieur / L'Ile-d'Yeu (Frédéric Portier) et 1 au même endroit le 22/10 (Frédéric Portier).

(La sous-espèce nominale niche de la Scandinavie à la Sibérie, jusqu'à la Kolyma, et hiverne en Europe de l'Ouest et en Asie centrale. La sous-espèce *subcalcaratus*, qui niche au Groenland et au Canada, est d'apparition possible en France). Migrateur automnal rare et irrégulier sur le littoral et les îles. L'automne 2010 a connu un afflux exceptionnel sur le département de la Vendée, principalement sur les îles.

BRUANT FOU *Emberiza cia*

(0/0) (44 :1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 mâle adulte aux Bruyères / Trans-sur-Erdre le 23/05 (Sébastien Angebaud).

(Maghreb, sud et centre de l'Europe). Migrateur et hivernant occasionnel sur les deux départements, plus particulièrement en Vendée. Localisation et date très originales pour une espèce plutôt observée en hiver sur les coteaux abrupts des bords de la Loire.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*

(0/0) (44 :1/1 ; 85 : 6/6)

Loire-Atlantique : 1 femelle le 14/04 à Loncé / St Malo-de-Guersac (Benjamin Callard).

Vendée : 1 mâle adulte à la Planche à Puare / L'Ile-d'Yeu le 29/04 (Frédéric Portier) ; 1 mâle adulte sur la dune de la Grande Conche / L'Ile-d'Yeu le 29/04 (Frédéric Portier) ; 1 probable femelle le 24/06 à la Burguinière / Les Sables-d'Olonnes (Valentin Motteau) ; 1 le 05/09 à la Croix / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeier) ; 1 le 11/09 sur la dune de la Grande Conche / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeier) ; 1 le 18/09 dans le marais de la Guerche / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeier).

(Europe de l'ouest à la Turquie). Migrateur peu commun sur les deux départements. L'Ile d'Yeu reste le site le plus favorable pour voir cette espèce en déclin.

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*

Loire-Atlantique : 2 le 05 décembre à la Guillonnière / Sucé-sur-Erdre ; 1 le 21 novembre sur la station d'épuration des Moutiers-en-Retz (descriptions ne permettant pas d'exclure l'Érismature à tête blanche).

Vendée : 1 femelle probable le 11 février à Bouin (description ne permettant pas d'exclure l'Érismature à tête blanche, voire une macreuse ; de plus, le site n'est pas du tout habituel pour l'espèce).

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

Loire-Atlantique : 5 le 16 novembre à Kercabellec / Mesquer (description trop succincte, notamment pour cet effectif inhabituel).

Vendée : 1 le 16/10 sur la lagune de la Belle Henriette / La Tranche-sur-mer (manque les critères diagnostiques pour cette espèce, certains éléments notés plaident pour une erreur d'identification).

Aigle botté *Aquila pennata*

Loire-Atlantique : 1 le 6 mai à la Croix Rouaud / Trans-sur-Erdre (description trop succincte, certains éléments ne correspondent pas à l'espèce proposée).

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*

Vendée : 1 le 19 septembre sur la station d'épuration de l'Ile-d'Olonne (description trop succincte, les critères diagnostiques ne sont pas évoqués).

Goéland pontique *Larus cachinnans*

Loire-Atlantique : 1 2^{me} année le 2 septembre au pont d'Ancenis (les photos jointes à la fiche montrent un Goéland leucophée).

Vendée : 1 le 06 septembre à la Paracou / Les Sables-d'Olonne (oiseau non décrit, identifié sur la base de la bague qu'il portait, impossible d'exclure un hybride dans ce cas).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*

Loire-Atlantique : 1 chanteur le 28 juin à Saint-Méen / Le Cellier (oiseau chanteur non observé et chant décrit trop succinctement).

Pouillot véloce de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis*

Vendée : 1 le 30 novembre dans le bourg de la Verrie (description incomplète, pas de description des vocalises de l'oiseau).

Gobemouche à collier *Ficedula albicollis*

Vendée : 1 le 8 septembre à la Flocellière (description trop sommaire et éléments photographiques fournis prêtent à confusion).

LISTE DES DONNEES HOMOLOGUEES PAR LE COMITE D'HOMOLOGATION NATIONAL EN 2010

Les données ci-dessous sont issues du rapport 2010 du comité d'homologation national (Reeber & CHN, 2011) et concernent les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée.

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, ad., du 7 au 9 février (S. Reeber *et al.*), ad., 27 décembre (S. Reeber).

Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, ad., du 12 mars au 1^{er} avril (P. Trotignon, J.-C. Croisé *et al.*).

BERNACHE A COU ROUX *Branta ruficollis*

Vendée : Bouin : lagune du Dain, 1^{er} hiver, du 7 au 21 février (F. Portier, J.-Y. Frémont *et al.*)

SARCELLE A AILES VERTES *Anas carolinensis*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, mâle, 12 décembre (S. Reeber).

ERISMATURE A TETE BLANCHE *Oxyura leucocephala*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, fem 1^{er} hiver, du 11 janvier au 26 mars (S. Reeber), fem., du 14 novembre au 4 mars 2011 (S. Reeber *et al.*), mâle 1^{er} hiver, du 18 novembre au 4 mars 2011 (S. Reeber *et al.*).

PUFFIN DE MACARONESIE *Puffinus baroli*

Vendée : Les Sables-d'Olonne, 17 août (F. Le Gallo) ; Ile d'Yeu : pointe des Corbeaux, 24 août (X. Hindermeier).

PELICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus*

Loire-Atlantique : Paimboeuf : estuaire de la Loire, ad., du 1^{er} janvier au 31 décembre (*vide* S. Reeber).

PLUVIER BRONZE *Pluvialis dominica*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, ad., du 3 au 6 puis 16 septembre (S. Reeber *et al.*)

Vendée : Ile d'Yeu : carrière, juv., 9 octobre (G. Olios).

PLUVIER FAUVE *Pluvialis fulva*

Vendée : Triaize / Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, ad., du 27 juin au 17 juillet (P. Trotignon, J.-C. Croisé, M. Bibard *et al.*) ; L'Ile-d'Olonne : marais d'Olonne, ad., du 24 au 26 septembre (P. Trotignon *et al.*).

BECASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, juv., du 13 au 17 septembre (S. Reeber *et al.*).

Vendée : L'Épine : Ile de Noirmoutier, juv., 25 septembre (D. Robard).

PHALAROPE DE WILSON *Phalaropus tricolor*

Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, 20 juin (M. Laplace).

MOUETTE DE BONAPARTE *Chroicocephalus philadelphia*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, ad., 19 avril (S. Reeber).

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucooides*

Vendée : Saint-Vincent-sur-Jard, 1^{er} hiver, 16 décembre (J.-C. Croisé).

STERNE ELEGANTE *Sterna elegans*

Individus présentant les caractéristiques de la Sterne élégante

Vendée : Barbâtre : Ile de Noirmoutier, polder de Sébastopol, ad., 30 avril au 13 juillet. (photos sur www.ornitho.fr)

GUILLEMOT A MIROIR *Cephus grylle*

Vendée : Ile d'Yeu : plage des Bossilles et pointe des Corbeaux, ad. probable, 25 octobre (M.-P. Hindermeyer, F. Portier).

BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, 1^{er} hiver, 7 et 8 septembre (S. Reeber).

Vendée : Ile d'Yeu : Port-Joinville, dune de la Grande Conche, 1^{er} hiver, 28 août (X. et M.-P. Hindermeyer).

ROBIN A FLANCS ROUX *Tarsiger cyanurus*

Vendée : Ile d'Yeu : marais de la Guerche, fem./1^{er} hiver, 21 octobre (F. Portier).

HYPOLAÏS RAMA *Hippolais rama*

Vendée : Ile d'Yeu : dune de la Grande Conche, 4 septembre (X. Hindermeyer).

ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus*

Vendée : Ile d'Yeu : plage de la Tourette, 2 juv./1^{er} hiver, 23 septembre (F. Portier).

BIBLIOGRAPHIE

- CAF. 2007. Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos*, 14(4): 234-246.
- Dourin, J.-L., Montfort, D., Reeber, S., & Troffigué, A. 2008. Premier cas de nidification de la Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* en France. *Ornithos*, 15(6): 394-399.
- Frémont, J.-Y., Reeber, S., & CHN. 2007. Les oiseaux rares en France en 2005. *Ornithos*, 14(5): 265-307.
- Le Nevé, A., Dugué, H., Latraube, F., Musseau, R., Provost, P., & Jiguet, F. Synthèse des captures de phragmites aquatiques en France en 2010, *Plan national d'actions du phragmite aquatique 2010-2014*: DREAL Bretagne, CRBPO-MNHN, Bretagne Vivante.

- Mérot, J., & Raitière, W. 2010. Première nidification contemporaine du Pipit rousseline *Anthus campestris* en Bretagne historique. **Ornithos**, 17(4): 260-263.
- Recorbet, B., (Coord.). 1992. **Les oiseaux de Loire-Atlantique du XIX^{me} siècle à nos jours**. Nantes: Groupe Ornithologique de Loire-Atlantique.
- Reeber, S., & CHN. 2011. Les oiseaux rares en France en 2010. **Ornithos**, 18(6): 325-367.

Frédéric PORTIER 144, rue Georges Clémenceau 85190 VENANSAULT
(frederic-nadege.portier@orange.fr)

Willy RAITIERE Rougerand 44590 SAINT-VINCENT-DES-LANDES
(wild_wild_will_2000@yahoo.fr)

– Avril 2012 –