

# Les oiseaux rares en Loire-Atlantique et Vendée en 2012

Frédéric LE GALLO, Willy RAITIÈRE et le CH44-85

## Troisième rapport du comité d'homologation interdépartemental de Loire-Atlantique et Vendée

Ceci est le rapport des données homologuées en 2012 par le comité inter-départemental de Loire-Atlantique et Vendée. Ce comité, né de la fusion du CHD44 et du CHD85, a pris ses fonctions au 1<sup>er</sup> janvier 2010 et rassemble donc des ornithologues de Vendée et de Loire-Atlantique, chargés d'examiner les fiches concernant ces deux départements.

Trois associations sont partenaires et soutiennent le CH44-85: les LPO Loire-Atlantique et Vendée ainsi que le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique (GNLA).

Pour l'année 2012, ce comité est composé des membres suivants :

- Eugène Archer (44)
- Mathieu Faveyrial (85)
- Bertrand Isaac (85)
- Frédéric Le Gallo (85)
- Willy Maillard (44)
- Julien Mérot (44)
- Frédéric Portier (85) - Secrétaire du comité pour la Vendée
- Willy Raitière (44) - Secrétaire du comité pour la Loire-Atlantique

Pour l'année 2012, le comité a examiné 112 fiches, parmi lesquelles 98 ont été validées, donnant un taux d'acceptation de 87,5 %.

Nous rappelons que seules les données homologuées sont présentées dans les rapports du CH44-85 et du CMR et invitons les observateurs qui ne l'auraient pas encore fait à transmettre leurs fiches à l'adresse suivante : [ch44\\_85@yahoo.fr](mailto:ch44_85@yahoo.fr), même si les données sont antérieures à 2012.

### FAITS MARQUANTS :

Depuis la création du CH44-85 en 2010, 5 espèces font leur apparition dans le décompte : le Goéland d'Audouin, la Macareux moine, l'Hirondelle rousseline, la Fauvette à lunettes et le Gobemouche nain. L'observation de ce mâle cantonné de Fauvette à lunettes constitue par ailleurs la première donnée de cette espèce en Vendée. Aucune observation de l'espèce n'a été réalisée en Loire-Atlantique à ce jour.

Au chapitre des oiseaux nicheurs remarquables, on peut noter la première reproduction du Coucou-geai et de l'Élanion blanc en Loire-Atlantique. 2012 aura été par ailleurs une excellente année pour l'Élanion blanc puisque l'espèce a été notée en Mayenne, en Maine-et-Loire, dans les Deux-Sèvres...

En Vendée, des indices d'une reproduction possible de l'Aigle botté ont de nouveau été notés en 2012, ce qui devrait encourager les observateurs de ce département à fournir un effort particulier afin de prouver la reproduction de l'espèce.

En ce qui concerne les espèces traitées par le Comité d'Homologation National, notons la première mention française du Gravelot semipalmé réalisée sur le lac de Grand-Lieu (44), ainsi que les observations vendéennes remarquables de la Bernache à cou roux, du Bécasseau minuscule, du Tarier oriental, de la Grive dorée et du Bruant mélanocéphale.

## LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre total de données homologués depuis la création du CH44-85 et celui des individus correspondants, à l'exception de l'année 2012. Les deux suivants représentent le nombre de données homologuées et le nombre d'individus correspondant pour 2012 par département.
3. Présentation des données par ordre chronologique d'observation (département, effectif, localité et date). Concernant le(s) nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique), la mention *et al* indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x) en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné au rapport du CH est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo).
4. Distribution générale de l'espèce (entre parenthèses) et statut dans les départements, puis commentaire.

La séquence taxonomique est celle de la liste des oiseaux du Paléarctique occidental de la Commission de l'Avifaune Française (CAF 2011). Les données concernant les races sont mentionnées comme "présentant les caractéristiques" de la sous-espèce concernée.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : **Cygne de Bewick** - 1 individu le 26/02/2010, Saint-Joachim, Loire-Atlantique (J.L. Dourin *et al*, in LE GALLO ET RAITIERE 2013).

\* Espèce soumise au CH44-85 hors de certaines zones géographiques.

\*\* Espèce soumise au CH44-85 pour une/des date(s) d'observation exceptionnelle(s).

**CYGNE DE BEWICK *Cygnus columbianus***

(3/4) (44: 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique: 1 ad. au Marais de Grée / Ancenis le 26/01 (M. Sinoir, G. Foilleret, F. Jacob)

(Se reproduit en Sibérie arctique à l'est de la péninsule de Kola ; hiverne dans les îles Britanniques, du nord de la France au nord-est de l'Allemagne, et ponctuellement plus au sud). Donnée classique pour la Loire-Atlantique concernant cet hivernant rare dans ce département. Rappelons qu'en Vendée, l'espèce est très rare et irrégulière.

**CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus***

(1/1) (44: 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée: 1 ad. aux Aises / St-Hilaire-de-Riez du 22/12/12 au 02/01/2013 (G. Besseau *et al.*)

(Se reproduit de l'Islande et la Scandinavie jusqu'au nord-est de la Sibérie, également en Mongolie).

**OIE DES MOISSONS *Anser fabalis***

(5/7) (44: 0/0 ; 85 : 0/0)

2011 : 1 ind. sur le Communal de Lairoux (85) le 27/11 (faune-vendee.org)

(Scandinavie, Sibérie). Migratrice et hivernante rare, surtout en Vendée. A rechercher l'hiver dans le sud de ce département.

**BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla***

*Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce "hrota", appelée Bernache à ventre pâle.*

(10/11) (44 :2/2 ; 85 : 3/4)

Vendée: 1 puis 2 ad. au Goulet / Saint-Vincent-sur-Jard du 22/11/11 au 17/03/12 (F. Salmon *et al.*); 1 ad. au Polder de Sébastopol / Barbâtre du 24/03 au 01/04 (D. Robard *et al.*); 1 ad. au Gois / Barbâtre le 28/12 (G. Besseau)

Loire-Atlantique: 1 ad. à la Pointe St Gildas / Préfailles le 04/02 (D. Cléva); 1 ind. dans le Traict de Rostu / Mesquer le 02/09 (J.-M. Vailhen)

2011 : 1 ind. dans le Petit Traict / Guérande (44) le 16/10 (O. Vanucci) ; 1 ind. 1A le 22/11 au Goulet / Saint-Vincent-sur-Jard (85) (faune-vendee.org)

2009 : 6 ad. à la Côte Sauvage de l'île d'Yeu (85) le 28/08 (X. Hindermeier)

(Canada arctique, Groenland, Spitzberg, Terre François-Joseph). Ce taxon est observé très régulièrement dans les deux départements.

**BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla***

*Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce "nigricans", appelée Bernache du Pacifique.*

(3/2) (44 : 1/0 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ad. au Trou du Gros Banc / Guérande le 24/12 (H. Touzé)

(Amérique arctique, Sibérie orientale). Hivernant rare mais très régulier sur les deux départements. L'oiseau de Guérande est probablement le même que celui fréquentant le secteur depuis plusieurs hivers.

**FULIGULE A BEC CERCLE *Aythya collaris***

(4/3) (44 : 2/2 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 mâle ad. sur le bassin de lagunage de la Barre de Mont le 16/03 (P. Dulac)

Loire-Atlantique: 1 mâle du 1er au 21/03 au Mortier Noir puis au Mortier de Paquillès / Petit-Mars (F. Le Gal, D. Martineau, J.-L. Gasnier, D. Ménard, P. Lenrume *et al.*) ; 1 mâle ad. aux Prées Neuves / Saint-Mars-de-Coutais du 27/03 au 29/03 (R. Batard, S. Reeber, A. Doucet)

(Amérique du nord. S'égare régulièrement en Europe de l'Ouest, principalement dans les îles Britanniques). Hivernant rare et irrégulier sur les deux départements. L'oiseau découvert dans le marais de Petit-Mars et celui de Grand-Lieu ont été comptabilisés comme deux oiseaux différents, cependant, il est possible qu'il s'agisse du même individu ayant changé de site.

**FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca***

(7/7) (44 : 0/0 ; 85 : 1/2)

Vendée : 2 mâles ad. à la RNN de Saint-Denis-du-Payré le 11/03 (L. Chaillot *et al.*)



Fuligules nyrocas *Aythya nyroca*, St-Denis-du-Payré, mars 2012 (J.-C. Croisé ; Faune-Vendée.org).

(Niche des Balkans et de l'Europe centrale jusqu'à l'Asie centrale, occasionnellement plus à l'ouest). Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée ; sans doute plus régulier en Loire-Atlantique, notamment sur le Lac de Grand-Lieu.

**ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* \***

(19/54) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)

Vendée : Étang des Boucheries, 20 ind. comptés du 01/01 au 31/12 (L. Chaillot)

2011 : Étang des Boucheries, 10 ind. comptés du 01/01 au 31/12 (L. Chaillot)

(Amérique du nord, introduite en Grande-Bretagne depuis 1960). Espèce notée de la fin d'été à l'hiver sur les deux départements, sur les plans d'eau et lagunes de l'intérieur des terres. Plus rare sur le littoral.

Note du comité : *En premier lieu, l'étang des Boucheries (85) étant un lieu d'observation régulier, l'espèce n'y est plus soumise à homologation (le suivi par des observateurs avertis est gage de crédibilité). D'autre part, nous attirons l'attention des observateurs de cette espèce sur la qualité de rédaction des fiches. En effet, de nombreuses fiches sont insuffisamment renseignées et ne permettent pas d'exclure l'Érismature à tête blanche.*

**GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena***

(9/11) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée: 1 ad. à la plage des Ilioux / Île d'Yeu le 29/01 (X. Hindermeyer)

(Dans le Paléarctique occidental, la population reproductrice s'étend de la Russie à l'Allemagne à l'ouest et à la Turquie au sud. Hivernent principalement le long des côtes du nord de l'Europe, de la mer Noire et de l'Adriatique). Migrateur et hivernant rare et irrégulier sur les deux départements. La donnée de 2012 est tout à fait classique.

**PUFFIN MAJEUR *Puffinus gravis***

(6/10) (44 : 2/2 ; 85 : 4/4)

Vendée : 1 ind. lors de la traversée Yeu / Fromentine le 13/07 (M.-P. Hindermeyer) ; 1 ind. à la Pointe des Corbeaux / Île d'Yeu le 04/08 (E. Ouvrard) ; 1 ind. à la Pointe des Corbeaux / Île d'Yeu le 29/08 (M.-P. et X. Hindermeyer) ; 1 ind. à la Pointe du But / Île d'Yeu le 03/10 (B. Isaac)

Loire-Atlantique : 1 ind. mort sur la plage à "La croix des anses" / La Turballe le 04/08 (O. Plisson *et al.*) ; 1 ind. au Port Val / Le Croisic le 15/08 (P. Bellion)

(Niche dans quelques îles de l'Atlantique Sud : Inaccessible, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough). Migrateur très rare et très irrégulier, observé le plus souvent au large de nos côtes. La Vendée voit passer cette espèce régulièrement aux larges de ses côtes, notamment au niveau de l'île d'Yeu ou du phare de l'Armandèche. Les données en Loire-Atlantique sont remarquables et illustrent un afflux marqué sur la littoral atlantique en 2012.

**IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus*\***

(18/30) (44 : 6/11 ; 85 : 1/3)

Vendée : 3 ind. au Village Rocher / Bois-de-Céné le 29/06 (G. Perruchas)

Loire-Atlantique : de 1 à 3 ind. au Rosay / Mesquer ainsi qu'aux alentours du 08/01 au 25/03 (J.-M. Vailhen *et al.*) ; 1 ind. à Les Guihos / Assérac le 28/01 (A. Gergaud) ; 1 ind. à Lyarne / Les-Moutiers-en-Retz du 05/02 au 12/02 (J-Y Frémont, M. Gaudin) ; 4 ind. dont 1 bagué à Doñana en Espagne au Clairvaux / St-Joachim le 05/04 (V. Tanqueray) ; 1 ad. au Grand Marais / Bourgneuf-en-Retz le 21/06 (A. Doucet) ; 1 ind. en dortoir à Malor/ Guérande et dans divers endroits des marais salants du 27/11 au 20/03/13.



Ibis falcinelles *Plegadis falcinellus*, Bois-de-Céné, juin 2012 (G. Perruchas).

(Se reproduit, en Europe, essentiellement dans l'est et le sud du continent. La plupart des oiseaux européens hivernent en Afrique tropicale ou à l'est de la Méditerranée. En France, l'espèce niche depuis 2006 en Camargue). L'espèce devient de plus en plus régulière en Loire-Atlantique notamment où l'espèce s'est reproduite sur le lac de Grand-Lieu en 2011 (Reeber, 2011). Demeure rare et irrégulière en Vendée, hormis dans le marais breton, fréquenté de plus en plus régulièrement.

**Note du comité :** L'espèce n'est plus soumise à homologation en Loire-Atlantique, et notamment dans le Pays de Retz (44), site d'hivernage important pour l'espèce. D'autre part, la qualité des fiches reçues concernant cette espèce étant régulièrement insuffisante pour exclure les autres espèces d'ibis de type « falcinelle » (Ibis de la Puna *Plegadis ridgwayi* et Ibis à face blanche *Plegadis chihi*) pouvant être échappés de captivité, le CH44-85 rappelle qu'un document reprenant les critères d'identification a été diffusé à destination des observateurs. Ce document est consultable ici :

[http://files.biolovision.net/www.faune-vendee.org/pdf/files/news/ID\\_ibis\\_falcinelle-2667.pdf](http://files.biolovision.net/www.faune-vendee.org/pdf/files/news/ID_ibis_falcinelle-2667.pdf)

### **ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus***

(1/1) (44 : 3/7 ; 85 : 0/0)

**Loire-Atlantique:** 2 ad. et 1 juv. du 03/08 au 13/01/2013 au Pré de la Bosse à Corcoué-sur-Logne (D. Cléva et C. Naud) ; 3 juv. le 03/10 aux Magnées / Saint-Hilaire-de-Clisson (P. Bellion *et al.*) ; 1 ad. du 20/11 au 01/12 à Lincuire / Saint-Colomban (F. Gossmann, P. Bourdin, F. Latraube *et al.*)

(Europe, Afrique du Nord, Asie mineure). Espèce en forte expansion en France vers le nord. L'année 2012 est marquée par la nidification certaine de l'espèce dans le sud de la Loire-Atlantique (Cléva et Naud 2014) ainsi que par l'observation d'une fratrie de 3 juv. nés probablement localement. Les données d'oiseaux erratiques augmentent et laissent présager une présence durable de l'espèce sur notre territoire.

**VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus***

(3/6) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. en vol au-dessus de St Denis du Payré le 04/05 (H. Des Touches)

Loire-Atlantique : 1 subad. à la Védiais / Treffieux le 07/09 (Y. Brilland)



Vautour fauve *Gypsfulvus*, Treffieux, septembre 2012 (Y. Brilland).

(Europe, Afrique du nord, Moyen-Orient, ouest de l'Asie). Migrateur très rare, mais de plus en plus régulier ces dernières années sur nos départements.

**AIGLE BOTTE *Aquila pennata***

(9/10) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. à S<sup>te</sup> Foy le 02/06 (J.-D.Vrignault)

Loire-Atlantique : 1 ind. au Marais de Petit-Mars le 22/05 (E. Archer et A. Oates)

2011 : 2 ind. aux environs de la forêt de Mervent (85) le 12/05 (B. Perrotin) ; 2 ind. à St Juire-Champillon (85) le 19/05 (B. Perrotin)

(Europe, Afrique du nord, Asie centrale). Migrateur rare sur les deux départements mais nettement plus régulier en Vendée. La nidification, non prouvée à l'heure actuelle, dans ce département est fort probable étant donnée les dates d'observations et les comportements relevés ; il faut noter que cette espèce est très discrète en période de nidification.



**OUTARDE CANEPETIERE *Tetrax tetrax***

(1/1) (44 : 1/2 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 2 ind. sur la Prairie de Tenue / Frossay du 12/10 au 14/10 (G. Cochard *et al.*)

(Se reproduit du Maroc et de l'Europe de l'Ouest à travers l'Asie centrale jusqu'au nord-ouest de la Chine). L'espèce ne niche peut-être plus en Vendée, et a disparu en Loire-Atlantique. Cette donnée concerne des individus en halte migratoire.

**BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos***

(17/20) (44 : 5/5 ; 85 : 2/3)

Vendée : 2 ind. de 1A du 19/09 au 23/09 puis 1 ind. de 1A du 25/09 au 26/09 au Lac de Maché-Apremont (F. Portier)

Loire-Atlantique : plusieurs oiseaux observés sur le lac de Grand-Lieu : 1 ind. de 1A le 30/08, 1 ad. le 07/09, 1 1A du 12 au 14/09 et 1 1A du 21 au 25/09 (S. Reeber), 1 ind. de 1A aux Rochers de Bourg / Les-Moutiers-en-Retz le 25/09 (V. Bretille)

2011 : 1 ind. de 1A sur la RNN de St-Denis-du-Payré (85) le 22 et 23/08 (faune-vendee.org)

(Niche dans l'Arctique nord-américain, de l'ouest de la baie d'Hudson à l'Alaska et en Sibérie, à l'ouest jusqu'à la péninsule de Yamal. Hiverné en Amérique du sud, dans le sud-est de l'Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande). Rare et irrégulier aux deux passages, particulièrement au printemps ; plus régulier à l'automne. Effectifs normaux pour l'espèce en des dates et des lieux classiques.

**PHALAROPE A BEC ETROIT *Phalaropus lobatus***

(2/2) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ind. de 1A à l'étier de Bécassier/ Guérande le 3/11 (J.-P. Tilly)



Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus*, Guérande, novembre 2012 (J.-P. Tilly).

2011 : 1 mâle adulte aux Combes / Jard-sur-mer (85) le 01/07 (faune-vendee.org)

(Se reproduit tout autour du Grand Nord, y compris en Islande et dans le nord de l'Europe, surtout au-delà de 60°N, au sud jusqu'en Écosse). Espèce rare dans les deux départements. Observé principalement en fin d'été et à l'automne.

**LABBE A LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus***

(1/1) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 ind. de 1A sur l'étang des Boucheries / Les Landes Génusson du 23 au 29/08 (S. Mérand *et al.*) ; 1 ind. de 1A à la Pointe des Corbeaux / Île d'Yeu le 25/08 (X. Hindermeier)



Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*, Les Landes Génusson, août 2012 (H. Touzé).

(La sous-espèce nominale se reproduit de la Scandinavie et Russie arctiques et subarctiques jusqu'au delta de la Léna, en Sibérie). Espèce très rare dans les deux départements. La donnée à l'intérieur des terres est remarquable.

**GOELAND RAILLEUR *Chroicocephalus genei***

(3/1) (44 : 0/0 ; 85 : 1/0)

Vendée : 1 ad. séjournant annuellement sur l'île de Noirmoutier depuis 2003

(Se reproduit du Sénégal à la mer Méditerranée et jusqu'au Moyen-Orient, Kazakhstan et Pakistan). Il s'agit de l'individu découvert en 2003 et qui ne quitte désormais plus l'île.

**GOELAND D'AUDOUIN *Larus audouinii***

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ad. à la plage de la Grande Côte / La Barre-de-Monts le 07/06 (C. Dupé)

(Pourtour méditerranéen, en nette progression démographique depuis quelques années). Migrateur très rare dans les deux départements. Cette donnée est remarquable et suit celle de 2009 sur le littoral vendéen.

**GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis***

(7/7) (44 : 0/0 ; 85 : 2/0)

Vendée: 1 ad. à la STEP de Bourgenay / Talmont Saint Hilaire du 28/01 au 17/03 (L. Chaillot *et al.*) ; 1 ad. sur la RNN des marais du Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île du 22/11 au 06/03/12 (D. Desmots *et al.*)

(Niche dans le centre, le sud-ouest et l'est de l'Amérique du Nord. Hivernant et migrateur néarctique rare fréquentant surtout les zones côtières. Très occasionnel dans les terres). Hivernant et migrateur rare et irrégulier sur les deux départements. Certains secteurs vendéens comme l'île de Noirmoutier accueillent tout de même l'espèce annuellement. Les sites d'observation en 2012 sont classiques et les oiseaux probablement des habitués (et donc non comptabilisés).

**GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus***

(6/6) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. de 3A du 25/02 au 29/02 aux environs de la jetée de St Gilles-Croix-de-Vie (G. Besseau, A. et G.Reboul *et al.*)

(Niche au Groenland et en Islande puis de l'île Jan Mayern et du Spitzberg jusqu'en Sibérie. Hivernent surtout dans le nord de l'Atlantique jusqu'en Grande-Bretagne ; effectifs réduits plus au sud, présence occasionnelle en Suisse, en mer Caspienne et en Méditerranée). Hivernant rare et irrégulier en Loire-Atlantique, assez régulier en Vendée. Le suivi plus assidu des centres d'enfouissement de Loire-Atlantique laisse espérer des observations plus fréquentes de goélands néarctiques. La donnée vendéenne est classique.

**STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica***

(5/6) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)

2011 : 1 adulte sur la RNN de St-Denis-du-Payré (85) le 22 et 28/07 (faune-vendee.org)

(Du sud de l'Europe au Kazakhstan, au sous-continent indien et au nord-est de la Chine; également en petit nombre en Allemagne et au Danemark). Migratrice rare et irrégulière sur les deux départements. La RNN de St-Denis-du-Payré avait déjà accueilli l'espèce par le passé.

**STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii***

(4/6) (44 : 0/0 ; 85 : 1/3)

Vendée : de 1 à 3 ad. au Polder Sébastopol / Barbâtre du 23/06 au 01/07 (D. Robard)

(Des côtes est de l'Amérique du nord et des Antilles au nord du Venezuela, aux Açores et dans le nord-ouest de l'Europe). Migrateur occasionnel sur les deux départements. La colonie de sternes du polder Sébastopol attire régulièrement cette espèce. Aucune nidification n'a été constatée en 2012.

**GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus***

(22/34) (44 : 5/12 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. de 1A le 09/09 à la station de lagunage / Luçon (M. Bibard)

Loire-Atlantique : plusieurs individus sur le lac de Grand-Lieu : 8 ad. le 14/05, encore 6 le 16/05, 1 ad. le 22/08, 1 1A du 28/08 au 03/09, 1 1A avec le précédent du 01 au 03/09 (S. Reeber) ; 1 ind. de 1A à la Plaine de Mazerolles / Sucé-sur-Erdre du 19 au 20/08 (O. Poisson)



Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*, Lac de Grand-Lieu, août 2012 (S. Reeber).

(Niche de l'Europe de l'Est à la Sibérie orientale (région de l'Amour). Hivernent principalement en Afrique tropicale). En Loire-Atlantique, aucune tentative de nidification n'a été constatée en 2012 contrairement à 2011. L'espèce reste rare et irrégulière en Vendée aux deux passages.

**MERGULE NAIN *Alle alle***

(3/3) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 2 ad. à la pointe du But / Île d'Yeu le 01/11 (F. Portier)

2004 : 1 ind. à la plage du Pont Jaunay / Bretignolle-sur-Mer le 14/11 (G. Besseau)

(Niche depuis le haut Arctique canadien et le nord du Groenland jusqu'au Spitzberg et à la Nouvelle-Zemble). Occasionnel en hiver sur les deux départements.

**MACAREUX MOINE *Fratercula arctica***

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. mort sur la plage du Veillon / Talmont-St Hilaire le 03/01 (L. Chaillot)

(La sous-espèce nominale niche en Grande-Bretagne, Irlande, îles Féroé, sud de la Norvège, îles Anglo-Normandes et Bretagne). Malheureusement, la plupart des données de ce petit alcidé concerne des individus retrouvés morts sur les plages.

**COUCOU-GEAI *Clamator glandarius***

(8/7) (44 : 2/4; 85 : 2/1)

Vendée : 1 ind. aux Ransins / Noirmoutier-en-l'île du 29/03 au 07/04 (B. Thibeaud) ; 1 ad. du 12/04 au 14/04 aux Mauviollières / L'Epine (D. Robard)

Loire-Atlantique : 1 ind de 2A à Guérande - Saline Donne, Le Marsilly, Kerignon du 04/04 au 07/05 (J. Gauvin, J.-P. Tilly, S. Umhang) ; 3 ind. de 1A avenue de la Sarcelle / La Baule-Escoublac du 04/08 au 18/08 (P. Bellion)



Coucou-geai *Clamator glandarius*, La Baule-Escoublac, août 2012 (H. Touzé).

(Europe méridionale, Moyen-Orient, Afrique du nord). Migrateur rare mais de plus en plus régulier au printemps. L'espèce s'est reproduite en 2012 à La Baule-Escoublac (Bellion 2013), ce qui constitue une première pour la Loire-Atlantique. Plusieurs nidifications ont été suspectées ces dernières années et semblent témoigner d'une installation progressive de l'espèce sur notre territoire.

**PETIT-DUC SCOPS *Otus scops* \***

(2/2) (44 : 0/0; 85 : 1/1)

Vendée : 1 mâle chanteur aux Tranches / Notre-Dame-de-Monts le 23/06 (O. Legros)

(La sous-espèce nominale se reproduit de la France à la Volga, au nord des Pyrénées, de la Grèce et de la Turquie). Hormis la population noirmoutrine, aucune population établie n'est connue dans les deux départements. Les données concernent le plus souvent des chanteurs isolés probablement de passage.

**HIRONDELLE ROUSSELIN *Cecropis daurica***

(0/0) (44: 1/1 ; 85: 2/2)

Vendée : 1 ind. en vol au marais de la Guerche / Île d'Yeu le 05/05 (X. Hindermeyer) ; 1 ind. de 1A en vol au-dessus de la dune de la Grande Conche / Île d'Yeu le 30/10 (F. Portier)

Loire-Atlantique: 1 ind. à la Tenue de Mareil / Les-Moutiers-en-Retz le 02/05 (O. Penard)

(Pourtour méditerranéen, Afrique du nord, Asie Mineure). Migrateur rare mais régulier au printemps sur le littoral vendéen, plus occasionnel en Loire-Atlantique. Les données de 2012 concernent des localités classiques pour l'espèce.

**PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi***

(2/7) (44 : 0/0 ; 85 : 3/3)

Vendée : 1 ind. de 1A plage et dune de la Tourette / Île d'Yeu du 30/10 au 04/11 (X. Hindermeyer) ; 1 ind. à la jetée des îlots / L'Épine le 13/11 (D. Desmots) ; 1 ind. à la RNN des marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'île le 12/12 (D. Desmots)

(La sous-espèce type niche de la Sibérie occidentale à la Mongolie et hiverne principalement au Pakistan, en Inde, Chine et Asie du Sud-Est, mais aussi assez régulièrement très à l'ouest de ces quartiers habituels (Espagne, Afrique du Nord...)). Migrateur et hivernant rare et irrégulier sur les deux départements. Des individus notés en passage automnal mais pas d'hivernage complet noté en 2012.

**JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus***

(2/2) (44 :0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 femelle ad. au Marais du Jaunay / Givrand le 06/11 (G. Besseau)

(La sous-espèce type niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Lors de migrations partielles ou d'invasions, l'espèce atteint le sud de la Scandinavie, le Benelux ou l'ensemble de l'Europe centrale). Hivernant très rare dans les deux départements. Les observations de Jaseur boréal dépendent de phénomènes invasifs réguliers chez cette espèce. Cependant, l'ouest de la France est rarement concerné par ce type d'évènement. Cette donnée est extrêmement remarquable puisqu'en dehors de tout mouvement invasif.

**PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola***

(5/5) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

*Rappel* : espèce soumise à homologation uniquement en dehors des opérations de baguage.

Vendée : 1 ind. au Marais Salant de la Guittière à Talmont-St-Hilaire le 20/08 (L. Chaillot)

Loire-Atlantique : 1 ind. au Marais de Pompas à Herbignac le 20/08 (A. Gergaud *et al.*)

(Niche dans les états Baltes, en Biélorussie et en Russie, ainsi qu'en Pologne, en Hongrie et en Allemagne. Hiverné en Afrique de l'Ouest, au moins dans le delta du Sénégal). Seules les données d'oiseaux non capturés sont traitées dans ce rapport. Les opérations de baguage menées dans les deux départements montrent que l'espèce est de passage très fréquent durant le mois d'août dans les principales zones humides.

**HYPOLAÏS ICTERINE *Hippolais icterina***

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. de 1A à la dune de la Grande Conche / Île d'Yeu le 08/09 (X. Hindermeyer)

(Nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et l'est de l'Oural). Très rare sur les deux départements.

**FAUVETTE A LUNETTES *Sylvia conspicillata***

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 mâle ad. à la Pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer du 28/05 au 18/06 (F. Portier)

(Pourtour méditerranéen et Afrique du nord, espèce essentiellement littorale). Extrêmement rare sur la façade atlantique, cette donnée est une première pour la Vendée. L'habitat dans lequel elle fut observée est typique.





Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata*, L'Aiguillon-sur-mer, juin 2012 (G. Besseau).

**FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca***

(3/3) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 ind. le 02/09 aux Broches / Île d'Yeu (E. Ouvrard) ; 1 ind. du 04/10 au 05/10 dans la dépression de la Grande Conche / Île d'Yeu (J-M Guilpain *et al.*)

(Nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et l'est de l'Oural). Très rare sur les deux départements. L'espèce est cependant régulièrement observée sur l'île d'Yeu à l'automne.

**POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus***

(20/20) (44 : 1/1 ; 85 : 16/18)

Vendée : 1 ind. dans le Vallon de Sabias / Île d'Yeu du 29/09 au 05/10 (B. Isaac *et al.*) ; 1 ind. dans le Vallon de Sabias / Île d'Yeu le 05/10 (F. Portier) ; 1 ind. dans le Marais de la Croix / Île d'Yeu le 14/10 (F. Portier) ; 1 ind. aux Agaures / Les Sables d'Olonnes le 14/10 (D. Desmots) ; 1 ind. dans la dépression de la Grande Conche / Île d'Yeu du 15 au 17/10 (F. Portier) ; 1 ind. dans la dépression de la Grande Conche / Île d'Yeu le 16/10 (F. Portier) ; 1 ind. à la pointe des Corbeaux / Île d'Yeu le 17/10 (F. Portier) ; 1 ind. dans la saulaie des Poupounes / Île d'Yeu le 18/10 (F. Portier) ; 1 ind. dans la dépression de la Grande Conche / Île d'Yeu le 19 et 20/10 (F. Portier) ; 3 ind. à la dune de la Grande Conche / Île d'Yeu du 20/10 au 21/10 (X. Hindermeier) ; 1 ind. à Ker Châlon / Île d'Yeu le 21/10 (X. Hindermeier) ; 1 ind. au Fort Larron / Noirmoutier-en-l'île le 24/10 (D. Desmots) ; 1 ind. dans le bourg de Givrand du 24 au 25/10 (G. Besseau) ; 1 ind. à la Roullière / Noirmoutier-en-l'île du 25/10 au 03/11 (D. Robard) ; 1 ind. à Le Petit Bouillac / Saint-Vincent-sur-Jard du 30/10 au 01/11 (M. Piro et J.D. Vrignaud) ; 1 ind. à la RNN des marais du Müllembourg / Noirmoutier-en-l'île du 19/12 au 21/12 (D. Desmots)

Loire-Atlantique : 1 ind. sur le remblai de Donges est le 26/10 (E. Archer)

2011 : 1 ind. à la Pointe des Corbeaux / Île d'Yeu (85) le 03/10 (faune-vendee.org)

(Niche dans le nord de la Russie, de la Petchora et de l'Oural à l'ouest, jusqu'à l'Anadyr et la mer d'Orkhotsk à l'est et au sud jusqu'à la Mongolie et au nord-est de la Chine. Hiverné dans le sud-est de l'Asie). Espèce emblématique rare mais régulière chaque automne en Vendée, plus exceptionnelle curieusement en Loire-Atlantique. L'année 2012 est encore une très bonne année pour cette espèce en Vendée et quasi vide pour la Loire-Atlantique. Comme souvent, l'île d'Yeu rassemble la majorité des données.

**POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli***

(5/6) (44 : 1/1 ; 85 : 1/2)

Vendée : 2 mâles chanteurs à la Fouinière / Bretignolles-sur-Mer le 01/05 (F. Portier)

Loire-Atlantique : 1 ind. de 1A capturé et bagué à Lyarne/ Les-Moutiers-en-Retz le 10/09 (F. Latraube *et al.*)



Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*, Les Moutiers-en-Retz, septembre 2012 (F. Latraube).

(Nord-ouest de l'Afrique, nord et centre de l'Europe). Migrateur rare au printemps. Les données concernent principalement des oiseaux en migration pré-nuptiale.

**GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva***

(0/0) (44: 0/0 ; 85: 1/1)

Vendée : 1 ind. au golf de Port-Bourgenay / Talmont-St-Hilaire du 21 au 22/10 (L. Chaillot *et al.*)

(Europe centrale et de l'Est, jusqu'à l'Oural; hiverne au Moyen Orient). Occasionnel très rare à l'automne, cette donnée est la 4ème pour la Vendée.

**PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator***

(16/18) (44 : 1/1 ; 85 : 3/3)

Vendée : 1 femelle ad. de la ssp. *senator* aux Mauvelières / L'Epine le 05/05 (D. Robard) ; 1 mâle ad. au Grand Phare / Île d'Yeu le 12/05 (F. Portier) ; 1 mâle ad. au Petit Chaud / Bouin le 01/08 (J.-Y. Frémont)

Loire-Atlantique : 1 femelle ad. de la ssp. *senator* à Kerignon / Guérande le 02/05 (J.-P. Tilly)



Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator senator*, L'Epine, mai 2012 (D. Robard).

2011 : 1 jeune de l'année de la ssp. *senator*, aux Communaux / Longeville-sur-mer (85) le 19/08 (faune-vendee.org)

(Europe de l'ouest et îles de la Méditerranée). Migrateur rare aux deux passages, régulier en Vendée. L'île d'Yeu et de Noirmoutier demeurent les sites vendéens les plus attractifs pour contacter cette espèce.

**GRAND CORBEAU *Corvus corax***

(1/1) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. à la Matte à Rambeau / Beauvoir-sur-Mer le 12/02 (F. Portier)

(Présent en France dans les zones montagneuses et les falaises littorales de la Manche). L'espèce est présente en Bretagne et Normandie. Cette donnée est remarquable en ce qui concerne la date, car, pour cette espèce réputée sédentaire, les mouvements de jeunes sont notés en mars/avril et septembre/octobre. La localisation est également inédite.

**BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana***

(8/8) (44 : 3/3 ; 85 : 4/10)

Vendée : 2 ind. de 1A le 19/08 puis 5 ind. dont 1 ad. et 2 1A le 08/09 au Marais Salé / Île d'Yeu (M.-P. et X. Hindermeyer) ; 4 ind. dont au moins 1 ind. de 1A aux marais salants de la Guittière / Talmont-St-Hilaire le 07/09 (J.-D. Vrignault) ; 1 ind. de 1A au lagunage de la Tranche-sur-Mer le 09/09 (F. Portier)

Loire-Atlantique : 1 ind. de type ♀ sur les Prairies / Varades le 30/08 (P. Bellion) ; 1 ad. à la Dumanchère / Rougé le 10/09 (D. Grandière) ; 1 ind. de 1A capturé et bagué le 16/09 sur le Lac de Grand-Lieu (O. Poisson et S. Reeber)

(Europe de l'ouest à la Turquie). Migrateur peu commun sur les deux départements. Localisations et/ou dates classiques. Les effectifs notés en Vendée restent toutefois remarquables.

**Liste des données non homologuées**

**Bernache cravant du Pacifique *Branta bernicla nigricans***

1 ad. depuis l'observatoire du chenal vieux / Saint-Michel-en-l'Herm (85) le 09/04 – Description jugée insuffisante.

**Érismature rousse *Oxyura jamaicensis***

Une donnée de 2 ad. à l'étang de Beaumont / Issé (44) le 08/01 – Donnée non homologuée pour description insuffisante ne permettant pas d'exclure de façon certaine une Érismature à tête blanche.

**Puffin yelkouan *Puffinus yelkouan***

1 ind. en mer entre la Turballe et Hoëdic le 16/09 – La description et les clichés fournis ne permettent pas d'exclure un Puffin des anglais.

**Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus***

1 ind. à Lyarne / Les Moutiers-en-Retz (44) le 12/02 – Description jugée insuffisante pour exclure un ibis allochtone échappé.

1 ind. à la Saline de la Torte / Assérac (44) le 13/02 – Description jugée insuffisante pour exclure un ibis allochtone échappé.

1 ind. à la Butte à Bézier / Saint-Joachim (44) le 16/08 – Description jugée insuffisante pour exclure un Ibis de Ridgeway échappé. Une nouvelle fois, les critères attendus pour l'Ibis falcinelle (couleur du manteau ...) ne sont pas mentionnés

1 ind. au Chaussin Riou / Saint-Julien-de-Concelles (44) le 24/10 – Description jugée insuffisante pour exclure un ibis allochtone échappé.

**Oie des moissons *Anser fabalis***

1 ind. à l'île de la Pierre Rouge / Lavau-sur-Loire (44) le 13/02 – La description et les photos fournies ne permettent pas de valider cette espèce. Il s'agirait plutôt d'une Oie à bec court – Le CHN est saisi de cette donnée.

**Pluvier guignard *Charadrius morinellus***

1 ind. en vol dans le secteur de l'aérodrome / Ile d'Yeu (85) le 07/10/10 – Oiseau non vu, uniquement entendu.

**Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus***

1 ind. de 1A à la pointe du But / Ile d'Yeu (85) le 01/09 – Description laissant suggérer plutôt un Labbe parasite. Plusieurs critères ne correspondent à l'espèce proposée (description des primaires, des sous-caudales...).

**Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis***

1 ind. de 2A sur le lagunage de Jard-sur-Mer (85) le 13/02 – Les photos fournies montrent un Goéland argenté imm.

**Goéland pontique *Larus cachinnans***

1 ind. de 3A sur la plage de la Tourette / l'île d'Yeu (85) du 01/02/09 au 16/02/09 – Il s'agit très probablement de cette espèce, mais en l'absence d'éléments photographiques, il est impossible d'exclure un éventuel hybride.

1 ad. à Mésanger le 28/12 (44) – La description ne présente pas tous les critères diagnostics pour statuer positivement sur cette espèce.

**Martinet pâle *Apus pallidus***

1 ind. à la Boursinière – Noirmoutier-en-l'Île (85) le 14/11/11 - Si la date plaide en faveur de cette espèce, il manque de nombreux critères pour valider l'identification proposée.

**Pipit rousseline *Anthus campestris***

1 ind. à la Grand Falaise / La Turballe (44) le 25/06/11 – Description jugée insuffisante pour conclure à cette espèce.

**Bergeronnette printanière d'Italie *Motacilla flava cinereocapilla***

1 mâle ad. à la Pointe des corbeaux / Île d'Yeu (85) le 18/05/11 - Sur la base de l'article de P. J. Dubois dans Ornithos 19-2 (2012), les caractéristiques décrites laissent présumer d'une Bergeronnette d'Italie non-pure.

**Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus***

1 ind. entendu la vallée de l'Ecourt à Brem-Sur-Mer (85) le 22/10 – Malheureusement non homologué car oiseau non vu (cf. conditions d'acceptation des fiches auditives).

**Grimpereau des bois *Certhia familiaris***

1 ind. capturé et bagué à La Fignouzière au Poiroux (85) le 17/01/09 précédemment validé par le CHD 85 mais à présent rejeté en raison d'un haplotype et d'un phénotype correspondant au Grimpereau des jardins.

**Pie-grièche grise *Lanius excubitor***

1 ind. aux Brosses / Haute-Goulaine (44) le 26/10/10 – Description insuffisante, ne permettant pas de trancher entre les différentes espèces de pie-grièches grises.

**Étourneau unicolore *Sturnus unicolor***

1 ind. à la Chaize-le-Vicomte (85) le 02/06 – Pour cette donnée originale en raison notamment de sa localisation géographique, la description proposée est insuffisante et ne permet pas d'exclure de façon certaine un Étourneau sansonnet en plumage nuptial.

**Bruant ortolan *Emberiza hortulana***

1 ind. au Vigneux / Bouin (85) le 03/10/10 – Description trop succincte.

**Liste des données homologuées par le comité d'homologation national en 2012**

Les données ci-dessous sont issues du rapport 2012 du comité d'homologation national (Kayser, Paepegaey & le CHN 2014) et concernent les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée.

**OIE DE TAÏGA *Anser fabalis fabalis***

Vendée: 1 ad. à la Réserve de St Denis du Payré le 26/02 (P. Trotignon *et al.*)

**OIE A BEC COURT *Anser brachyrhynchus***

Vendée: 1 ad à la Réserve de St Denis du Payré du 11/02 au 20/02 (P. Trotignon *et al.*)

**BERNACHE A COU ROUX *Branta ruficollis***

Vendée: 1 ind. de 1A à la Réserve de St Denis du Payré du 15/12 au 01/03/13 (F. Portier *et al.*)

**SARCELLE A AILES VERTES *Anas carolinensis***

Vendée: 1 mâle ad. au Lairoux du 3/03 au 11/03 (G. Welch *et al.*)

**MACREUSE A FRONT BLANC *Melanitta perspicillata***

Vendée: 1 M de 2A du 23/03 au 14/04 et F ad. du 27/11 au 24/03/13 à la Terrière / La Tranche-sur-mer (P. Trotignon *et al.*)

**BUSARD PALE *Circus macrourus***

Vendée: 1 mâle ad. à Bennet le 22/08 (F. Caquineau)

**BUSE FEROCÉ *Buteo rufinus***

Vendée: 1 ind. à la Bouhière / Triaize du 16/07 au 26/10 (J. Gonin)

**BUSE PATTUE *Buteo lagopus***

Vendée : 1 ind. de 2A à le Chail / Saint-Pierre-le-Vieux le 21/03 (M. Faucher)

**MAROUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla***

Loire-Atlantique: 1 ind. de 1A au Lac de Grand-lieu / St-Philbert-de-Grand-Lieu le 19/08 (S. Reeber, O. Poisson)

**GRAVELOT SEMIPALME *Charadrius semipalmatus***

Loire-Atlantique: 1 ind. de 1A au Lac de Grand-lieu / St-Philbert-de-Grand-Lieu le 7/10 (S. Reeber)

**PLUVIER BRONZE *Pluvialis dominica***

Vendée : 1 ind. de 1A à la RNN des marais du Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île du 10/10 au 11/10 (D. Desmots *et al.*)

**VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius***

Vendée: 1 ad. au marais neuf / Beauvoir-sur-mer du 29/03 au 2/04 (E. Gas *et al.*) ; 1 ind. à Champagné-les-Marais du 22/10 au 23/10 (L. Gourraud *et al.*)

**BECASSEAU MINUSCULE *Calidris minutilla***

Vendée : 1 ind. de 1A sur le Luzan / Noirmoutier-en-l'Île le 10/10 (D. Desmots) puis 1 ind. de 1A à l'Epine du 12/12/12 au 24/01/13 (D. Robard *et al.*)

**BECASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis***

Loire-Atlantique: 1 ind. de 1A au Lac de Grand-lieu / St-Philbert-de-Grand-Lieu du 6/09 au 10/09 puis 1 ad. du 10/09 au 12/10 (S. Reeber)

**STERNE ELEGANTE *Sterna elegans***

Vendée : 1 ad. au polder Sébastopol / Barbâtre du 9/04 au 5/07 ([www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr))

**TARIER ORIENTAL *Saxicola maurus***

Vendée : 1 femelle à l'aérodrome de l'Île d'Yeu le 20/10 (X. Hindermeyer et F. Portier)

**GRIVE DOREE *Zoothera dauma***

Vendée : 1 ind. tué contre une baie vitrée à la Domanagère / Nesmy le 31/10 (O. Bossu *vide* F. Portier)

**ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola***

Loire-Atlantique: 1 ind. de 1A capturé à Donges le 28/08 (J. Foucher)

**ETOURNEAU ROSELIN *Pastor roseus***

Vendée : 1 ad. à Auderville les 29 et 30 juin (P. Colot *et al.*) ; 1 juv. à Noirmoutier-en-l'île le 26/08 (D. Robard) ; 1 juv. sur la plage des Bosilles / Île d'Yeu du 15 au 21/09 (X. Hindermeyer et F. Portier)

**BRUANT MELANOCEPHALE *Emberiza melanocephala***

Vendée: 1 mâle dans la dune de la Grande Conche / Île d'Yeu le 25/05 (S. Desmarest *et al.*)

**BIBLIOGRAPHIE**

Bellion P., 2013. Reproduction du Coucou geai *Clamator glandarius* en Loire-Atlantique.

**Ornithos** 20(1) : 64-65.

CAF, 2011. Liste des oiseaux du Paléarctique occidental. **Ornithos** 18(3) : I-XXVIII.

Cléva D. et Naud C., 2014. Suivi d'un couple reproducteur d'Elanion blanc *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789) en Loire-Atlantique. **Chronique naturaliste du GNLA** - années 2012 et 2013 : 9-18.

Kayser Y., Paepegaey B. et le CHN, 2014. Les oiseaux rares en France en 2012.

**Ornithos** 21(2) : 65-107.

Frédéric LE GALLO - 106, la Porcelière 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE -  
(flegallo@gmail.com)

Willy RAITIÈRE - 62, Rougerand 44590 SAINT-VINCENT-DES-LANDES  
(wild\_wild\_will\_2000@yahoo.fr)

– Décembre 2014 –