




## CONSEILS ET CONSIGNES POUR L'ATTRIBUTION DES CODES DE NIDIFICATION EN PAYS DE LA LOIRE



Tarier des prés (Francis Cauet ©)

*Guide n°5 : du Cochevis huppé à la Grive draine*

V1 - 03.05.2010



PAYS DE LA LOIRE



L'ensemble des informations composant ce guide sont principalement issues de documents suivants :

- « Vade-mecum de l'Ornitho en Poitou-Charentes » réalisé et coordonné par Poitou-Charentes Nature
- « Consignes par espèces, commentaire sur le statut et le comportement des espèces nicheuses en Bretagne » réalisé par le Groupe Ornithologique Breton.

***Nous tenons vivement à remercier les ornithologues et les associations nous ayant permis de reprendre divers informations concernant la biologie et l'écologie des espèces et tout particulièrement : Charente Nature, le Groupe Ornithologique Breton, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, la LPO Charente-Maritime, la LPO Vienne et Poitou-Charentes Nature ainsi que Alain Armouet, Christophe Bonnefont, Raphaël Bussière, Thomas De Cornulier, Jacques Delage, Cyril Eraud, Michel Granger, Frédéric Grellier, Pierre Grillet, Pierre Guignard, Noël Martin, Fabien Mercier, Christophe Verheyden et Jean-Marc Villalard.***

Une grande partie des informations proviennent également de l'état des lieux sur l'avifaune en Pays de la Loire réalisé en 2008.

## Espèces présentes dans ce guide

- Cochevis huppé
- Alouette lulu
- Alouette des champs
- Hirondelle de rivage
- Hirondelle rustique
- Hirondelle de fenêtre
- Pipit rousseline
- Pipit des arbres
- Pipit farlouse
- Pipit maritime
- Bergeronnette printanière
- Bergeronnette des ruisseaux
- Bergeronnette grise
- Troglodyte mignon
- Accenteur mouchet
- Rougegorge familier
- Rossignol philomèle
- Gorgebleue à miroir
- Rougequeue noir
- Rougequeue à front blanc
- Tarier des prés
- Tarier pâtre
- Traquet motteux
- Merle noir
- Grive musicienne
- Grive draine

---


## Légendes

### *Phénologie de la reproduction*

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

La période de reproduction de l'espèce est indiquée par le dégradé bleu. Pour les migrateurs, attention aux individus de passage en début et fin de période.

### *Carte de présence*



## Alaudidés

**Cochevis huppé (*Galerida cristata*) :**

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : milieux secs à végétation clairsemée : vignobles, dunes, friches, zones industrielles, cours de ferme... Niche directement au sol.

*Conseils* : repérer les chants et les cantonnements surtout au mois de mars mais également en avril ; fréquente souvent les cours de ferme.



**Alouette lulu (*Lullula arborea*) :**

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : milieux semi-ouverts notamment en bocage mais les grosses densités se trouvent principalement dans les secteurs de vignobles ; niche directement au sol.

*Conseils* : prospecter les secteurs favorables et repérer les chants entre mars et juin ainsi que les transports de matériaux.



**Alouette des champs (*Alauda arvensis*) :**

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : grande diversité de milieux ouverts : plaines cultivées, friches, prairies, dunes... Niche directement au sol.

*Conseils* : repérer le chant caractéristique surtout en mars, période de cantonnement ; attention aux mâles non appariés ; privilégier les indices tels que les nids, transport de matériaux et de nourriture.



Alouette des champs (Louis-Marie Préau ©)

## Hirundinidés

**Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) :**

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : creuse son nid dans les berges abruptes des cours d'eau et des carrières de roche meuble.

*Conseils* : éviter les codes hors des sites de nidification ; prospecter les secteurs favorables et le cas échéant, obtenir des indices certains.




**Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) :**

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : bâtiments ouverts, principalement dans les fermes, où elle construit un nid entièrement ouvert sur le dessus.

*Conseils* : prospecter à pied les villages ; repérer les chants, les individus collectant de la boue au sol ; ne pas hésiter à demander l'accès des nids au propriétaire afin de les compter.



**Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) :**

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : villes, villages et hameaux ; construit son nid généralement à l'extérieur des bâtiments, typiquement sur les encadrements des fenêtres mais également sous des corniches diverses ; nid en grande partie fermé.

*Conseils* : construction généralement à partir de mai ; prospecter à pied les villages ; repérer les chants, les individus collectant de la boue au sol ; ne pas hésiter à demander l'accès des nids au propriétaire afin de les compter.



## Motacillidés

**Pipit rousseline (*Anthus campestris*) :**

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : milieux secs type steppique tels que les vignobles ou les dunes ; niche directement au sol.

*Conseils* : migrateur jusqu'en mai, **éviter les codes « possible » avant le mois de juin** ; repérer les chanteurs sur les secteurs connus ou supposés ; suivre autant que possible la reproduction.



**Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) :**

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : milieux associant prairies et zones arborées par trop denses, notamment d'anciennes coupes forestières ainsi que des zones en déprises ; également en milieu bocager ; niche au sol.

*Conseils* : repérer son chant et son vol nuptial typique (décolle souvent depuis un arbre ou arbuste) ; cri d'alarme lorsque l'observateur à proximité du nid.



**Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) :**

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : prairies humides alluviales, marais, landes, secteurs herbeux du littoral et même dans des zones anthropisées (aérodromes, friches industrielles..).

*Conseils* : pas de code « possible » avant le mois de mai ; repérer les chanteurs (vol nuptial) sur les secteurs favorables ; repérer également les transports de matériaux et de nourriture.



**Pipit maritime (*Anthus petrosus*) :**

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : uniquement sur le littoral, dans les secteurs à côte rocheuse, endiguement et marais salants ; niche dans les anfractuosités de la roche.

*Conseils* : chant et parade nuptial typique ; repérer également les transports de matériaux et de nourriture.



**Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) :**

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : principalement dans les secteurs de prairies humides (vallées alluviales et marais) ; également, mais plus rarement, en zone de plaines cultivées ; niche au sol.

*Conseils* : attention aux migrateurs tardifs, **éviter les codes « possible » avant la mi-avril** ; repérer les individus chanteurs et les transports de nourriture.





Bergeronnette printanière (Francis Cauet ©)

**Bergeronnette des ruisseaux**

(*Motacilla cinerea*) :

*Habitats* : se reproduit à proximité des cours d'eau clairs et rapides ; niche principalement dans une cavité de la berge ou d'un pont.

*Conseils* : prospecter les berges des cours d'eau favorables, les écluses et les chaussées de moulin ; chant sonore, varié avec gazouillis et trilles ; transport de matériaux pour le nid et de nourriture pour les jeunes.

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------



**Bergeronnette grise (*Motacilla alba*) :**

*Habitats* : nombreux milieux notamment urbains mais également les parcs, les jardins, le bocage... Niche dans des cavités (murs, toit...)

*Conseils* : repérer les individus chanteurs et les couples ; transports de matériaux et de nourriture dans les cavités.

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------



## Troglodytidés

**Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) :**

*Habitats* : milieux très variés souvent riches en buissons ; nid en forme de boule, souvent à faible hauteur notamment dans le lierre mais également dans les murs ou d'anciens nids d'Hirondelle rustique.

*Conseils* : repérer les mâles chanteurs cantonnés et très actifs dès le début mars puis repérer les transports de matériaux et de nourriture.

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------



## Prunellidés

**Accenteur mouchet (*Prunella modularis*) :**

*Habitats* : milieux très variés, souvent à proximité d'habitation ; nid à faible hauteur.

*Conseils* : repérer les mâles chanteurs cantonnés, de préférence tôt le matin (discretion du chant) ; repérer les parades aux mois de mars et avril (agitation de la queue et ailes tremblantes) ; deuxième période de chant au mois de juillet.

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------



## Turdidés

**Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*) :**

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : milieux très variés (bois, bocage, jardins, parcs...) ; nid à hauteur variable selon les supports et les milieux.

*Conseils* : repérer les mâles chanteurs dès le mois de mars puis repérer les transports de matériaux et de nourriture.



**Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*) :**

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : divers milieux riches en haies et buissons (bocage, proximité de cours d'eau, bois, hameau...) ; nid souvent à faible hauteur et à proximité de l'eau.

*Conseils* : chant puissant à écouter tôt le matin, en soirée voire de nuit selon les conditions ; repérer les transports de matériaux et plus tard, de nourriture.



**Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*) :**

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : sur le littoral à proximité des marais salants ou saumâtres buissonnants mais également dans les marais doux ; également (beaucoup plus rare) loin du littoral, dans des zones humides continentales voire dans certaines cultures (colza et pois).

*Conseils* : repérer les chanteurs d'avril à mai puis les transports de nourriture ; porter une attention particulière aux individus cantonnés hors du littoral. En Pays de la Loire, il s'agit de la sous-espèce *namnetum*, à confirmer cependant en Sarthe.



Gorgebleue à miroir (Louis-Marie Préau ©)

**Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) :**

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : à proximité des habitations en zone rurale ou urbaine ; construit son nid sous les toits ou anfractuosités des murs.

*Conseils* : repérer les mâles chantant de manière très visible, les vols de parade ainsi que les allers et venus vers le nid.



**Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) :**

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : plus fréquent dans les milieux boisés, se reproduit également dans les zones bocagères denses ainsi que dans les parcs et les vergers.

*Conseils* : repérer les mâles chanteurs à partir d'avril ainsi que les parades qui ont lieu en fin de mois d'avril ; rechercher les comportements de construction et de nourrissage.



**Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) :**

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : prairies humides naturelles des vallées alluviales, principalement prairies de fauche ; nid au sol.





*Conseils* : repérer les mâles chanteurs à partir de la fin avril puis le transport de nourriture vers le site de reproduction ; chercher ces indices avant la période de fauche sur les secteurs non contractualisés.

**Tarier pâtre (*Saxicola torquatus*)** : 

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : milieux buissonnants plutôt secs (landes, bordure de route, pierriers, steppes...) ; évite les secteurs de grandes cultures ; nid au sol.

*Conseils* : repérer les mâles chanteurs dès le mois de février, les transports de matériaux dès le mois de mars puis les apports de nourriture.



**Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)** : 

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : milieux de végétation rase (dunes, pelouses littorales, carrières...) où il peut trouver un terrier pour nicher.

*Conseils* : **éviter les codes « possible » avant la mi-mai** ; les individus contactés aux mois de juin et juillet sont des nicheurs « possible » et il est indispensable d'assurer un suivi afin de confirmer la reproduction ; rechercher les mâles chanteurs très visibles en mai, les parades ainsi que les transports de matériaux et de nourriture.



**Merle noir (*Turdus merula*)** : 

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : milieux variés aussi bien à la campagne que dans des zones urbaines ; nid dans souvent à mi-hauteur dans la végétation.

*Conseils* : repérer les mâles chanteurs dès le mois de février puis repérer les transports de matériaux et de nourriture



**Grive musicienne (*Turdus philomelos*)** : 

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : milieux variés aussi bien à la campagne que dans des zones urbaines ; nid dans souvent à mi-hauteur dans la végétation.

*Conseils* : repérer les mâles chanteurs surtout en mois de mars puis repérer les transports de matériaux et de nourriture.



**Grive draine (*Turdus viscivorus*)** : 

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

*Habitats* : à proximité de milieux boisés entrecoupés de prairies et pâturages ; nid construit en hauteur, adossé à au tronc d'un arbre.

*Conseils* : repérer les mâles chanteurs dès le mois de février puis repérer les transports de matériaux et de nourriture.





## **Bibliographie**

Groupe Ornithologique Breton, 2004. *Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Annexe 3 : Consignes par espèce, commentaires sur le statut et le comportement des espèces nicheuses en Bretagne*. Groupe Ornithologique Breton, 6 p.

Marchadour B. & Séchet E. (coord.), 2008. *Avifaune prioritaire en Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 221 p.

Poitou-Charentes Nature, (éds.) 2005. *Vade-mecum de l'ornitho en Poitou-Charentes*. Poitou-Charentes Nature, Poitiers, 186 p.