Les oiseaux rares en Languedoc-Roussillon en 2011

4e rapport du Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon

Cédric Peignot & le CHR-LR

Cormoran de Desmarest *Phalacrocorax aristotelis desmarestii*, immature, Agde, août 2011 (F. Barszezak).

Introduction

Ce 4e rapport du Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon (CHR-LR) couvre l'année 2011. Le nombre total de fiches examinées est de 160 et le taux d'acceptation global est d'environ 90 %. En 2012, deux nouveaux membres rejoignent le comité : Tristan Guillosson et Georges Olioso. Ils remplacent Frédéric Garcia et Xavier Rufray, membres sortants. Le CHR-LR se compose donc aujourd'hui de Gilles Balança, Dominique Clément, Pierre-André Crochet, Tristan Guillosson, François Legendre, Georges Olioso, Cédric Peignot (Secrétaire) et Matthieu Vaslin.

Révision de la liste des espèces soumises à homologation en Languedoc-Roussillon

A partir du 1er janvier 2013, suite à leur retrait de la liste du Comité d'Homologation National (CHN), les quatre taxons suivants sont soumis à homologation régionale et intègrent donc la liste 2013 du CHR-LR. Il s'agit du Busard pâle *Circus macrourus*, de la Buse pattue *Buteo lagopus*, du Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides glaucoides* (le Goéland de Kumlien *Larus glaucoides kumlieni* restant sur la liste CHN) et de l'Étourneau roselin *Sturnus roseus*. Par ailleurs, le CHR-LR ne récoltera plus les données d'espèces allochtones ; il est demandé aux observateurs de bien vouloir transmettre celles-ci, si possible accompagnées d'une photographie, à l'association ornithologique locale ou de les saisir directement sur Faune-LR : www.faune-lr.org.

Critères de validation des fiches

Chaque fiche qui parvient au comité est examinée par les huit membres. Une fiche peut-être validée ou acceptée par un membre (vote A) ou bien refusée (vote R). Un membre peut aussi demander que la fiche soit discutée en réunion plénière (vote D) ou bien se déclarer non compétent pour donner un

avis sur telle ou telle espèce ou pour statuer sur tel ou tel problème d'identification (NC). Les critères de validation retenus sont les suivants :

- une fiche est acceptée si elle recueille au moins 6 votes A sans aucun vote R.
- une fiche sera discutée en réunion plénière si elle recueille au moins 2 votes D, ou bien 1 ou 2 vote(s) R.
- une fiche sera refusée si elle recueille 3 votes R ou plus.

Tout observateur qui s'est vu refuser une fiche peut la proposer à nouveau à condition que celle-ci contienne des éléments nouveaux qui n'avaient pu être fournis d'emblée.

Fiche d'homologation

La fiche d'homologation 2013 a été légèrement remaniée dans sa présentation afin d'inciter plus fortement les observateurs à décrire en priorité les caractéristiques physiques de l'oiseau ainsi que son comportement. Le rappel des circonstances de l'observation peut apporter un éclairage intéressant sur l'identification de l'espèce mais reste secondaire et sans aucune valeur à lui tout seul. Une fiche d'homologation est constituée de deux parties : une partie *signalement* destinée à recueillir les informations générales concernant l'observation et une partie *description* de l'oiseau observé. Cette dernière doit être rédigée à partir des notes prises sur le terrain et non après consultation des guides, ce qui fausse très souvent l'objectivité. Lorsque des photos sont prises, et nous engageons fortement tous les observateurs à essayer de photographier systématiquement les oiseaux lorsque cela est possible, il est bon de les joindre à la fiche, accompagnées d'une ou deux lignes de commentaires. Un simple croquis annoté ou un dessin constituent également des documents précieux et se montrent souvent plus fidèles à la réalité qu'une rédaction différée fondée sur le souvenir. D'autant qu'ils peuvent facilement être scannés ou photographiés puis envoyés par courrier électronique. Un ***réel effort de rédaction*** est demandé à tous les observateurs qui nous envoient leurs fiches. Dans une majorité de situations, il est tout à fait possible de faire une description claire et sans ambiguïté en moins de cinq lignes. Une bonne description se contente de lister les uns sous les autres les critères déterminants qui ont permis l'identification. Cette méthode de la liste de critères est beaucoup plus convaincante qu'un long commentaire qui s'attarderait sur des aspects non diagnostiques du plumage.

Liste systématique des données homologuées

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les chiffres représentent respectivement le nombre de données et le nombre d'individus correspondant homologués en 2011.
3. Présentation des données par année classées par ordre alphabétique des départements.
4. Commune, lieu-dit par ordre alphabétique, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus.
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), enregistré en vidéo (vidéo) ou sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Nom(s) du (ou des) observateur(s) *ayant rédigé une fiche, fourni une photo et/ou des informations complémentaires*.
9. La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique occidental (CAF/LPO 2006).
10. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Grèbe jougris – un individu à Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, le 10 décembre 2006 (Yves Dubois, *in* Peignot *et al*. 2008).
11. Afin que chaque observateur ait un aperçu global des observations d'oiseaux rares dans la région, le rapport du CHR-LR mentionne également les données d'espèces présentes sur la liste nationale et observées en Languedoc-Roussillon. Ces données, homologuées ou au contraire

rejetées par le Comité d'Homologation National, sont extraites des rapports annuels de ce comité et figurent ci-dessous, sans commentaires et précédées de la mention CHN. Lorsque cela semble nécessaire, des précisions resituant l'observation dans une perspective régionale sont ajoutées sous la liste des données.

Bernache cravant *Branta bernicla* **(1/12)**
Aude – Gruissan, étang de l'Ayrolle : 12 ind., 19 et 20 mars (T. Guillosson *et al*.).
Hivernant occasionnel. Cette observation assez surprenante rappelle celles effectuées en janvier 2009 où un groupe d'une vingtaine de cravants avait été observé dans le même secteur (Peignot et al. *2009). Mais à l'époque, les oiseaux étaient arrivés dans un contexte exceptionnel (tempête Klaus du 24 janvier).*

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* **(4/9)**
Gard – Vauvert, marais de Buisson Gros : 2 mâles ad., 23 septembre (J.-P. Trouillas *et al*.). **Hérault –** Mireval, étang du Vagaran : mâle ad., 25 avril (F. Garcia). **Pyrénées-Orientales –** Canet-en-Roussillon, base nautique de Saint-Cyprien : mâle ad., 23 décembre (C. Peignot), le Cagarell, 5 ind., 31 décembre (Y. Aleman).
Hivernant régulier en nombre restreint. L'année 2011 marque une légère augmentation du nombre d'oiseaux. L'espèce est à présent assez régulière en hiver. A noter l'arrivée assez précoce des deux mâles de Buisson Gros ainsi que l'observation assez tardive d'un autre mâle au Vagaran alors qu'aucun oiseau n'avait été vu jusqu'à présent après février. Le Fuligule nyroca n'est plus soumis à homologation depuis le 1er janvier 2012.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* **(3/5)**
Lozère – Naussac, lac de Naussac : 2 fem. ad., phot., 15 janvier (F. Legendre *et al*.). **Pyrénées-Orientales –** Canet-en-Roussillon, base nautique de Saint-Cyprien : fem./imm., phot., 30 décembre (A. Ollé *et al*.) ; Villeneuve-de-la-Raho, lac : 2 fem./imm., 19 novembre (C. Fridlender *et al*.).
2009 Hérault – Vic-la-Gardiole, étang de Vic : fem./imm., du 25 au 27 janvier (P.-A. Crochet & T. Bonnet).
Hivernant rare. C'est la troisième année consécutive que l'espèce est observée à plusieurs endroits. Le Garrot à œil d'or est-il devenu moins rare que dans les années 80-90 où il n'était observé que lors d'hivers rigoureux, hors lac de Naussac où il est quasiment annuel ?

Harle piette Mergellus albellus **(1/1)**
Lozère – Naussac, lac de Naussac : fem., 15 janvier (F. Legendre *et al*.).
Hivernant occasionnel. Première donnée depuis la création du comité en 2006 et seconde donnée pour la Lozère, la première datant de 1985. L'espèce n'avait probablement pas été observée depuis près d'un quart de siècle dans la région.

Harle bièvre *Mergus merganser* **(2/2)**
Lozère – Le Buisson, lac du Moulinet : fem., phot., 3 et 4 mars (R. Destre). **Pyrénées-Orientales –** Villelongue-dels-Monts, gravière : fem./imm., phot., du 15 au 19 janvier (J. Laurens *et al*.).
Hivernant rare. Une fois de plus, l'espèce est contactée sur des plans d'eau situés bien à l'intérieur des terres, à l'inverse de son congénère le Harle huppé M. serrator, *presque exclusivement observé sur les étangs littoraux. L'espèce peut même être observée sur des cours d'eau. Comme pour le Garrot à œil d'or, on constate que le bièvre est une espèce annuelle sur ces cinq dernières années.*

Harle bièvre *Mergus merganser*, femelle/immature, Villelongue-dels-Monts, janvier 2012 (J. Laurens).

Plongeon catmarin *Gavia stellata* **(2/4)**
Aude – Leucate, falaises : 1er hiver, 31 janvier (G. Olioso). **Hérault** – Portiragnes, plage : 3 ind., 6 février (P. Geniez *et al*.).
Hivernant peu commun. Ce sont seulement les quatrième et cinquième données en deux ans pour cette espèce susceptible d'être observée sur les grands lacs de barrage comme sur les côtes.

Plongeon imbrin *Gavia immer* **(2/2)**
Aude – Bages, étang de Bages : 1er hiver, 13 décembre (S. Reyt) ; Belflou, retenue de l'Estrade : 17 décembre (S. Reyt).
Hivernant peu commun. Une nouvelle donnée pour la retenue de l'Estrade dans l'Aude. Les deux observations de cette année sont à des dates tout à fait classiques pour l'espèce : à part une observation le 18 novembre 2009 à Port-la-Nouvelle (D. Clément in *Peignot* et al. *2010), les premiers imbrins ne sont notés qu'à partir de la deuxième décade de décembre.*

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* **(1/1)**
Hérault – Frontignan, plage des Aresquiers : 3 avril (C. Peignot).
Hivernant rare. A la différence de l'esclavon, le jougris n'est pas observé tous les ans en Languedoc-Roussillon. C'est seulement la cinquième donnée homologuée depuis 2006.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus* **(1/4)**
Aude – Gruissan, étang de l'Ayrolle : 4 ind., 11 avril (F. Garcia).
Hivernant rare. Quatre oiseaux ensemble, c'est sans doute une première pour le Languedoc-Roussillon. A cette époque de petits groupes d'esclavon en migration prénuptiale sont observés assez régulièrement dans le golfe de Beauduc (Bouches-du-Rhône) comme ce fut le cas avec trois oiseaux observés le 18 avril 2008 (F. Legendre comm. pers) ou plus récemment avec quatre individus le 26 mars 2011 (P. Foulquier in *Faune PACA www.faune-paca.org).*

Cormoran de Desmarest *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* **(3/3)**
Hérault – Agde, le cap d'Agde : 1ère année, du 8 au 30 août (P. Laur-Fournié & F. Barszezak) ; Frontignan, lagunage des Aresquiers : imm., phot., du 13 novembre au 16 mars 2012 (X. Rufray & C. Peignot), plage des Aresquiers : imm., 12 juin (P. Geniez).
Hivernant peu commun. Quatre oiseaux en 2011, c'est assez peu en définitive. L'oiseau observé au lagunage des Aresquiers se reposait sur le bord des bassins avec un petit groupe de Grands Cormorans P. carbo*. C'est la seule donnée « d'eau douce » jusqu'à ce jour, encore faut-il préciser que la mer est située à cent mètres du lagunage…*

Cormoran de Desmarest *Phalacrocorax aristotelis desmarestii*, immature en compagnie de deux Grands Cormorans *P. carbo* et d'un Héron cendré *Ardea cinerea*, Frontignan, décembre 2011 (X. Rufray). De loin, le bec du Grand Cormoran peut paraître fin ; lorsqu'on ne parvient pas à se faire une idée de la taille de l'oiseau, il vaut mieux se concentrer sur la forme du front (anguleux chez *desmarestii*, fuyant chez *carbo*) et pour les immatures, s'assurer de la présence d'une zone pâle sur les couvertures sus-alaires. Noter aussi le bec bicolore du huppé (culmen foncé, gonys jaune) alors qu'il est uniformément gris pâle chez le Grand.

CHN **Cormoran pygmée** *Phalacrocorax pygmeus*
Gard – Vauvert : ad., phot., 21 avril (M. Gauthier-Clerc). Hérault – Agde : 1er hiver, phot., du 28 mars au 7 avril (A. Labouille, M. Lognos *et al.*). **Pyrénées-Orientales –** Canet-en-Roussillon, base nautique de Saint-Cyprien : 1er hiver, phot., du 28 décembre au 24 mars 2012 (A. Pataud *et al.*).

Élanion blanc *Elanus caeruleus* **(7/8)**
Aude – Fanjeaux : 2 ad., du 12 août au 1er septembre (T. Guillosson) ; La Palme, salins : ad., 29 mars (E. Rousseau) ; Port-la-Nouvelle, plateau : ad ?, 11 octobre (T. Guillosson). **Gard –** Le Cailar, pont des Tourradons : ad., 9 mars (S. Gardien *et al.*) ; Saze : ad., 1er juin (F. Garcia). **Hérault –** Lespignan, le Cabagnol : ad., 27 avril (S. Rolland *et al.*). **Lozère –** Servières, Chauvets : 5 août (C. Gonella).
Erratique peu commun avec deux périodes où la probabilité de contact est accrue : au printemps, notamment à la fin du mois de mars, et à la fin de l'été. En Languedoc-Roussillon, 2011 est une année record pour l'Élanion qui était encore soumis à homologation nationale en 2009 !

L'explosion démographique de l'espèce depuis les sites de nidification du sud-ouest de la France (139 jeunes à l'envol en 2010) se traduit logiquement par une augmentation des contacts dans les régions avoisinantes (de Seynes et al. *2011). La nidification en Languedoc-Roussillon est avérée en 2012…*

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* **(3/2)**
Aude – Fleury-d'Aude, étang de Pissevaches : imm., phot., 23 janvier (F. Freydt & J.-M. Toublanc).
Gard – Sainte-Anastasie, mas de Gasc : imm., phot., du 11 au 18 mars (J.-D. Méric & S. Keller) ; Saint-Gilles, mas du Petit Canavère : 1er hiver, phot., 8 mars (J.-P. Trouillas).
Hivernant occasionnel. A nouveau deux oiseaux en 2011, si l'on considère que les données de Saint-Gilles de Sainte-Anastasie, proches géographiquement et chronologiquement, concernent le même individu. L'oiseau photographié à l'étang de Pissevaches et très probablement repéré dès le 19 janvier sur l'étang de Vendres (D. Clément comm. pers.) fournit l'une des très rares données audoises. On peut penser qu'il s'agit du même oiseau observé le 13 novembre 2010 sur l'étang de Salses (Pyrénées-Orientales), d'autant que celui-ci semble être resté sur ce secteur quelques jours après cette date (C. Sielva in *Peignot* et al. *2011).*

Pygargue à queue blanche *Haliaaetus albicilla*, immature et Flamants roses *Phoenicopterus roseus*, Fleury-d'Aude, janvier 2011 (J.-M. Toublanc).

CHN **Busard pâle** *Circus macrourus*
Gard – Marguerittes, Rastègues : mâle ad., 11 septembre (M. Bernard).

2009 Aude – Espezel : mâle ad., du 4 au 16 avril (C. Riols).
2002 Aude – Armissan : mâle ad., 3 avril (A. Liger).

CHN **Buse pattue** *Buteo lagopus*
Gard – Vauvert, mas des Iscles : 1er hiver, 12 février (J.-P. Trouillas *et al.*).

CHN Aigle pomarin *Aquila pomarina*
Aude – Gruissan, roc de Conilhac : juv., phot., 10 octobre (M. Boch).

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* **(4/4)**
Aude – Bages : 6 décembre (E. Rousseau). **Gard –** Aigues-Mortes, salins : phot., 20 novembre (G. Monchaux). **Hérault –** Agde : 1er décembre (C. Peignot), réserve du Bagnas : 26 décembre (A. Vernet).
Hivernant peu commun à régulier nombre restreint. Cinq données hivernales, c'est deux fois plus qu'en 2010 en tenant compte du fait que l'oiseau de Portiragnes découvert dès le 6 décembre 2010 est déjà comptabilisé dans le rapport précédent (P. Gitenet et al. in *Peignot* et al. *2011). Pas de réel cas d'hivernage cette année, puisqu'une seule donnée concerne un stationnement de plus d'un mois, celle de Portiragnes. Les autres observations semblent concerner des oiseaux en transit, même si les sites visités correspondent aux sites où le Balbuzard a déjà séjourné en hiver (étang du Bagnas, salins d'Aigues-Mortes). L'espèce n'est plus soumise à homologation depuis le 1er janvier 2012.*

Marouette poussin *Porzana parva* **(2/2)**
Gard – Le Cailar, Cadenet : mâle, trouvé mort, phot., 15 juillet (J.-P. Trouillas). **Hérault –** Lespignan, étang de la Matte : fem., 16 et 17 avril (B. Vollot).
2010 Pyrénées-Orientales – Canet-en-Roussillon, étang de Canet : mâle ad., du 21 au 26 avril (K. Schmale, C. Peignot, Y. Dubois).
Visiteur d'été peu commun, surtout au printemps. Deux données en 2011, comme en 2010 et en 2009. La discrétion de l'espèce explique en grande partie cette présence à la fois rare et régulière. Sur les deux données de 2011, aucune observation aux jumelles puisque l'une concerne un oiseau victime de la circulation routière et l'autre un oiseau levé durant une opération de baguage du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola *lors de la pose de filets au milieu d'une phragmitaie inondée.*

Marouette poussin *Porzana parva*, mâle, Le Cailar, juillet 2011 (J.-P. Trouillas). Sur cette photo, on distingue la racine rouge du bec, typique de l'espèce mais on comprend aisément pourquoi elle est difficile à voir sur le terrain, où il vaut mieux se concentrer sur le motif des flancs et du dessus ainsi que sur la taille de la projection primaire.

Petit Gravelot *Charadrius dubius* **(1/3)**
Hérault – Lansargues, Tartuguière : 3 ind., 4 décembre (G. Balança *et al*.).
Hivernant rare. L'espèce est quasiment vue tous les hivers depuis 2007 mais uniquement à l'unité ou en très petit nombre. Attention à la confusion « classique » avec le Grand Gravelot C. hiaticula *qui est un hivernant beaucoup plus commun en Languedoc-Roussillon.*

CHN Vanneau sociable *Vanellus gregarius*
2010 Aude – Roquefeuil : 11 novembre (C. Riols *et al*.).

Bécasseau de Temminck *Calidris temmincki* **(1/1)**
Hérault – Sète, le Castellas : phot., 18 décembre (F. Baudat & P. Gitenet).
Hivernant occasionnel. Première donnée hivernale pour cette espèce depuis 2006. Face à une donnée aussi importante, une photo, même médiocre, s'imposait. Merci donc aux observateurs d'avoir eu le bon réflexe.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*, Sète, décembre 2011 (P. Gitenet).

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* **(4/4)**
Aude – Gruissan, salins : ad., phot., 13 août (M. Boch, T. Guillosson & K. Schmale) ; Narbonne, Tournebelle : juv., phot., du 15 au 18 septembre (M. Boch *et al*.). **Gard –** Cruviers-Lascours, bacs de la distillerie : juv., phot., du 10 au 12 octobre (M. White *et al*.). **Hérault** – Mireval, étang du Boulas : juv., phot., 25 septembre (K. & T. Schmale).
Migrateur postnuptial rare. Le nombre de données de cette espèce semble augmenter chaque année et l'année 2011 établit un nouveau record avec quatre oiseaux différents. Ce total paraît toutefois assez modeste comparé aux centaines d'oiseaux observés au mois de septembre 2011 dans les îles Britanniques et aux dizaines observées en Espagne à la même période (www.rarebirdspain.net).

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, juvénile, Cruviers-Lascours, octobre 2011 (M. White).

CHN **Bécassine double** *Gallinago media*
Pyrénées-Orientales – Canet-en-Roussillon, étang de Canet : phot., 17 et 18 avril (Y. Dubois, P. J. Dubois, B. Delahaie *et al.*).
2010 Pyrénées-Orientales - Canet-en-Roussillon, les Prés de la Ville, phot., 27 et 28 avril (J.-C. Delattre, R. Baeta, C. Lelaure, E. Sansault, L. Sallé *et al*.).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* **(1/4)**
Gard – Le Cailar, mas d'Anglas : 4 ind., 27 décembre (G. Balança *et al.*).
Hivernant occasionnel. C'est seulement la deuxième donnée hivernale pour cette espèce depuis 2006. En cette saison, il est important d'exclure toute confusion avec le Chevalier culblanc T. ochropus *beaucoup plus régulier. Toute observation devrait donc être accompagnée d'une description du cri ou d'une photo. En l'absence de ces deux types de documents, seules les descriptions n'omettant aucun critère seront retenues.*

CHN **Mouette atricille** *Larus atricilla*
Hérault – Vic-la-Gardiole, étang de Pierre Blanche : ad., 3 mai (X. Rufray). **Pyrénées-Orientales –** Port-Vendres : ad., phot., 4 mai (M. Narcy).

Goéland argenté *Larus argentatus* **(1/1)**
Hérault – Villeveyrac, décharge : ad., phot., 19 janvier (B. Nabholz).
Hivernant peu commun à rare. Le Goéland argenté ne semble véritablement annuel que sur le site de la décharge de Villeveyrac. L'oiseau photographié le 19 janvier est de toute évidence le même adulte que celui observé le 29 décembre 2010 (P. Adriaens et al. in *Peignot 2010). Il appartient*

probablement à la sous-espèce d'Europe du Nord argentatus *(taille supérieure à* argenteus, *manteau plus sombre, zone noire moins étendue à l'extrémité des primaires).*

Goéland pontique *Larus cachinnans* **(1/1)**
Hérault – Villeveyrac, décharge : 1er hiver, phot., 23 mars (P. Gitenet).
Hivernant occasionnel. C'est seulement la troisième donnée homologuée depuis 2006 et une troisième pour le site de Villeveyrac. Le pontique est donc très rare mais également très délicat à identifier, posant souvent des problèmes aux spécialistes du genre eux-mêmes. Il est donc important de tout faire pour obtenir des documents photographiques exploitables lors d'une observation de ce goéland.

Macareux moine *Fratercula arctica* **(2/3)**
Pyrénées-Orientales – Port-Vendres, cap Béar : 6 mai (C. Peignot), 2 ind., 7 mai (C. Peignot & E. Roy).
Hivernant et migrateur peu commun mais régulier. Les deux observations de mai sont tout à fait classiques. Ce mois et ceux de juin et juillet fournissent en effet plus de la moitié des observations présentes dans la base de données du CHR (n=23). Les données hivernales représentent quant à elles près d'un quart du total. Le Macareux moine n'est plus soumis à homologation depuis le 1er janvier 2012.

Hibou des marais *Asio flammeus* **(3/3)**
Aude – Rodome : trouvé blessé, mort ensuite en centre de soins, phot., 13 décembre (C. Riols, J.-C. Austruy *et al.*). **Gard –** Le Grau-du-Roi, l'Espiguette : 13 mars (K. Schmale). **Pyrénées-Orientales –** Canet-en-Roussillon, étang de Canet : 14 avril (F. Communier *et al.*).
Hivernant et migrateur peu commun. Seulement trois données en 2011, c'est à peine mieux que 2010. Au printemps, les oiseaux sont souvent observés en migration active, en plein jour, sur les sites côtiers. En hiver, tous les secteurs de landes, de marais et de friches, de l'arrière-dune aux tourbières de montagne en passant par les milieux steppiques des grands causses peuvent lui convenir.

CHN **Martinet caffre** *Apus caffer*
Hérault – Lespignan, étang de la Matte : 26 juin (Y. Kayser, D. Clément).

Pic mar *Dendrocopos medius* **(1/1)**
Hérault – Ceilhes-et-Rocozels : phot., 8 août (F. Legendre).
Nicheur rare et localisé en Lozère, nicheur probable en très petit nombre (1 à 3 couples) dans l'Hérault. L'observation de Ceilhes-et-Rocozels constitue sans doute la première mention héraultaise de l'espèce qui est par ailleurs en expansion en France, profitant du vieillissement des grandes forêts de hêtres et de chênes et s'adaptant même à des boisements de taille plus modeste (Dubois et al. *2008).*

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* **(2/2)**
Gard – Beaucaire, les Vingt Clos : 20 décembre (C. Sabran) ; Vauvert, canal des Capettes : 19 décembre (P. Devoucoux).
Hivernant rare à occasionnel. L'année 2011 fournit à elle seule les deuxième et troisième données depuis 2006, toutes en provenance du département du Gard. Il est toujours aussi difficile de savoir si ce très faible nombre d'observations hivernales est dû à la rareté de l'espèce à cette période ou s'il est lié aux difficultés de détection du Torcol, particulièrement discret dès la fin du printemps.

Alouette calandre *Melanocorypha calandra* **(17/43)**
Aude – Gruissan, plage de la Mateille : 19 avril (F. Garcia) ; Leucate, Coussoules de la Franqui : ad. ?, 5 juillet (G. Olioso), lido : mâle ad., 8 mai (G. Olioso). **Gard –** Bezouce : 2 mâles ad., phot.,

du 22 au 25 mai (G. Monchaux *et al.*), 3 ind., 9 juin (G. Monchaux *et al.*), 2 mâles ad., du 11 au 13 juin (G. Monchaux *et al.*). **Hérault –** Aumelas, les Trois Pointes : 28 avril (P. Gitenet) ; Lespignan, étang de la Matte : 2 ind., 17 avril (C. Peignot, X. Rufray, V. Liebault & R. Jullian). **Pyrénées-Orientales –** Canet-en-Roussillon, étang de Canet : phot., 24 avril (P.-A. Crochet *et al.*) ; Opoul-Périllos, le Plat : 1er mai (G. Olioso) ; Perpignan, aéroport : 2 ind., 11 mai (Y. Aleman) ; Sainte-Léocadie : 10 ind., 26 avril (C. Peignot & E. Roy), 27 avril (C. Peignot) ; Salses-le-Château : 20 ind., 11 mai (Y. Aleman), 11 ind., 17 mai (Y. Aleman), 8 ind., 25 mai (Y. Aleman), 11 ind., 15 juin (Y. Aleman).
Migrateur prénuptial rare, nichait autrefois dans les cinq départements de la région. A niché en 2005 et 2006 sur le causse Méjean (Lozère), sans lendemains. Sans doute une des grandes satisfactions de l'année 2011. Plus de quarante oiseaux, c'est inespéré lorsqu'on se souvient que de 2006 à 2010 inclus l'effectif total ne dépassait pas sept individus (un seul oiseau en 2010 : L. Albesa in *Peignot* et al. *2011). Il est difficile de comprendre les raisons de cet afflux de calandres. Le cantonnement de deux mâles dans le Gard et surtout l'installation d'une petite population, estimée à six couples nicheurs, dans les Pyrénées-Orientales n'en est pas moins historique : la dernière mention d'une reproduction probable dans ce département remonte en effet à 1970 (Marsal* in litt.*).*

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* **(7/10)**
Gard – Jonquières-Saint-Vincent, Biscarrat : phot., 25 mai (P. Devoucoux). **Hérault –** Lansargues, Tartuguière : du 22 au 30 avril (F. Garcia) ; Lattes, Maison de la Nature : 11 mai (D. Perrot). **Lozère –** Hures-la-Parade, aérodrome de Chanet : 5 ind., 19 avril (F. Legendre), 9 mai (F. Legendre) ; Sainte-Énimie, le Brugeas : 6 mai (F. Legendre) ; Vébron, serre de Fourcat : 30 août (F. Legendre).
Nicheur peu commun et localisé dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, migrateur prénuptial rare dans le Gard, l'Hérault et la Lozère (où elle niche occasionnellement). Comme pour l'Alouette calandre, l'année 2011 semble avoir été remarquablement bonne pour la calandrelle (pour comparaison, deux données seulement en 2010). Aucune reproduction n'a pu toutefois être constatée dans les trois départements où l'espèce est soumise à homologation.

Cochevis de Thékla *Galerida theklae*, Aumelas, mars 2011 (P. Gitenet).

Cochevis de Thékla *Galerida theklae* **(1/1)**
Hérault – Aumelas, causse : phot., 29 mars (P. Gitenet).
Nicheur très localisé dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, exceptionnel hors de ces deux départements. Il s'agit probablement de la découverte de l'année. L'espèce n'avait en effet jamais été observée en dehors de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Un seul individu a pu être photographié mais l'observateur signale jusqu'à trois Thékla ensemble. S'agit-il d'oiseaux en mouvement ou du reliquat d'une population plus ancienne qui aurait toujours existé sur le causse d'Aumelas ?

Pipit de Richard *Anthus richardi* **(2/3)**
Gard – Rodilhan, le Grand Grès : 1er hiver, phot., 17 décembre (P. Bessède, F. Burst *et al*.). **Lozère** – Fraissinet-de-Fourques, le Ségala : 2 ind., 26 septembre (F. Legendre).
Migrateur rare (printemps et automne) hivernant occasionnellement. Deux nouvelles localités bien distinctes des sites habituels où est traditionnellement vue l'espèce suggèrent que le Pipit de Richard est très probablement sous-détecté tant les milieux qu'il est susceptible de fréquenter sont assez répandus dans la région : friches, jachères, prés humides et non uniquement les steppes herbeuses rases.

Pipit de Richard *Anthus richardi*, 1er hiver, Rodilhan, décembre 2011 (F. Burst). Notez la présence de deux moyennes couvertures muées au milieu des autres de type juvéniles, ce qui indique un oiseau né en 2011.

CHN **Bergeronnette citrine** *Motacilla citreola*
2009 Pyrénées-Orientales – Canet-en-Roussillon, étang de Canet : 1er hiver, 11 septembre (Y. Dubois).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* **(3/4)**
Gard – Aigues-Mortes : 2 mâles ad., 13 mars (K. Schmale) ; Nîmes, mas Peyron : mâle ad., 18 juin (Y. Ponthieux). **Hérault –** Ceilhes-et-Rocozels : mâle ad., 10 mars (F. Legendre).
Migrateur rare (surtout détecté au printemps, en particulier au mois de mars dans les grandes bandes de Bergeronnettes grises M. alba alba *migratrices). Après un très bon cru en 2010, retour à la normale pour cette espèce. La donnée nîmoise du 18 juin est étonnante et suggère que certains*

oiseaux peuvent être observés en plein été et s'apparier à l'occasion avec des Bergeronnettes grises de la sous-espèce type, comme ce fut le cas en 1996 dans le Doubs (Michelat et al. 1999). Il est donc essentiel de fournir une description la plus précise possible afin d'écarter la possibilité d'oiseaux mélaniques ou aberrants.

CHN **Robin à flancs roux** *Tarsiger cyanurus*
Aude – Leucate, la Franqui : mâle ad., phot., 31 octobre (T. Guillosson *et al*.).

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* **(1/1)**
Lozère – Les Bondons : fem., phot., 26 et 27 décembre (V. Lhermet *et al*.).
Hivernant occasionnel. La persévérance de l'observateur et les excellentes photos transmises au comité ont permis de valider ce qui constitue a priori le premier cas de présence hivernale de l'espèce dans notre région.

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*, juvénile, Canet-en-Roussillon, août 2011 (F. Communier). Le croupion rayé est parfois plus facile à voir sur un oiseau fuyant l'observateur. C'est un bien meilleur critère à noter sur le terrain que la raie sommitale jaune qui peut paraître bien marquée chez les juvéniles de Phragmite des joncs *A. schoenobaenus* à cette période. Notez aussi les lores pâles (sombres chez le Phragmite des joncs) et la coloration plus pâle de l'oiseau.

CHN **Traquet du désert** *Oenanthe deserti*
Aude – Gruissan, salins : mâle 1er hiver, phot., du 8 au 12 novembre (T. Guillosson, M. Boch *et al*.).

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* **(3/9)**
Hérault – Lespignan, étang de la Matte : 7 ad. (dont 2 capturés), phot., 17 avril (C. Peignot, G. Balança, X. Rufray, B. Vollot *et al*.). **Pyrénées-Orientales –** Canet-en-Roussillon, étang de Canet : mâle ad., 16 avril (F. Communier *et al*.), Nouveau Réart : juv., capt., phot., 19 août (F. Communier, L. Courmont *et al*.).
2010 Hérault – Lespignan, étang de la Matte : 21 avril (F. Garcia).
Migrateur prénuptial et postnuptial rare. Suite à la redécouverte en avril 2010 à l'étang de la Matte d'un petit stationnement de Phragmites aquatiques en halte migratoire (P.-A. Crochet et al. in

Peignot et al. *2011), une opération de baguage a été menée, permettant l'observation de sept oiseaux, dont deux ont été capturés et bagués. A l'étang de Canet, à cette même période, un autre oiseau fréquentait le même milieu mixte constitué de scirpaies basses et de petites phragmitaies. On savait déjà que quelques aquatiques passaient par ces étangs lors de leur toute première migration (la donnée du 19 août en est l'illustration) mais le passage prénuptial était jusqu'à ce jour très mal estimé, voire mal connu.*

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina **(5/10)**
Aude – Leucate, lido : 2 mâles ad., 21 mai (F. Garcia), 4 mâles ad., 22 mai (F. Garcia), la Corrège : 2 mâles ad., 22 mai (F. Garcia). **Hérault –** Vic-la-Gardiole, plage des Aresquiers : mâle ad., vid., 25 mai (C. Peignot) ; Villeneuve-lès-Maguelone, salins : 24 avril (M. Siol).
Migrateur peu commun à rare. La donnée de Villeneuve-lès-Maguelone fournit une date précoce, sans être extraordinaire. Une fois de plus, la majorité des observations est concentrée après la première décade du mois de mai (et même après la deuxième décade cette année).

Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata* **(11/15)**
Aude – La Palme, les Cortals : 3 ind. (dont 2 mâles), 18 avril (F. Garcia) ; Leucate, lido : mâle ad., 22 mai (F. Garcia), plateau de Leucate : fem., 21 mai (F. Garcia). **Gard –** Le Grau-du-Roi, étang des Baronnets : mâle ad., 7 août (J.-P. Trouillas). **Hérault –** Montbazin, colline des Trois Frères : mâle ad., 18 avril (P. Gitenet), 1 couple, 25 avril (P. Gitenet), 1 couple et 3 poussins, du 25 mai au 27 juin (P. Gitenet). **Pyrénées-Orientales** – Opoul, la Ginévrède : mâle ad., 6 mai (C. Peignot), le Champ de l'Auque : mâle ad., 1er mai (G. Olioso), les Cabanots : mâle, phot., 28 avril (J. Piette & T. Tancrez) ; Saillagouse, Bailladouse : mâle ad., enr., 9 mai (E. Roy).
Nicheur localisé peu commun à rare. Les prospections effectuées dans le cadre de l'Atlas des oiseaux nicheurs de France ont permis de trouver un maximum de Fauvette à lunettes cette année. Mais l'effectif total reste vraiment faible et, même sur les bastions connus de l'espèce (plateau de Leucate, crêtes d'Opoul-Périllos, Cerdagne), les effectifs ne dépassent jamais quelques couples.

Fauvette de Moltoni *Sylvia moltonii*, mâle de 1er été, Leucate, avril 2011 (T. Galewski). La teinte vieux rose du dessous est une caractéristique de cette espèce. Noter aussi que cette teinte est très uniforme, s'étendant de la poitrine

jusqu'au bas-ventre et non estompée à partir du ventre comme chez la sous-espèce type. La teinte gris bleutée (et non brunâtre) de la calotte indique un mâle.

Fauvette de Moltoni *Sylvia moltonii* **(6/7)**
Aude – Gruissan, plage de la Mateille : 2 mai (F. Garcia) ; Leucate, lido : fem., 8 mai (G. Olioso), mâle ad., 10 mai (T. Guillosson), lido : mâle de 2e année, 24 avril (P.-A. Crochet, T. Galewski *et al*.). **Hérault –** Villeneuve-lès-Maguelone, lido de Pierre Blanche : mâle, 21 avril (F. Garcia). **Pyrénées-Orientales –** Le Barcarès, Port-Barcarès : 1 mâle et 1 fem., 10 mai (T. Guillosson).
Migrateur peu commun à rare. Difficile de se faire une idée du statut de cette espèce naguère encore méconnue de la plupart des observateurs. Elle pourrait n'être pas si rare, son observation dépendant sans doute de conditions météorologiques particulières (forts vents d'est autour de la dernière décade d'avril et de la première de mai.

Fauvette babillarde *Sylvia curruca* **(1/1)**
Aude – Gruissan, île Saint-Martin : 2 ind., 3 mai (F. Garcia).
Migrateur prénuptial et postnuptial rare. Une seule donnée en 2011, cela illustre bien la grande rareté de cette fauvette dans notre région. Attention à la confusion avec la Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala*, à laquelle on ne pense pas forcément.*

CHN Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*
Individus acceptés comme Mésange à longue queue « à tête blanche »
Gard – Arre, Rieusset : 5 ind., 7 janvier (A. Laurent) ; Aumessas, ruisseau d'Albagne : 3 ind., 10 et 11 février (A. Laurent).

Pie-grièche à tête rousse ssp *badius* *Lanius senator badius* **(3/3)**
Aude – Fleury-d'Aude, les Charruès : mâle, 20 avril (F. Garcia) ; Leucate, Coussoules de la Franqui : 1er hiver, 26 août (G. Olioso). **Pyrénées-Orientales –** Saint-Nazaire, Nouveau Réart : phot., 6 mai (C. Peignot).
Migrateur peu commun à rare. Les deux données printanières sont tout à fait classiques mais celle du 26 août est inédite, d'autant qu'elle concerne un jeune oiseau dont on peut se demander s'il est né sur le continent ou dans les îles méditerranéennes où niche exclusivement cette sous-espèce (Corse, Sardaigne, îles Baléares).

Corbeau freux *Corvus frugilegus* **(1/1)**
Aude – Gruissan, roc de Conilhac : 8 novembre (T. Guillosson *et al*.).
Nicheur localisé dans le Gard et l'Hérault. Rare dans l'Aude, occasionnel dans les Pyrénées-Orientales et la Lozère. Une nouvelle donnée pour le secteur de Gruissan, à nouveau d'un oiseau en migration. L'espèce semble poursuivre sa progression vers le sud du département de l'Hérault où une petite colonie est découverte à Balaruc-les-Bains en 2012 (M. Duquet in litt.*). Dans le département de l'Aude où le freux était rare il y a peu de temps encore, les contacts semblent devenir annuels.*

Corneille mantelée *Corvus cornix* **(2/2)**
Gard – Le Cailar, les Clapières : phot., du 26 février au 4 mars (J.-P. Trouillas) ; Rochegude, la Condamine : 14 janvier (L. Iparraguirre).
Hivernant rare, erratique occasionnel. La Corneille mantelée est vue tous les ans dans l'est de notre région, mais ces observations ne concernent à chaque fois qu'un ou deux individus au maximum. Il n'a pas été possible d'exclure un hybride avec la Corneille noire C. corone *dans le cas de la donnée de Rochegude. Rappelons que ces dernières années, les hybrides* C. cornix *x* C. corone *semblent quasiment aussi fréquents que les mantelées pures (Dubois* et al. *2008). Il est donc nécessaire de prendre le temps d'observer correctement toute corneille grise et noire avant de l'identifier formellement. Rappelons qu'une note traitant des critères à observer en priorité est disponible sur le site du CHR à la rubrique* Rapports d'homologation, articles et notes.

Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* **(5/5)**
Aude – Gruissan, plage : 29 novembre (F. Berthet) ; Villeneuve-les-Corbières : mâle ad., 7 décembre (G. Olioso), 2 ind., 15 décembre (G. Olioso *et al.*). **Hérault –** Portiragnes, lagunage : 30 mars (C. Peignot). **Lozère –** Hures-la-Parade : phot., 18 juillet (M. van der Tol).
Nicheur rare et très localisé dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Erratique rare ailleurs. Les cinq données homologuées en 2011 illustrent bien le statut de l'Étourneau unicolore dans la région : hors des sites où sa nidification est connue, il est vraiment très rare. Les observations de Villeneuve-les-Corbières sont plus intéressantes car elles concernent au moins un mâle chanteur.

Étourneau unicolore *Sturnus unicolor*, Hures-la-Parade, juillet 2011 (M. van der Tol).

CHN **Étourneau roselin** *Sturnus roseus*
Aude – Carcassonne : ad., 18 février (F. Fournié).

Sizerin flammé *Carduelis flammea* **(2/3)**
Gard – Alzon : 2 ind., 6 décembre (A. Laurent), 7 décembre (A. Laurent).
Hivernant rare à occasionnel. Ces deux premières données homologuées de Sizerins flammés concernent deux oiseaux vus et entendus en migration active. La localité de découverte n'est pas vraiment une surprise. L'espèce est probablement légèrement sous-détectée dans les ripisylves et les forêts situées au sud du Massif central.

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* **(6/7)**
Aude – Gruissan, salins : phot., 4 décembre (D. Clément, J.-M. Toublanc *et al.*), 3 ind. (dont 2 mâles de 1er hiver), phot., 5 décembre (R. Sabatier). **Gard –** Aigues-Mortes, remparts : phot., 27 décembre (A. Vernet), salins : phot., 25 novembre (C. Savon) ; Le Grau-du-Roi, l'Espiguette : mâle, phot., 3 février (F. Jourdain). **Lozère –** Hures-la-Parade, la Croix du Villaret : fem., phot., 12 janvier (B. Descaves).

Hivernant rare. Jusqu'à présent, seules deux données homologuées figuraient dans la base du CHR. L'année 2011 est donc exceptionnelle en termes de nombre d'oiseaux et de départements concernés. La donnée de Hures-la-Parade constitue la première mention de l'espèce sur le causse Méjean : toutes les données lozériennes précédentes proviennent du mont Lozère (sauf une donnée du lac de Naussac). Sur le littoral, ce sont les salins (et les arrière-dunes) qui semblent attirer l'espèce.

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*, Aigues-Mortes, novembre 2011 (C. Savon).

Annexe 1 : espèces introduites ayant fait souche (catégorie C)

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* **(2/2)**
Pyrénées-Orientales – Le Barcarès, lagunage : fem., du 23 au 30 octobre (G. Barthes *et al.*), 2 fem., phot., 20 novembre (E. & G. Barthes).
Hivernant rare (une seule donnée au printemps). Depuis 2006, l'espèce n'a été observée que dans deux départements : l'Hérault et les Pyrénées-Orientales.

Perruche à collier *Psittacula krameri* **(8/18)**
Hérault – Castelnau-le-Lez : 21 juin (C. Peignot), le Prado : 2 ind., 1er septembre (C. Peignot) ; Lattes : 1er juillet (P. Geniez) ; Le Crès, centre commercial Hyper U : 2 ind., 8 septembre (P. Geniez) ; Montpellier, cimetière Saint-Lazare : 4 novembre (C. Peignot), esplanade Charles de Gaulle : 2 ind., 9 décembre 2011 (C. Peignot), parc Rimbaud : 9 ind., 26 novembre (C. Peignot). **Pyrénées-Orientales –** Banyuls-sur-Mer, village : du 25 au 26 juillet (N. Martinez).
Nicheur rare et très localisé. Les données collectées dans le cadre de l'homologation régionale de cette espèce ont permis de montrer qu'elle niche dans l'agglomération montpelliéraine (en particulier le long du Lez de Lattes à Castelnau-le-Lez) et très probablement à Banyuls-sur-Mer et à Sète. La Perruche à collier n'est plus soumise à homologation depuis le 1er janvier 2012 mais il paraît important de noter tous les oiseaux observés sur le portail Faune-LR.

Annexe 3 : espèces dont l'origine est probablement captive (catégorie E)

Bernache nonnette *Branta leucopsis* **(1/1)**
Aude – Bram : phot., 15 janvier (B. Wallemme).
Hivernant occasionnel/échappé de captivité peu commun à rare. La date est cohérente pour un oiseau sauvage mais le comportement et la proximité d'un des plus grands élevages de canards exotiques de la région indiquent très probablement un échappé de captivité.

CHN **Sarcelle à ailes vertes** *Anas carolinensis*
Gard – Vauvert : mâle, phot., 18 et 19 décembre (P. Devoucoux).

CHN **Marabout d'Afrique** *Leptoptilos crumenifer*
Gard – Poulx, camp militaire du Grand Chêne, ad. phot., 13 et 14 octobre 2010 (C. Sabran *et al.*) ; Beaucaire, île du Pilet, ad., 7 septembre 2009 (C. Sabran *et al.*).

Calopsitte élégante *Nymphicus hollandicus* **(1/1)**
Gard – Vauvert, village : fem./imm., phot., 1er août (M. White).
Occasionnel. Difficile de savoir si cette Perruche est en expansion ou pas à l'heure actuelle. Les données peuvent concerner des oiseaux échappés d'une cage voisine ou bien des individus ayant réussi à s'acclimater. Aucun cas de reproduction en nature n'est avéré pour l'instant en Languedoc-Roussillon

Annexe 4 : données non homologuées

CHN **2009 Vautour de Rüppell** *Gyps rueppellii* **– Lozère** : Florac, causse Méjean, le Pradal, imm., 12 septembre.

CHN **Busard pâle** *Circus macrourus* **– Hérault :** Lespignan, étang de la Matte, 1er été, 17 avril. **Lozère** : Le Collet-de-Dèze, 20 août.

Goéland marin *Larus marinus* **– Pyrénées-Orientales** : Port-Vendres, cap Béar, 2e ou 3e hiver, 11 février (la description est particulièrement honnête mais la taille n'est pas un caractère suffisant pour identifier positivement un Goéland marin au milieu de leucophées *L. michahellis*. Rappelons que l'espèce est tout à fait occasionnelle dans notre région où elle ne s'observe probablement qu'une ou deux fois par décade).

Hibou des marais *Asio flammeus* **– Gard** : Aubord, le Mas de Talen, 2 ind., 13 avril (pas d'éléments permettant d'éliminer totalement des Hiboux moyens-ducs *A. otus* : ni le motif de la face, ni celui de la queue, ni le dessin de la pointe des primaires n'ont pu être notés, par exemple) ; Beauvoisin, mas Nouguier, 11 avril (là encore, pas assez d'éléments pour éliminer totalement une confusion avec le Hibou moyen-duc ; en particulier, rien n'est dit sur le dessin de la pointe des primaires, ou sur la présence caractéristique de noir autour des yeux alors que la face de l'oiseau a été observée). **Hérault** : Agde, réserve naturelle du Bagnas, 19 janvier (oiseau observé trop brièvement aux jumelles pour pouvoir écarter un Hibou moyen-duc).

Martinet pâle *Apus pallidus* **– Hérault** : Lodève, 4 avril (des éléments font effectivement penser à *A. pallidus* mais la description manque de précision, en particulier sur le contraste clair-sombre présent sur les parties supérieures).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* **– Aude** : Port-la-Nouvelle, phot., 25 février (en l'absence de description, la photo ne permet pas de trancher en faveur de l'une ou de l'autre sous-espèce). **Gard** : Le Cailar, mas d'Anglas, 15 mars (le motif et l'étendue du croupion ne sont pas précisés).

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* **– Aude** : Leucate, lido, ad., 22 mai (des éléments évoquent effectivement une verderolle mais l'observation est bien trop brève pour une espèce aussi occasionnelle dont on ne possède à ce jour aucune donnée homologuée).

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* **– Hérault** : Lespignan, étang de la Matte, ad., 20 avril (oiseau seulement entendu et description du chant manquant de précision).

2010 Hérault : Mireval, étang du Boulas, 2 mai (observation trop brève et description identique à une autre description décrivant pourtant un autre oiseau sur un autre site).
Hypolaïs ictérine *Hippolais icterina* – **Aude** : Port-la-Nouvelle, mâle ad., 14 mai (description bien trop succincte pour une espèce si délicate à distinguer de l'Hypolaïs polyglotte ; le chant est noté mais pas décrit).

Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata* – **Aude** : Leucate, Coussoules de la Franqui, 25 avril (oiseau vu trop brièvement pour assurer l'identification même si tout ce qui a été noté va dans le sens d'une Fauvette à lunettes).

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* – **Hérault** : Villeneuve-lès-Maguelone, l'Estagnol, 5 octobre (même si le cri est soigneusement décrit, il paraît difficile d'homologuer une espèce aussi rare sans aucun critère de plumage).

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* – **Aude** : Port-la-Nouvelle, 30 avril (il paraît difficile d'identifier avec certitude cette espèce en se fondant uniquement sur le chant. Ici très peu de critères de plumage ont pu être notés, l'oiseau demeurant caché dans le feuillage. L'existence de chanteurs hybrides de Pouillot véloce *P. collybita* est avérée et complique sérieusement l'identification sonore hors de la zone de répartition du Pouillot ibérique).

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* – **Hérault** : Combes, 20 décembre (l'oiseau n'a pas été assez bien vu pour éliminer la Pie-grièche méridionale qui peut très bien hiverner en altitude, comme c'est le cas en Lozère).

Pie-grièche à tête rousse ssp *badius* *Lanius senator badius* – **Hérault** : Lespignan, étang de la Matte, 30 avril (oiseau vu trop peu de temps posé et observé à une distance trop lointaine pour qu'il soit possible de s'assurer de l'absence de tache blanche à la base des primaires).

Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* – **2008 Hérault** : Aumelas, mas Barral, 12 juin (plusieurs éléments vont bien dans le sens de l'unicolore mais la description, de l'aveu même de l'observateur, n'est pas assez détaillée).

Remerciements

Le CHR-LR remercie tous les observateurs qui ont envoyé leurs fiches, dessins, photos ou vidéos. Benjamin Adam, Yves Aleman, Jean-Claude Austruy, Gérard Barthes, Alice Bonot, Christian Riols, Philippe Geniez, Pierre Gitenet, Geoffrey Monchaux, Emmanuel Rousseau et Jean-Claude Tocabens sont particulièrement remerciés pour les informations complémentaires, les remarques et les précisions qu'ils ont apportées concernant certaines observations.

Bibliographie

De Seynes A. et les coordinateurs espèces (2011). Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2010. *Ornithos* 18-3, p. 155-156.
Dubois P. J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P. (2008). *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé. Paris.
Michelat D. (1999). Observations d'espèces rares en Franche-Comté. 13ème rapport du Comité d'Homologation Régional. *Falco* 31, p. 107-117.
Peignot C. & le CHR-LR (2009). Les oiseaux rares en Languedoc-Roussillon en 2006-2007. 1er rapport du Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon
Peignot C. & le CHR-LR (2010). Les oiseaux rares en Languedoc-Roussillon en 2008-2009. 2e rapport du Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon.
Peignot C. & le CHR-LR (2011). Les oiseaux rares en Languedoc-Roussillon en 2010. 3e rapport du Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon
Reeber S. & le CHN (2012). Les oiseaux rares en France en 2011. 29e rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 18-6, p. 353-395.

Référence bibliographique : Peignot C. & le CHR-LR (2013). Les oiseaux rares en Languedoc-Roussillon en 2011. 4e rapport du Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon.