



# LES OISEAUX RARES EN 2019 DANS LE MAINE (MAYENNE et SARTHE)

-  
12<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation du Maine



Grand gravelot et Bécasseau tacheté, Saint Loup du Gast, (Mayenne), 10 octobre, (Eric Médard).

## **BRUNO DUCHENNE et le CH MAINE.**

Regroupant les départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé sous l'égide de quatre associations locales : Mayenne-Nature-Environnement (MNE), le Groupe Sarthois Ornithologique (GSO), la LPO Sarthe et le Groupe Ornithologique des Avaloirs (GOA).

Ce comité a pour objet de centraliser, valider et publier, sous le nom de leurs auteurs, les données circonstanciées d'espèces d'oiseaux d'occurrence inhabituelle dans le Maine, soit par leur degré de rareté, de difficulté d'identification ou leur phénologie atypique (et qui ne font pas partie des espèces soumises à homologation nationale). Il permet de préciser leur statut à l'échelle régionale.

Ce douzième rapport du CH Maine couvre l'année 2019, 12<sup>ème</sup> année de son fonctionnement. Les membres du Comité ont été invités à examiner 8 fiches (dont une pour 2018) concernant des données d'espèces homologables et procédé à l'examen de 44 données (concernant 75 observations), candidates à la validation directe sur photos, enregistrement sonore et ou description en partie remarque de la donnée via l'interface Faune Maine. Le taux de validation atteint 97%.

La classification suit la « Liste officielle des oiseaux de France - version 2020 » établie par la CAF (Commission de l'Avifaune Française, Ornithos 27-3, n° 143, mai - juin 2020).

En 2019, le CH Maine était composé des 6 membres suivants : Benoit Duchenne, Bruno Duchenne (secrétaire), François Duchenne, Jean-Luc Reuzé (secrétaire adjoint), Frédéric Vaidie, et François-Marie Bouton.

Pour l'année 2020 pas de départ le CH Maine fonctionne donc avec les 6 mêmes membres.

La réunion plénière de 2020 n'a pu se tenir pour raison sanitaire (covid 19), mais un nouveau règlement a été acté et validé par l'ensemble des associations fondatrice et les membres du CH Maine (il est à consulter [ici](#)).

La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur sont disponibles sur le site Faune Maine ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

Les fiches d'homologation doivent être adressées à :

Bruno Duchenne / Secrétaire du CH Maine, 58 rue du Villaret, 72000 LE MANS


Adresse mail: [duchenne.bruno@orange.fr](mailto:duchenne.bruno@orange.fr)

### **QUELQUES FAITS MARQUANTS**

Le début et la fin d'année 2019 contrairement à 2017 et 2018 n'a pas été marqué par un afflux de passereaux du nord (aucune donnée de Sizerin notée sur cette période).

Par contre la Mayenne a enregistré ses deuxième et troisième données récentes de Bruant Ortolan. A noter aussi la deuxième donnée d'un Goéland à ailes blanches en Sarthe (Lac des Varennes) et les, douzième et treizième données pour la Mayenne (Lac de Haute Mayenne). Aussi la septième donnée pour le Bécasseau tacheté de nouveau en Mayenne (Saint Loup du Gast) ou il a séjourné cinq jours, et de nouveau un long séjour (16 décembre 2019 au 5 février 2020) en Sarthe (La Ferté Bernard) d'un Plongeon imbrin. En parlant de long séjour il faut noter ceux effectués par six Hiboux des marais, trois en Sarthe (Parcé) du 24 janvier au 1<sup>er</sup> avril et trois en Mayenne (Ballots) 29 janvier au 29 mars. Pour la troisième fois en quatre ans en Sarthe (La Flèche), deux Macreuses brunes y ont effectué un court séjour. Pour les espèces CHN seule une Oie à bec court a effectué une brève escale en Sarthe (Cherré), c'est la troisième donnée sarthoise, -(cette donnée n'est pas encore validée par le CHN elle n'apparaît donc pas sur ce rapport).

Le graphique ci-dessous illustre la phénologie de découverte des espèces rares en Mayenne et Sarthe depuis la création du CH Maine (2008). Le printemps étant la meilleure période pour l'observation d'espèces rares. Les données printanières et automnales comportent beaucoup d'observations de limicoles, alors que les données hivernales concernent principalement des anatidés et laridés.



### LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (catégories A & C)

Les données sont présentées de la manière suivante :

- 1- Noms français et scientifique.
- 2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués depuis 2008, (date de création du CH Maine), 2019 exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués pour 2019.
- 3- La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique après les points précédents.
- 4- Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
- 5- Commune, lieu-dit, effectif (se réfère à un individu s'il n'est pas précisé), âge et sexe si connus.
- 6- Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur agréé.
- 7- Date(s) d'observation(s).
- 8- Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
- 9- Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique.
- 10- La séquence taxonomique est celle de la liste officielle des oiseaux de France - version 2020 (CAF).
- 11- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
- 12- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature.

### OIE RIEUSE *Anser albifrons* (13/66 - 1/2)



Se reproduit au nord de la Russie, de la péninsule de Kanin à la rivière Kolyma. Hivernent principalement au nord-est de la France, plus rarement ailleurs.

**Sarthe** – Fillé-sur-Sarthe, 2 ind., 3 novembre, phot., (Christian Kerihuel).

6<sup>ème</sup> données sarthoises depuis la création du CH Maine à une date conforme au pattern d'apparition de l'espèce qui n'avait pas été observée dans le Maine depuis 2016.



Oie rieuse, Fillé (Sarthe), 3 novembre, (Christian Kerihuel).



Ces deux graphiques illustrent les dates de découverte et la répartition par département (9 données pour la Mayenne et 7 données pour la Sarthe) depuis la création du CH Maine (2008)

### FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (10/10 - 1/1)

Niche des Balkans et de l'Europe centrale jusqu'à l'Asie centrale, occasionnellement plus à l'ouest.

**Espèce homologable uniquement en Mayenne.**

**Mayenne** – Mézangers, 1 ind. fem., 22 décembre 2018 au 20 février 2019, phot., (Georges Deslais *et al.*) déjà noté sur le rapport précédent.

Pour mémoire – **Sarthe** – 8 observations sur les sites habituels de Fillé-sur-Sarthe, Spay et La Flèche. (collectif [www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

Migrateur et hivernant rare. Fréquente tout type de plan d'eau, surtout étangs avec végétation bien développée.

**FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila* (4/5 - 0/0)**

*Niche en Islande, et de la Scandinavie au nord de la Russie, jusqu'au fleuve Léna, à l'est.*

**Espèce homologable uniquement en Sarthe.**

**Sarthe** – Pas de donnée

Pour mémoire – Mayenne – 2 données une à Mézangers les 9 et 11 février (Antoine Lefloch) pour trois individus et une à Aron du 12 avril au 5 mai (David Madiot) pour 1 individu.

Migrateur et hivernant peu commun. Fréquente surtout les rivages marins abrités, mais aussi les plans d'eau intérieurs.

**MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca* (2/5 - 1/2)**

*Scandinavie, nord de la Russie et de la Sibérie.*

**Sarthe** – La Flèche, 2 ind. de type femelle, 2 et 3 décembre, phot., (Christiane et Bernard Bazoge, Christian Kerihuel).

3<sup>ème</sup> donnée depuis la création du CH Maine, les dernières données dataient du 14/12/2007 pour la Mayenne et du 14/01/2006 pour la Sarthe.



Macreuses brunes, La Flèche (Sarthe), 3 décembre, (Christian Kerihuel).

**HARLE PIETTE *Mergellus albellus* (19/33 - 1/1)**

*Espèce monotypique qui niche de la Suède à la Sibérie orientale ; hivernant peu commun qui fréquente essentiellement lacs, plans d'eau, rivières et fleuves.*

**Sarthe** – Spay, 1 ind. type fem., 2 et 3 décembre, phot., (Christian Kerihuel, Bruno Duchenne).

Cette espèce n'avait pas été notée dans le Maine depuis 2015 en Mayenne et 2013 en Sarthe, faute aux hivers doux de ces dernières années.



Harle piette, Spay (Sarthe), 2 décembre, (Christian Kerihuel).

**PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (5/5 - 1/1)**



*Niche au nord de l'Amérique du Nord et en Islande.*

**Sarthe** – La Ferté Bernard, 1 ind. de 1<sup>ère</sup> année, 16 décembre 2019 au 05 février 2020, phot., (Jean François Blanc et *al.*).

4<sup>ème</sup> donnée sarthoise depuis la création du CH Maine (2008), après celles de 2012, 2014 et 2016, à une période classique d'apparition de cet oiseau, hivernant peu commun le long des côtes et également à l'intérieur des terres, sur étangs, lacs, grands réservoirs et parfois sur le cours des fleuves.



Plongeon Imbrin, La Ferté Bernard (Sarthe), 21 janvier 2020 , (Virgile Fuchs).



Deux fois plus de donnée en Sarthe qu'en Mayenne, il semble préférer les anciennes gravières sarthoise plus profondes que les étangs mayennais).

**BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* (11/27 - 1/4)**

Niche en roselières, en Europe et jusqu'en Russie, au sud de 60° N. Les populations d'Europe de l'ouest sont partiellement migratrices. Celles d'Europe de l'est et de Russie, hivernent au Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen et en Afrique.

**Espèce homologable en dehors des sites de nidification connus en Sarthe.**

Pour mémoire, Sarthe – La Flèche, un couple avec une nouvelle nidification avérée, un jeune vu le 8 aout, deux mâles ont été observé en début de saison. (Christiane et Bernard Basoge).





Blongios nain, La Flèche (Sarthe), 20 juin 2019 , (Antoine Muriani).

**CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus* (12/12 – 1/1)**

Niche dans la moitié sud de la France, le sud de l'Europe, l'Afrique du nord, la Turquie, et de la Pologne à la Sibérie centrale et en Inde.

**Sarthe – Vaas, 1 ind., 31 mai, phot., (Ronan Le Bohec).**

Nicheur et migrateur peu commun nouvelle donnée pour le sud Sarthe où il est observé chaque année depuis 2015. Une seule donnée pour la Mayenne depuis 2008 (voir graphique ci-dessous)



### PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (3/13 - 0/0)

Niche de l'Écosse et des Pyrénées espagnoles jusqu'au sud-est de la Russie, à la Mongolie et en Sibérie orientale. Hiverné du Maghreb à l'Iran. Noté localement, mais irrégulièrement et en petit nombre entre l'Andalousie et Chypre.

**Espèce homologable hors des plaines du nord et du sud Sarthe.**

Comme en 2018, aucune donnée en 2019.

### BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (13/61 - 2/22)

Nord de la Scandinavie, Russie d'Europe jusqu'à l'Éniseï.

**Sarthe** – Mamers, 21 ind., 26 avril, phot., (Etienne Ville)

**Mayenne et Sarthe** – Vol migratoire, 1 ind. fem., le 8 mai et le 20 août, donnée satellitaire, - (par Lionel Manceau)

Sensiblement le même trajet pré et post nuptial pour cette femelle qui a traversé Mayenne et Sarthe à consulter [ici](http://ici) et sur la base Faune Maine [www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org).

Donnée satellite. Migration pré et post nuptiale de cette femelle baptisée Ancamona (baguée N2PRNG le 3 avril 2019 à Saint Ratum, Bijagós, Archipelago, Guinée-Bissau). Individu qui hiverné en Guinée-Bissau et qui niche en république de Sakha en Russie (Anabarsky District, 72°31'15.5"N – 118°26'52.7"E ; 72°,520978 N – 118°,447971 E)

### BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (15/28 – 1/1)

Extrême nord de la Sibérie centrale.



**Sarthe** – La Ferté Bernard, 1 ind. de 1<sup>ère</sup> année, du 3 au 10 septembre, (Fabrice Jallu et al)

Il n'avait pas été observé dans le Maine depuis 2016.



Bécasseau cocorli  
, La Ferté Bernard  
(Sarthe),  
5 septembre,  
(Virgile Fuchs).

© Virgile Fuchs



Le Bécasseau cocorli peut être observé aux deux passages migratoires comme le montre ces graphiques.

**BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (26/42- 3/5)**

*Arctique: Sibérie, nord-est du Canada et du Groenland.*

**Sarthe** – La Ferté Bernard, 2 ind. les 11 et 12 mai, phot., (Virgile Fuchs).

– Parcé sur Sarthe, 2 ind., 11 mai, phot., (Eric Lapous, Jean François Darras).



– Marçon, 1 ind., 12 mai, phot., (Arnaud Cornilleau)

Trois nouvelles données à des dates classiques, toutes en migration prénuptiale et en Sarthe.



Bécasseau sanderling, La Ferté Bernad (Sarthe), 11 mai, (Virgile Fuchs).

Bécasseau sanderling avec un variable, Marçon (Sarthe), 12 mai, (Arnaud Cornilleau).





Comme le montre ces deux graphiques il est beaucoup plus rare au passage postnuptial seulement 5 données contre 30 en prénuptial depuis 2008).

### BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos* (3/3 - 1/1)

Arctique nord américain et Sibérie, à l'ouest jusqu'à la péninsule de Yamal. Ecosse 2004.

**Mayenne** – Saint Loup du Gast, 1 ind., du 10 au 15 octobre, phot., (Eric Médard, David Quinton).

Une nouvelle donnée Mayennaise de ce limicole surtout nord-américain, qui fréquente aussi les plans d'eau à l'intérieur des terres, à une date se situant juste après le pic de passage postnuptial (mi-septembre).



Grand gravelot et Bécasseau tacheté, Saint Loup du Gast, (Mayenne), 10 octobre, (Eric Médard).

### GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoïdes* (11/12 - 3/3)



Polytypique. *Larus. g. glaucoïdes* niche au Groënland. Hivernant néarctique rare, occasionnel à l'intérieur des terres.

**Mayenne** – Saint Fraimbault de Prières, 1 ind. de 2<sup>ème</sup> année, 23 décembre, phot. (Benoît Duchenne).

– Saint Fraimbault de Prières, 1 ind. de 1<sup>ère</sup> année, 28 février et 1<sup>er</sup> mars, phot. (Benoît Duchenne, François Duchenne, Thomas Girard).

**Sarthe** – Marçon, 1 ind. de 2<sup>ème</sup> année, 12 janvier, phot., (Douglas Fouliard, François-Marie Bouton, Bruno Duchenne)

Douzième et treizième données pour la Mayenne et première donnée pour la Sarthe depuis 2008.



### GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (73/86 – 3/3)

Niche de la Mer Noire à l'est du Kazakhstan, et plus ponctuellement en Europe centrale (Allemagne orientale et Pologne). Hiverné dans le Golfe Persique et en effectifs plus réduits en Europe du nord, du centre et de l'ouest.

Espèce homologable hors le Lac de Haute Mayenne, le CET de Saint Fraimbault et la sablière de Glaintain, l'étang d'Olivet et le CET de Changé (53).

**Sarthe** – Marçon, 1 ind. de 3<sup>ème</sup> année, 3 janvier, phot., (Christian Kerihuel, Bruno Duchenne).

– Marçon, 1 ind. de 2<sup>ème</sup> année, 12 janvier, phot., (Christian Kerihuel, Bruno Duchenne).

– Marçon, 1 ind. de 1<sup>ère</sup> année, 10 décembre, phot., (Christian Kerihuel, Bruno Duchenne).

A noter en Mayenne 7 individus au lac de Haute Mayenne le 10 janvier (David Madiot).

Rappelons que les fiches d'homologations non accompagnées de documents photographiques ou vidéo, concernant cette espèce, ne sont pas examinées.

### STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia* (9/15 - 1/1)

Niche en mer Baltique, mer Noire jusqu'en Asie centrale. Hiverné en Afrique subsaharienne. Migrateur peu commun sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée, rare à l'intérieur des terres.

**Sarthe** – La Flèche, 1 ind. ad., 16 avril, (François Delmont).

Quatrième donnée sarthoise, la première datant du 15/09/2011, La Ferté Bernard (F. Jallu).

### STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* (7/18 – 1/1)

Niche de l'Europe de l'Ouest à la mer Caspienne.

**Mayenne** – Loiron, 1 ind. ad., 2 octobre, (Benoît Duchenne, Marie Françoise et James Illand).

La dernière donnée Mayennaise datait de 2014, Lac de haute Mayenne (Anthony Garry).

### HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (39/884 – 3/3)

Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.

**Mayenne** – La Selle Craonnaise, 1 ind., 29 janvier, (Jean-François Arcanger).

– Ballots, 3 ind., 29 janvier au 29 mars, phot., (Siméon Béasse).

– Pré en Pail, 1 ind., 8 mars, phot., (Lionel Manceau)

– Bannes, 1 ind., 20 et 22 mars, phot., (Antoine

Lefloch).

**Sarthe** – Parcé sur Sarthe, 3 ind., 25 janvier au 1<sup>er</sup> avril, phot., (Eric Lapous, Jean François Darras et al.).

Belle année pour ce migrateur et hivernant peu commun vu tous les ans dans le Maine depuis la création du CH Maine (2008) sauf en 2010, avec deux longs séjours de 2 mois un en Mayenne et un en Sarthe.



Hibou des Marais, Parcé sur Sarthe, (Sarthe), 23 mars, (Jean-François Darras).



© Virgile Fuchs

Hibou des Marais, Parcé sur Sarthe, (Sarthe),  
17 mars, (Virgile Fuchs)



Hibou des Marais,  
Ballots, (Mayenne),  
29 mars, (Siméon Béasse)



Guêpier d'Europe, (Sarthe), 31 juin, (Antoine Muriani).

**GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster* (13/80 - 2/7)**

*Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. Nicheur peu commun, localisé et migrateur rare.*

**Espèce homologable hors des deux sites connus de nidification Sarthois.**

**Sarthe** – La Bruère sur Loir, 3 ind., 12 mai au 14 juillet, phot., (Sandrine Lautour et *al.*).

– Vaas, 4 ind., 10 juin, (Vincent Chauchet).

A noter jusqu'à 25 oiseaux vus le 3 mai sur un des deux sites connus un troisième site de nidification se confirme en Sarthe.

**PIC CENDRE *Picus canus* (2/2 - 0/0)**

*Niche de la Bretagne jusqu'à l'Altai, et jusqu'à 65° N.*

**Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe.**

Aucune donnée soumise au CHM.

Pour mémoire, Sarthe – forêt de Bercé, 11 données pour 13 individus; aucune en forêt de Perseigne.

**COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata* (7/13 - 0/0)**

*Niche de l'Europe centrale jusqu'au nord-ouest de l'Espagne et au nord-est de l'Italie.*

**Espèce homologable hors des régions de La Flèche, Sablé, La Ferté-Bernard, et du plateau calaisien pour la Sarthe et de Saint Denis d'Anjou pour la Mayenne.**

Pour mémoire, Sarthe –1 seule donnée.

**BERGERONNETTE PRINTANIERE (Centre-atlantique) *Motacilla flava x iberiae* (1/1 - 1/1)**

*Nicheur rare en Aquitaine, en Charente Maritime et pourtour méditerranéen.*

**Mayenne** – Bierné, 1 ind., 16 avril, phot., (Antoine Lefloch, Lionel Manceau).

Troisième donnée donnée dans le Maine après celle de 2012 et 2018, première en Mayenne.

**GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (7/13 - 2/2)**

*L. s. svecica : de la Scandinavie à la Sibérie orientale et à l'Alaska occidentale; L .s. namnetum: régions françaises proches de la Manche et de l'Atlantique, entre Ille et Vilaine et Gironde. Hiverné en Afrique subsaharienne, Afrique du nord, péninsule ibérique et au Moyen-Orient.*

**Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe.**

**Mayenne** – Saint Brice, 1 ind. fem., 11 septembre, phot., (Antoine Lefloch).

**Sarthe** – Vaas, 1 ind., 20 août, phot., capt., (Frédéric Vaidie).

Pour mémoire, Sarthe – Secteur de La Ferté-Bernard, 1 seule donnée.



Troisième donnée pour la Mayenne, pour la Sarthe donnée d'un oiseau capturé lors d'une cession de baguage. Il est à noter que ces trois données ont été enregistrées en migration postnuptiale.



Gorgebleue à miroir, La Ferté Bernard (Sarthe),  
7 octobre, (Virgile Fuchs).



Gorgebleue à miroir, Vaas (Sarthe),  
20 août, (Frédéric Vaidie).



#### FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (1/1 - 0/0)

*S. u. undata* niche en Méditerranée occidentale de l'Espagne à l'Italie, y compris le sud de la France. *S. u. dartfordiensis* niche dans les régions atlantiques, du nord du Portugal à l'Angleterre.

**Espèce homologable hors de la ceinture des sables cénomaniens au sud du Mans (Auvours, Parigné...), la forêt de Bercé, et le nord-est de la Mayenne.**

Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.

Pour mémoire, Sarthe – seulement 5 données pour six individus ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

#### FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (12/15 - 0/0)

La sous-espèce nominale niche de l'Europe de l'ouest, de 65° de latitude Nord jusqu'au nord de l'Italie et dans les Balkans, le Grand Caucase et le moyen bassin de la Volga, ainsi qu'en Sibérie occidentale jusqu'aux fleuves Ob et Irtych.

**Espèce homologable hors du nord de la Sarthe, au-dessus d'une ligne Sillé-le-Guillaume - La Ferté-Bernard.**

Pour mémoire, Sarthe – Région de La Ferté-Bernard, 24 données ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org))

#### ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* (5/7 - 0/0)

Niche du nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et à l'Oural.

**Espèce homologable hors des communes de La Ferté-Bernard et Roullée.**

Aucune donnée en dehors de ces deux communes au cours de la période.

Pour mémoire, Sarthe – 5 données ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

#### GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris* (13/21 - 0/0)

*C. f. familiaris* niche en Scandinavie, Europe de l'est, jusqu'à la Bulgarie et Russie centrale.

*C. f. macrodactyla* niche de l'Europe de l'ouest à l'Europe centrale.

**Espèce homologable hors massifs forestiers de Pail et Multonne en Mayenne et de Bercé et Perseigne en Sarthe.**

Pour mémoire en zone non homologable, Mayenne - 2 données et Sarthe - 10 données ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

#### BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (1/5 - 2/2)

Monotypique. Se reproduit en Europe et en Turquie au sud-est d'une ligne Lisbonne-Oslo et jusqu'à 100°E.

**Mayenne** – Villiers Charlemagne, 1 ind., 26 août, (Laurence Rousselet).

– Congrier, 1 ind., 15 septembre, enr., (Siméon Béasse). A écouter [ici](#).

Deuxième et troisième donnée pour la Mayenne, la première donnée a été enregistrée le 5 septembre 2013 (Franck Noël). Pour la Sarthe une seule donnée récente est connue, elle date du 6 mai 2006 observation d'un couple par Jean-Marie Durigneux (donnée GSO).

Espèce qui migre principalement la nuit et souvent en solitaire (certains oiseaux peuvent prolonger leur vol en matinée), elle est rarement contactée de jour. De ce fait elle est certainement sous détectée mais les enregistrements nocturnes, montreront qu'elle survole bien notre région et est plus courante que l'on ne

pensait (voir 2020) principalement en passage postnuptial, le passage pré-nuptial passant plus à l'est (source Stanislas Wroza).

#### **OBSERVATIONS EFFECTUÉES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES :**

##### **SARCELLE D'ÉTÉ *Anas querquedula***

**Sarthe** – Une donnée tardive de 1 ind., le 31 octobre à La Ferté Bernard, phot., (Virgile Fuchs).

##### **ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus***

**Mayenne** – Une donnée tardive, 1 ind., le 4 novembre à Saint Loup du Gast, phot., (Eric Médard).

##### **STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo***

**Sarthe** – Une donnée précoce de 2 ind., le 23 mars à La Flèche, (Christiane et Bernard Bazoge).

##### **MARTINET NOIR *Apus apus***

**Mayenne** – Une donnée précoce, de 1 ind., le 4 avril à Ballots, (Guy Thébault).

**Sarthe** – Une donnée précoce, de 1 ind., le 4 avril à La Ferté Bernard, photo., (Fabrice Jallu).

##### **TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla***

**Sarthe** – Une donnée tardive de 1 ind., le 6 octobre à Saint Saturnin, phot., (Christian Kerihuel).

##### **HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica***

**Sarthe** – Une donnée tardive de 1 ind., le 10 novembre à Maigné, (Vincent Chauchet).

##### **ROUSSEROLLE EFFARVATE *Acrocephalus scirpaceus***

**Sarthe** – Une donnée tardive de 1 ind., le 18 octobre à Saint Saturnin, phot., (Christian Kerihuel).

##### **TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe***

**Mayenne** – Une donnée tardive, 1 ind., le 9 novembre à La Selle Craonaise, phot., (Benoît Duchenne).

#### **LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUÉES :**

La non homologation d'une donnée ne préjuge évidemment pas de l'identité de l'oiseau observé et encore moins de la compétence ou de la crédibilité de l'observateur(trice), mais d'une description insuffisante et peu ou pas documentée.

##### **CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus***

**Mayenne** – Coudray, 1 ind., le 8 août. Probablement un Circaète mais le CH Maine ne souhaite pas validée une observation furtive simplement effectuée en roulant.

**Sarthe** – Luché-Pringé, 3 ind., le 5 août. Les éléments de description sont insuffisants pour que le CH Maine puisse se prononcer, bien que cette espèce soit de plus en plus présente dans le sud Sarthe (il aurait d'ailleurs été intéressant de connaître l'âge des oiseaux (Adulte, juvénile)).

##### **AIGLE ROYAL *Aquila chrysaetos***

**Mayenne** – Châtres la Forêt, 1 ind. de 3<sup>ème</sup> année, le 2 juillet. La description faite de l'oiseau sur la fiche correspond tout à fait à cette espèce, mais s'agissant d'une première pour le Maine il est difficile pour le comité de validée cette donnée en l'absence de document.

##### **STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis***

**Sarthe** – Lavenay, 1 ind., le 18 juin. Certainement une caugek mais il est difficile de valider cette donnée avec les seuls éléments fournis.

## REMERCIEMENTS

Le CH Maine tient à remercier vivement celles et ceux qui ont contribué à son fonctionnement au cours de l'année 2019 :

- les organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : Mayenne Nature Environnement, le Groupe Sarthois Ornithologique, le Groupe Ornithologique des Avaloirs, la LPO Sarthe, les CPIE du Bas Maine (53) et Vallées de la Sarthe et du Loir (72), SNE, et le CEN Pays de la Loire ;
- la liste de diffusion Obsmaine, le site BioloVision et sa base de données en ligne Faune-Maine, qui a engrangé 122948 données d'oiseaux, au cours de l'année 2019, sur les 2 départements (Mayenne et Sarthe).
- tous les ornithologues, naturalistes et observateurs, dessinateurs et photographes, sans qui le CH Maine ne fonctionnerait pas.
- David Madiot pour sa relecture et François Duchenne pour ses graphiques.

## BIBLIOGRAPHIE

- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., TAVENON D., 2007- Statut des Oiseaux de la Mayenne, mise à jour, 31/12/2007 in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n°24, p.41-53.
- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., MADIOT D. & TAVENON D., 2015- Statut des Oiseaux de la Mayenne, nouvelle mise à jour, décembre 2015, à paraître, in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences.
- Commission de l'Avifaune Française, 2007 - Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos 14* (4) : p.234-246, septembre-octobre 2016
- Coordination régionale LPO Pays de la Loire, collectif, 2008 - Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 221 p.
- DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008 - Nouvel inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.
- DUBOIS P-J., DUQUET M., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2014 - *Notes d'Ornithologie Française*, deuxième mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France, *Ornithos 21-4* : p. 169-213 (2014).
- DUCHENNE B. & F., 2014 - Synthèse des observations d'espèces occasionnelles en Mayenne, in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n° 30.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2005 à 2009 - Inventaires de l'avifaune sarthoise & Observatoire de l'avifaune en Sarthe du GSO. *Sitta cénomane* - suppléments aux bulletins GSO n° 31 à 35.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1977 à 2014 - Bulletins du Groupe Sarthois Ornithologique & *Sitta cénomane* – revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 1 à 44.
- REEBER S., KAYSER Y. & le CHN, 2016 - Les oiseaux rares en France en 2015. 33<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos 23-6* : 300-329 (2016).
- LPO Sarthe, 2000 à 2016 - *Le Tarier pâtre puis Sur les chemins de Lacampagne*. Bulletin annuel d'ornithologie de la LPO Sarthe n° 1 à 16.
- MARCHADOUR B. (coord.), 2014. *Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014, 576 p.
- Mayenne-Nature-Environnement, 1982 à 2016 - Chroniques ornithologiques & espèces occasionnelles observées en Mayenne in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne-Sciences n° 1 à 32.
- REEBER S., BLANC J.F., JIGUET F. & le CHN - Les oiseaux rares en France en 2016 et 2017. 34<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos 25-6* : 321-369 (2018).
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°47 décembre 2017. Afflux de Sizerins cabarets dans le Nord-Ouest de la France au cours de l'hiver 2018 par Gilles Paineau.
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°49 mars 2019. Synthèse des observations ornithologiques sarthoises – sélection des faits marquants de 2018- Collectif GSO.
- OLIVIER POISSON et ROMAIN PROVOST - Afflux de Sizerins en France lors de l'hiver 2017-2018 : analyse à l'aide du baguage. *Ornithos 26-5* Septembre-Octobre 2019 (n°139).
- HUGO TOUZE, SEBASTIEN REEBER & le CHN - Les oiseaux rares en France 2018. 35<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos 27-4* : 201-235 (2020).
- COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANCAISE – Liste officielle des oiseaux de France – version 2020. *Ornithos 27-3* : 170 - 185 (2020).
- DURIGNEUX J.M. – première mention Sarthoise récente du Bruant ortolan – Sitta cénomane – Bulletin GSO n° 47 décembre 2017.

Ce rapport doit être référencé comme suit :

CH Maine – Les oiseaux rares en 2019 dans le Maine - 12<sup>ème</sup> rapport du comité d'homologation du Maine.