



# LES OISEAUX RARES EN 2022 et 2023 DANS LE MAINE (MAYENNE et SARTHE)

15<sup>ème</sup> et 16<sup>ème</sup> rapports du Comité d'Homologation du Maine



Phalarope à bec étroit, Aron (Mayenne), 30 août 2022, (Christian Kerihuel).



Mouette tridactyle, Le Mans (Sarthe), 17 janvier 2023, (Christian Kerihuel).

## **BRUNO DUCHENNE et le CH MAINE.**

Regroupant les départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé sous l'égide de quatre associations locales : Mayenne-Nature-Environnement (MNE), le Groupe Sarthois Ornithologique (GSO), la LPO Sarthe et le Groupe Ornithologique des Avaloirs (GOA).

Ce comité a pour objet de centraliser, valider et publier, sous le nom de leurs auteurs, les données circonstanciées d'espèces d'oiseaux d'occurrence inhabituelle dans le Maine, soit par leur degré de rareté, de difficulté d'identification ou leur phénologie atypique (et qui ne font pas partie des espèces soumises à homologation nationale). Il permet de préciser leur statut à l'échelle régionale.

Ces quinzième et seizième rapports du CH Maine couvrent les années **2022** et **2023**, 15<sup>ème</sup> et 16<sup>ème</sup> année de son fonctionnement. Les membres du comité ont été invités à examiner pour l'année,

- **2022**, 7 fiches et 141 données (avec photos, enregistrement sonore et ou description en partie remarque de l'observation via l'interface Faune Maine) dont deux pour 2018, 2 pour 2020 et 2 pour 2021 candidates à la validation directe. Le taux de validation atteint 92 %. 28 observations concernant des espèces à homologuer n'ont pas été soumises au CH Maine, elles n'apparaissent donc pas dans ce rapport.

- **2023**, 4 fiches et 114 données (avec photos, enregistrement sonore et ou description en partie remarque de l'observation via l'interface Faune Maine) candidates à la validation directe. Le taux de validation atteint 89 %. 29 observations concernant des espèces à homologuer n'ont pas été soumises au CH Maine, elles n'apparaissent donc pas dans ce rapport.

La classification suit la « Liste officielle des oiseaux de France - version 2020 » établie par la CAF (Commission de l'Avifaune Française, Ornithos 27-3, n° 143, mai - juin 2020).

En **2022**, le CH Maine était composé des 7 membres suivants : Benoit Duchenne, Bruno Duchenne (secrétaire), David Madiot, Jean-François Arcanger, Jean-Luc Reuzé (secrétaire adjoint), Frédéric Vaidie, et François-Marie Bouton. En **2023** Lionel Manceau (Mayennais) a rejoint le comité, celui-ci a donc fonctionné avec huit membres : cinq mayennais et trois sarthois.

La réunion plénière de **2024** s'est tenue le 20/02/2024 à Sainte Suzanne (53) en présence de 6 membres, 2 membres ont été excusés, les données à discuter ont été débattues, et il a été apporté huit modifications à la liste des espèces homologables dans le Maine. Elles concernent l'Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*), et la Marouette de Baillon (*Porzana pusilla*) qui ne sont plus pris en charge par le CHN, le Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*) et le Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) ont été de même ajoutés ainsi que la sous espèce nordique du Choucas des tours (*Coloeus monedula monedula*). Pour le Cochevis huppé (*Galerida tristata*) la zone de non homologation a été étendue à la commune de Souvigné sur Sarthe (72) et pour la Fauvette pitchou (*Sylvia undata*) la Corniche de Pail (53) fait désormais partie des zones de non homologation.

La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur sont à consulter sur le site Faune Maine ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

Lors de cette même réunion, il a été acté le départ du comité de Frédéric Vaidie, merci à lui pour le travail fourni durant ces dernières années. Le CH Maine fonctionnera donc avec 7 membres en **2024** (5 mayennais et 2 sarthois).

Il a aussi été convenu de combler l'année de retard dans la parution du rapport CH Maine (d'où ce double rapport).

Les fiches d'homologation doivent être adressées à :



## QUELQUES FAITS MARQUANTS 2022

Année remarquable pour la Mayenne avec trois espèces CHN l'**Aigle impérial** (1<sup>ère</sup> donnée pour le Maine et 11<sup>ème</sup> nationale), le **Fuligule à tête noire** (1<sup>ère</sup> mention pour le Maine) et le **Vanneau sociable** (3<sup>ème</sup> mention pour le Maine), toutes trois homologuées. Pour la Sarthe une seule espèce CHN le **Pipit à dos olive** capté lors d'un enregistrement nocturne (1<sup>ère</sup> pour le Maine) également homologuée. Pour les espèces CH Maine quatre données remarquables avec pour la Mayenne le **Labbe à longue queue** (1<sup>ère</sup> donnée mayennaise), le **Phalarope à bec étroit** (observé avec une belle proximité) et le **Vautour moine** repéré grâce à sa balise GPS (1<sup>ère</sup> donnée pour le Maine), et pour la Sarthe le **Chevalier stagnatile** 3<sup>ème</sup> donnée pour le Maine. Les enregistrements nocturnes confirment une nouvelle fois le passage postnuptial au-dessus de nos départements du **Bruant ortolan** avec treize nouvelles données recueillies pour 18 individus. Macreuse noire et Pipit rousseline font partie des belles surprises des enregistrements nocturnes. Le **Plongeon arctique** a fait une brève apparition en Sarthe. Enfin deux belles observations de la **Marouette ponctuée** (3 individus) ont été faites en Mayenne.

## QUELQUES FAITS MARQUANTS 2023

Aucune espèce CHN n'a été observé dans le Maine en 2023. Pour le CH Maine de belles données, tel cet **Océanite culblanc** amené à l'intérieur des terres par la succession des tempêtes automnales, de même que ce jeune **Fou de Bassan** trouvé épuisé et dirigé vers un centre de soin. Du côté des rapaces deux données de **Pygargue à queue blanche**, une en Sarthe oiseau repéré grâce à sa balise GPS et une en Mayenne où un immature à fait un séjour de quatre mois, ainsi que deux données de **Gypaète barbu** (une visuelle et une grâce à une balise GPS), jeunes oiseaux en période d'erratismo. Une étonnante donnée de **Crave à bec rouge** égarée a été faite en Sarthe première donnée pour ce département et le Maine. De nouveau de belles surprises ont été notées par le biais des enregistrements nocturnes avec : un **Bruant nain**, un **Bruant Lapon** et un **Bruant des neiges** sans oublier les **Bruants ortolans** (20 oiseaux pour 15 données). Signalons aussi une **Sterne hansel** notée en Mayenne ; la dernière donnée de cet oiseau remontait à 2013. La **Macreuse brune** pour la Sarthe et la **Locustelle luscinoïde** pour la Mayenne complètent le tableau.

Les graphiques ci-dessous illustrent la phénologie de découverte des espèces rares en Mayenne et Sarthe depuis la création du CH Maine (2008). Le printemps est la meilleure période pour l'observation d'espèces rares. Les données printanières et automnales comportent beaucoup d'observations de limicoles, alors que les données hivernales concernent principalement anatidés et laridés.



## LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (catégories A & C)

Les données sont présentées de la manière suivante :

- 1- Noms français et scientifique.
- 2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués depuis 2008, (date de création du CH Maine), **2022** et **2023** exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués pour **2022** et **2023**.
- 3- La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique après les points précédents.
- 4- Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
- 5- Commune, lieu-dit, effectif (se réfère à un individu s'il n'est pas précisé), âge et sexe si connus.
- 6- Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur agréé.
- 7- Date(s) d'observation(s).
- 8- Précision si l'oiseau a été photographié (photo), filmé (vidéo), enregistré sur bande audio (enr. nocturne ou diurne) ou suivi par balise GPS (gps).
- 9- Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique.
- 10- La séquence taxonomique est celle de la liste officielle des oiseaux de France - version 2020 (CAF).
- 11- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
- 12- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature.

## OBSERVATIONS D'OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTÉES PAR LE CH MAINE EN 2022 et 2023 :

### **OIE RIEUSE *Anser albifrons* (21/82 - 5/22)**

*Se reproduit au nord de la Russie, de la péninsule de Kanin à la rivière Kolyma. En France, hiverne principalement au nord-est, plus rarement ailleurs.*

**2022 - Sarthe** – Saint Ouen en Belin, 2 ind., 19 janvier, photo, (Vincent Chauchet).



– Saint Ouen en Belin, 19 ind., 10 février, (Thomas Domalain).

**2023 - Sarthe** – La Flèche, 2 ind., 20 janvier, (Christiane et Bernard Basoge).

– Spay, 01 décembre, photo, (Christian Kerihuel).

**2009 - Sarthe** – La Ferté Bernard, 4 janvier, photo, (Fabrice Jallu)

Cinq données avec celle de 2009, toutes en Sarthe, dans une fourchette de dates qui s'inscrit bien dans le pattern d'apparition de l'espèce.



### FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (11/11 - 2/3)

Niche des Balkans et de l'Europe centrale jusqu'à l'Asie centrale, occasionnellement plus à l'ouest.

Espèce homologable uniquement en Mayenne.

**2022 - Mayenne** – Aron, du 13 janvier au 3 mars, photo, (David Madiot).

– Sainte Suzanne, 2 ind., 1 mâle ad. et 1 femelle ad., 14 avril, (Jean-François Arcanger).

**2023 - Mayenne** – Aucune donnée

Pour mémoire – **Sarthe** – 2022 -2 données pour deux oiseaux, et 2023 1 seule donnée, à La Flèche (pour les deux années).

Migrateur et hivernant rare. Fréquente tout type de plan d'eau, surtout étangs avec végétation bien développée.

### FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila* (4/5 - 1/1)

Niche en Islande, et de la Scandinavie au nord de la Russie, jusqu'au fleuve Léna, à l'est.

Espèce homologable uniquement en Sarthe.

**2022 - Sarthe** – Fillé sur Sarthe, fem., 9 et 11 mars, (Alain Desnos).

Pour mémoire – **Mayenne** – 1 seule donnée pour **2022**, aucune pour **2023**.

La dernière donnée Sarthoise datait de 2017 à la Flèche. Migrateur et hivernant peu commun. Fréquente surtout les rivages marins abrités (baies, estuaires), mais aussi les plans d'eau intérieurs.

### MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca* (3/7 - 1/1)

Scandinavie, nord de la Russie et de la Sibérie.

**2023 - Sarthe** – La Chartre sur le Loir, mâle 2<sup>ème</sup> année, 22 au 25 février, photos, (Vincent Chauchet).

4<sup>ème</sup> donnée (toutes Sarthoises) depuis la création du CH Maine, les dernières données dataient du 14/12/2007 pour la Mayenne et du 3/12/2019 pour la Sarthe.

### MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (10/15 - 3/11)

Islande, Nord des îles Britanniques, et de la Scandinavie jusqu'en Sibérie.

**2022 - Sarthe** – Le Mans, min. 5 ind., 8 avril (0h49), enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

– Coulaines, X ind., 8 avril (0h05), enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

**2023 - Mayenne** – Hardanges, min. 5 ind., 17 mars, enr. nocturne ([ici](#)), (Robin et Julien Souriou).

Migratrice et hivernante assez commune sur le littoral, rare dans les terres. Ces données s'inscrivent bien dans le pattern d'apparition de l'espèce, souvent suite à un fort coup de vent qui ramène ces oiseaux marins à l'intérieur des terres.

### MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (18/19 - 2/3)

Niche de l'Europe à la Sibérie centrale, dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes. Hiverné en Afrique subsaharienne.

**2022 - Mayenne** – Ballots, 1 ind. du 22 août au 11 septembre et 2 ind. le 6 septembre, photos, (Siméon Béasse, Lionel Manceau).

– Mézangers, 4 au 10 septembre, photo, (Quentin Benet-Cibois).

Espèce très rare aux haltes migratoires imprévisibles. Elle peut être contactée lors des deux passages pré et post nuptial.



Marouette ponctuée, Ballots (Mayenne), 22 août 2022, (Siméon Béasse).

#### **GRÈBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (9/10 - 1/1)**

*Niche de la Scandinavie à la Russie ; quelques couples en Ecosse. Hivernent le long des côtes françaises de l'Atlantique, en mers du nord, Baltique, Adriatique et Mer noire, à l'est.*

**2023 - Sarthe** – La Flèche, 20 mars, (Christiane et Bernard Bazoge).

Hivernant littoral plutôt rare à l'intérieur des terres n'avait pas été observé dans le Maine depuis 2017.

#### **HUITRIER-PIE *Haematopus ostralegus* (12/15 - 6/7)**

*Europe et ouest Russie jusqu'à l'Altai.*

**2022 - Mayenne** – Hardanges, 2 ind., 20 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Robin et Julien Souriou).

– Congrier, 26 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Siméon Béasse).

- **Sarthe** – Le Mans, 28 novembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

**2023 - Mayenne** – Hardanges, 8 mai, enr. nocturne ([ici](#)), (Robin et Julien Souriou).

– Hardanges, 20 août, enr. nocturne ([ici](#)) (Robin et Julien Souriou).

- **Sarthe** – Le Mans, 9 février, enr. nocturne ([ici](#)) (Bruno Duchenne).

Espèce rare à l'intérieur des terres, captée lors des mouvements migratoires ou lors des tempêtes d'hiver repoussant des oiseaux à l'intérieur des terres. Toutes les données sont issues d'enregistrements nocturnes.

#### **GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus* (3/3 – 1/1)**

*Niche de l'Europe de l'Ouest et du nord-ouest de l'Afrique, à travers le Moyen-Orient et l'Asie centrale jusqu'au nord-est de la Chine et l'Extrême-Orient russe. En France, niche le long des côtes de la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Occasionnel à l'intérieur des terres.*

**2022 - Mayenne** – Maisoncelles du Maine, 4 mai, photo, (Benoît Duchenne).

Seulement la 4<sup>ème</sup> donnée depuis la création du CH Maine, à une date conforme du passage pré-nuptial, peu commun à l'intérieur des terres, en migration peut se rencontrer sur tout type de milieux humides.

### **PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (7/17 - 2/3)**

Niche de l'Écosse et des Pyrénées espagnoles jusqu'au sud-est de la Russie, à la Mongolie et en Sibérie orientale. Hiverné du Maghreb à l'Iran. Noté localement, mais irrégulièrement et en petit nombre entre l'Andalousie et Chypre.

**Espèce homologable hors des plaines du nord et du sud Sarthe.**

**2023 - Sarthe** – Saint Pavace, 2 ind., 20 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Le Mans, 30 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

Pour mémoire – **Sarthe – 2022** une donnée pour 5 oiseaux le 9 octobre en plaine de Parcé sur Sarthe et **2023** une donnée pour un oiseau entre le 29 avril et le 2 mai sur cette même plaine.

Deux données issues d'enregistrements nocturnes en plein pic de migration postnuptiale de cette espèce rare mais régulière qui peut être contactée partout en France en migration nocturne.

### **BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (29/127 - 2/4)**

Nord de la Scandinavie, Russie d'Europe jusqu'à l'Énisei.

**2022 - Mayenne** – Saint Brice, 2 ind., 25 au 27 avril, photo, (Emmanuel Noyer).

**2023 - Sarthe** – Marçon, 2 ind., 29 et 30 avril, photo, (Arnaud Cornilleau).

Espèce plutôt rare à l'intérieur des terres en halte migratoire pré-nuptiale.

Barge rousse et Chevalier gambette,  
Saint Brice (Mayenne), 27 avril 2022,  
(Virgile Fuchs).



### **TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (22/35 – 3/3)**

Niche au N-E du Canada, en Alaska, et sur le littoral arctique hors Islande, mais jusqu'au sud de la Baltique. Hivernant rare à l'intérieur des terres.

**Espèce homologable hors des sites de la Flèche et de La Ferté Bernard.**

**2022 - Mayenne** – L'Huisserie, 27 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Benoît Duchenne).

– Ballots, 6, 7 et 8 septembre, photo, (Lionel Manceau).

**2023 - Sarthe** – Marçon, 12 août, photo, (Arnaud Cornilleau).

Pour mémoire, **Sarthe – 2022** La Flèche, 1 individu 12 mai, La Ferté Bernard 1 individu le 25 août et pour **2023** La Flèche, 3 individus le 22 mai et 1 le 25 novembre, La Ferté Bernard 1 le 8 mai.

Tournepierre à collier  
Ballots (Mayenne),  
7 septembre 2022,  
(Lionel Manceau).



## BÉCASSEAU MAUBÈCHE *Calidris canutus* (31/42 – 4/65)

*C. c. canutus* niche en Sibérie et hiverne en Afrique atlantique ; *C. c. islandica* niche du nord-est canadien au Groenland et hiverne dans le nord-ouest de l'Europe.

**2022 - Mayenne** – Mézangers, du 3 au 6 septembre, photo, (Robin et Julien Souriou).

**2023 - Mayenne** – Sainte Suzanne, 14 septembre, (Jean-François Arcanger).



- **Sarthe** – Saint Pavace, 11 mai, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– La Ferté Bernard, 62 ind., 22 août, photo, (Bruno Foulard).

A noter la remarquable observation de 62 oiseaux en vol migratoire à La Ferté Bernard. Espèce qui fréquente volontiers lagunes et vasières littorales, mais aussi plans d'eau intérieurs.



Bécasseaux maubèches, La Ferté Bernard (Sarthe), 22 août 2023, (Bruno Foulard).



Espèce régulièrement contactée lors des deux passages migratoires aussi bien en Mayenne qu'en Sarthe.

## BÉCASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (19/33 – 8/14)

Extrême nord de la Sibérie centrale.

**2022 - Mayenne** – Maisoncelles du Maine, 1<sup>ère</sup> année du 1 au 5 septembre, photo, (Emmanuel Noyer).

– Livet, 2<sup>ème</sup> année, 3 et 11 septembre, photo, (Lucas Letessier).


– Sainte Suzanne, 3<sup>ème</sup> année, (Jean-François Arcanger).

– Maisoncelles du Maine, 4 ind., 13 septembre, photo, (Michel Caigneux)).


- **Sarthe** – La Ferté Bernard, 13 septembre, photo, (Virgile Fuchs).

**2023 - Sarthe** – La Ferté Bernard, 3 mai, photo, (Virgile Fuchs).

– La Ferté Bernard, 30 septembre, photo, (Virgile Fuchs).



Espèce contactée le plus souvent au passage post nuptial (la plupart des oiseaux sont des 1<sup>ère</sup> année) et sur les étangs de la Mayenne.





Bécasseau cocorli, Livet (Mayenne), 11 septembre 2022, (Lucas Letessier).

### BÉCASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (19/28 - 3/4)

Arctique : sud de la Norvège à l'est de la Sibérie.

**2022 - Mayenne** – Saint Brice, 4 mai, photo, (Antoine Lefloch, Jean Luc Reuze, Michel Caigneux).  
– Sainte Suzanne, 5 septembre, (Jean-François Arcanger).

**2023 - Mayenne** – Maisoncelles du Maine, 2 ind., 22 mai, photo, (Benoît Duchenne).

Migrateur rare, hivernant très rare. Fréquente les marais saumâtres arrière-littoraux et les plans d'eau douce de l'intérieur. La dernière donnée datait de 2018.

### BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (37/57 - 8/15)



Arctique : Sibérie, nord-est du Canada et du Groenland.

**2022 - Mayenne** – Saint Brice, 8 avril, photo, (Antoine Lefloch).  
– Aron, 26 avril, photo, (Jean-François Arcanger).  
– Maisoncelles du Maine, 11 mai, (Jean Luc Reuzé).  
– Ballots, 16 septembre, photo, (Jérôme Boulay).

- **Sarthe** – La Flèche, 2 ind., du 27 au 28 septembre, (Christiane et Bernard Basoge).

**2023 - Mayenne** – Saint Fraimbault de Prières, 6 ind., 28 avril, photo, (François Duchenne).  
– Maisoncelles du Maine, 30 mai, photo, (Emmanuel Noyer).

- **Sarthe** – La Flèche, 1 à 3 ind., du 9 au 11 mai, Christiane et Bernard Basoge).



Espèce contactée le plus souvent au passage prénuptial à l'inverse du Bécasseau cocorli, aussi bien en Mayenne qu'en Sarthe



Bécasseau sanderling, Ballots (Mayenne),  
16 septembre 2022, (Jérôme Boulay).



Bécasseau sanderling, Aron (Mayenne),  
26 avril 2022, (Jean-François Arcanger).

### **PHALAROPE A BEC ETROIT *Phalaropus lobatus* (1/1 – 2/2)**

*Niche tout autour du Grand Nord, y compris en Islande et dans le nord de l'Europe, surtout au-delà de 60° N (au sud jusqu'en Ecosse).*

**2022 - Mayenne** – Bourgon, 1<sup>ère</sup> année, 29 et 30 août, photo, (Benoît Duchenne).

– Aron, 1<sup>ère</sup> année, du 31 août au 2 septembre, (Robin Souriou).

Migrateur très rare, fréquente le littoral et les plans d'eau intérieurs, très accidentel en migration et en hiver dans l'intérieur des terres. Deuxième et troisième donnée pour la Mayenne et le Maine, il n'est pas impossible que ces deux données concernent le même oiseau.



Phalarope à bec étroit, Aron (Mayenne), 31 août 2022, (Robin Souriou).

### **CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis* (0/0 – 1/1)**

*Monotypique. Nicheur du centre de l'Eurasie, de l'est de la Biélorussie à l'est du lac Baïkal.*

**2022 - Sarthe** – La Ferté Bernard, 23 et 24 avril, photo, (Virgile Fuchs, Fabrice Jallu).

Migrateur rare. Fréquente les marais doux et saumâtres et autre zones humides intérieures, exceptionnellement les vasières littorales. Première donnée depuis la création du CH Maine, c'est la troisième pour le Maine (1 pour la Mayenne et deux pour la Sarthe).



Chevalier stagnatile, La Ferté Bernard (Sarthe), 24 avril 2022, (Frédéric Pelletier).

#### **MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (11/11 - 3/3)**

*Autour de l'Atlantique nord, archipels arctiques au nord, jusqu'au Portugal, au sud. Migrateur commun le long des côtes.*

**2022 - Sarthe** – Beaufay, 22 novembre, (Fabrice Jallu).

– Marçon, 27 novembre, photo, (Arnaud Cornilleau).

**2023 - Sarthe** – Le Mans, 17 janvier, photo, (Christian Kerihuel).

L'espèce apparaît occasionnellement à l'intérieur des terres à la faveur de tempêtes hivernales venues de l'Atlantique.



Mouette tridactyle,  
Marçon (Sarthe),  
27 novembre 2022,  
(Arnaud Cornilleau).

#### **GOELAND ARGENTÉ SCANDINAVE *Larus argentatus argentatus* (2/2 - 5/5)**

*Niche de la Scandinavie à la péninsule de Kola.*

**2022 - Mayenne** – Changé, 5 janvier, (Benoît Duchenne).

– Le Genest Saint Isle, 1 février, (Benoît Duchenne).

– Saint Fraimbault de Prières, 19 février, photo, (Benoît Duchenne).

**2023 - Mayenne** – Le Genest Saint Isle, 13 janvier, photo, (Stéphane Guérin).

– Saint Pierre La Cour, 27 décembre, photo, (Stéphane Guérin).

Sous espèce nordique hivernante peu courante à l'intérieur des terres et certainement sous-décelée car sur le terrain il est difficile de séparer l'argentatus de l'argenteus. Seuls les individus les plus extrêmes (apparemment originaires du nord de la Norvège et de la mer Blanche) sont remarquablement différents (taille, manteau plus sombre, peu de noir au bout de l'aile et grandes pointes blanches aux deux primaires externes, croissant blanc plus large aux tertiaires et tête plus marquée en hiver).

### **GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (84/103 – 24/52)**

*Niche de la Mer Noire à l'est du Kazakhstan, et plus ponctuellement en Europe centrale (Allemagne orientale et Pologne. Hivernent dans le Golfe Persique et en effectifs plus réduits en Europe du nord, du centre et de l'ouest.*

**Espèce homologable hormis au Lac de Haute Mayenne, le CET de Saint Fraimbault et la sablière de Glaintain, l'étang d'Olivet et le CET de Changé (53).**

**2022 - Sarthe** – Marçon, 3 2<sup>ème</sup> année et 3 3<sup>ème</sup> année, 29 janvier, photo, (Vincent Le Brun).

– La Ferté Bernard, 1 2<sup>ème</sup> année et 2 3<sup>ème</sup> année, du 2 février au 3 mars, photo, (Vincent Le Brun).

– La Ferté Bernard, ad., 24 décembre, photo, (Vincent Le Brun).

– La Ferté Bernard, 2<sup>ème</sup> année, 12 mars, photo, (Fabrice Jallu).

– Montmirail, 2<sup>ème</sup> année 2 mars, photo, (Fabrice Jallu).

**2023 - Mayenne** – Saint Pierre La Cour, 2<sup>ème</sup> année, 1 février, photo, (Benoît Duchenne).

– Launay Villiers, 2<sup>ème</sup> année, 27 avril, photo, (François Duchenne).

– Saint Pierre La Cour, 2 2<sup>ème</sup> année, photo, (Stéphane Guerin).

- **Sarthe** – Montmirail, 2<sup>ème</sup> année, 7 janvier au 12 janvier, photo, (Fabrice Jallu).

– La Bruère sur Loir, 2 2<sup>ème</sup> année, 29 janvier, photo, (Vincent Le Brun).

– Marçon, 2 3<sup>ème</sup> année, 29 janvier, photo, (Vincent Le Brun).

– La Ferté Bernard, 1 2<sup>ème</sup> année et 3 3<sup>ème</sup> année, 4 février, photo, (Vincent Le Brun).

– La Bruère sur Loir, 2 2<sup>ème</sup> année, 12 avril, photo, (Vincent Le Brun).

– La Ferté Bernard, 1<sup>ère</sup> année, 25 novembre, photo, (Vincent Le Brun).

– Marçon, 2 3<sup>ème</sup> année, 29 janvier, photo, (Vincent Le Brun).

– La Bruère sur Loir, 3 1<sup>ère</sup> année et 3 2<sup>ème</sup> année, 8 décembre, photo, (Vincent Le Brun).

– La Bruère sur Loir, 3 1<sup>ère</sup> année, 15 décembre, photo, (Vincent Le Brun).

– Montmirail, ad., 24 au 28 décembre, photo, (Fabrice Jallu).

– La Ferté Bernard, 1 1<sup>ère</sup> année et 2 2<sup>ème</sup> année, 25 décembre, photo, (Vincent Le Brun).

– La Ferté Bernard, 4 1<sup>ère</sup> année, 27 décembre, photo, (Vincent Le Brun).

**2021 - Sarthe** – Montmirail, 21 janvier, photo, (Fabrice Jallu).

– La Ferté Bernard, 17 avril, photo, (Fabrice Jallu).

**2020 - Sarthe** – Montmirail, 19 décembre, photo, (Fabrice Jallu).

**2018 - Sarthe** – Montmirail, 3 2<sup>ème</sup> année, 24 mars au 1 avril, photo, (Fabrice Jallu).

Pour mémoire en Mayenne, sur les sites hors homologation un minimum de 17 individus pour 8 données en **2022** et un minimum de 20 individus pour 10 données en **2023**.

Au vu du turnover important dans les dortoirs de laridés le nombre d'individus recensés est certainement sous ou surestimé mais s'approche au mieux de la réalité.

**Ce laridé étant de détermination délicate nous rappelons que les fiches d'homologation ou les données non accompagnées de documents photographiques ou vidéo, ne sont pas examinées.**

### **STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica* (2/2-1/1)**

*Niche du sud de l'Europe au Kazakhstan, au sous-continent indien et au nord-ouest de la Chine.*

**2023 - Mayenne** – Sainte Suzanne, 10 juillet, (Jean-François Arcanger).

Troisième donnée mayennaise pour cette espèce migratrice, occasionnelle à l'intérieur des terres, de fin mai à mi-juillet.

### STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia* (13/20 - 5/7)

Niche en mer Baltique, mer Noire jusqu'en Asie centrale. Hiverné en Afrique subsaharienne. Migrateur peu commun sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée, rare à l'intérieur des terres.

**2022 - Mayenne** – Saint Brice, 26 avril, photos, (Antoine Lefloch).



– Aron, 1 ad. et 1 1<sup>ère</sup> année, 31 août, photo, (Benoît Duchenne).

– Jublains, 2 ind., 11 septembre, photo, (Michel Caigneux).

– Saint Brice, 16 septembre, photo, (Antoine Lefloch, Alain Desnos).

- **Sarthe** – La Flèche, 12 septembre, (Christiane et Bernard Basoge).

Aucune donnée en 2023.



Les observations de 2022 représentent le quart des données validées depuis la création du CH Maine (2008). Espèce plus fréquemment détectée en migration postnuptiale aussi bien en Mayenne qu'en Sarthe.



Sterne caspienne, Aron (Mayenne), 31 août 2022, (Bruno Duchenne).

### STERNE CAUGEK *Thalasseus sandvicensis* (13/28 – 2/2)

Niche de l'Europe de l'Ouest à la mer Caspienne.

**2023 - Sarthe** – La Ferté Bernard, 19 au 21 novembre, photo, (Virgile Fuchs).

**2020 - Sarthe** – La Ferté Bernard, 23 mai, photo, (Fabrice Jallu).

Espèce rare à l'intérieur des terres, pas de donnée pour 2022.



Sterne caugek, La Ferté Bernard (Sarthe), 20 et 21 novembre 2023, (Virgile Fuchs).

### **LABBE A LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (1/1 - 1/1)**

*Niche de la Scandinavie et Russie arctique et subarctique jusqu'au delta de la Lena, en Sibérie.*

**2022 - Mayenne** – Azé, 1 1<sup>ère</sup> année trouvé mort, 8 novembre, (Anonyme par OFB et Lionel Manceau).

Deuxième observation remarquable de cette espèce dans le Maine et première pour la Mayenne. Il s'agit d'un jeune oiseau égaré découvert mort

### **PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica* (3/3 - 1/1)**

*Niche de l'Europe du Nord jusqu'à la Russie à l'est. Hivernent principalement sur les côtes de l'Atlantique.*

**2022 - Sarthe** – La Flèche, 13 décembre, (Christiane et Bernard Basoge).

La 10<sup>ème</sup> donnée sarthoise de cette espèce, après celle de 2018 et seulement la 4<sup>ème</sup> depuis la création du CH Maine (2008), à une période classique d'apparition. Hivernant peu commun le long des côtes et également à l'intérieur des terres, sur étangs, lacs, grands réservoirs et parfois sur le cours des fleuves.

### **PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (6/6 - 1/1)**

*Niche au nord de l'Amérique du Nord et en Islande.*

**2023 - Sarthe** – La Ferté Bernard, 4 novembre, photos, (Virgile Fuchs).

5<sup>ème</sup> donnée sarthoise depuis la création du CH Maine, après celles de 2012, 2014, 2016 et 2020, à une période classique d'apparition de cet oiseau, hivernant peu commun le long des côtes et également à l'intérieur des terres, sur étangs, lacs, grands réservoirs et parfois sur le cours des fleuves. A noter la courte halte de cet oiseau pour une espèce qui nous a habitués à des séjours de plusieurs semaines.

### **OCÉANITE CULBLANC *Oceanodroma leucorhoa* (0/0 - 1/1)**

*Polytypique. Seul Oceanodroma leucorhoa leucorhoa, qui niche de la Norvège à l'est du Canada, se rencontre en Europe.*

**2023 - Sarthe** – La Ferté Bernard, 5 novembre, photo, (Fabrice Jallu).

Migrateur très commun au large dans le golfe de Gascogne. Rare près des côtes, exceptionnel dans les terres.

Première donnée pour la Sarthe et troisième donnée pour le Maine. Suite au passage des fortes tempêtes de début novembre des Océanites culblanc ont été vus loin à l'intérieur des terres jusqu'au plan d'eau du Grand Est.

Océanite culblanc,  
La Ferté Bernard (Sarthe),  
5 novembre 2023,  
(Fabrice Jallu).



### **FOU DE BASSAN *Morus bassanus* (2/2 - 1/1)**

*En Europe, niche en Islande, Norvège, Allemagne, Iles Britanniques et Anglo-Normandes, et France. Hivernant commun en mer. Occasionnel à l'intérieur des terres.*

**2023 - Mayenne** – Commer, 1 1<sup>ère</sup> année, 8 novembre, photo, (anonyme par OFB et Lionel Manceau). Troisième donnée récente, autre victime des fortes tempêtes de début novembre, oiseau recueilli épuisé et transporté en centre de soin.

### **CORMORAN HUPPE *Phalacrocorax aristotelis* (1/1 - 1/1)**

*Polytypique. P. a. aristotelis sur le littoral du nord et de l'ouest de l'Europe.*

**2023 - Sarthe** – Vibraye, 1 1<sup>ère</sup> année, 9 août, photo, (Fabrice Jallu).

Migrateur et hivernant assez peu commun, exceptionnel dans les terres.

Oiseau apporté en soin, rapidement décédé (Fabrice Jallu).

Deuxième donnée depuis la création du CH Maine, 4 autres données plus anciennes pour la Mayenne (1990, 92, 94 et 95) et 1 donnée pour la Sarthe (février 1985 à Marçon Rémi Lépinay (donnée GSO)).

Cormoran huppé,  
Vibraye (Sarthe), 9 août 2023,  
(Fabrice Jallu).



### **IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (7/20 - 5/5)**

*Nicheur régulier en France (Camargue) et plus sporadique dans le sud de l'Europe ; et aussi en Afrique du Nord, Asie centrale, Amérique du Nord et Grandes Antilles. Estivage régulier et reproduction en Loire-Atlantique depuis 2011.*

**2022 - Mayenne** – Le Genest Saint Isle, 3 février, (Bertrand Jarri).

– Azé, 2 août, photo, (Jérôme Boulay).

**2023 - Mayenne** – Bourgon, 1 1<sup>ère</sup> année, 29 juillet au 18 août, photo, (anonyme par Antoine Lefloch).

**2023 - Sarthe** – La Ferté Bernard, 23 septembre, (Virgile Fuchs).

– La Ferté Bernard, 14 au 22 novembre, photo, (Jaouen Verley).

Les années 2020 à 2023 ont recueillies 75% des données.



Ibis falcinelle, La Ferté Bernard (Sarthe), 22 novembre 2023, (Verley Jaouen).

### **BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* (17/36 - 3/3)**

Niche en roselières, en Europe et jusqu'en Russie, au sud de 60° N. Les populations d'Europe de l'ouest sont partiellement migratrices. Celles d'Europe de l'est et de Russie, hivernent au Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen et en Afrique.

**Espèce homologable en dehors des sites de nidification connus en Sarthe.**

**2022 - Sarthe** – Coulaines, 25 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Saint Pavace, 25 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Coulaines, 30 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

Trois données issues des enregistrements nocturnes toutes en migration postnuptiale, il est fort probable que les deux données du 25 août concernent le même oiseau (site distant d'un kilomètre et enregistré à la même heure (Christian Kerihuel)).

Pour mémoire, Sarthe – seulement deux données d'un mâle en **2022** et cinq données un mâle et une femelle en **2023** sans preuve de nidification.

### **CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (2/2 – 1/1)**

Espèce monotypique qui niche essentiellement dans les bassins de la Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Caspienne. Hivernent en Afrique subsaharienne.

**2022 - Mayenne** – Livet, 8 juillet, photo, (Lucas Letessier).

Cinquième donnée mayennaise récente, après 1992, 2000, 2016 et 2020, la troisième depuis la création du CH Maine.

### **GYPAETE BARBU *Gypaetus barbatus* (1/1 – 2/2)**

Polytypique. *G. b. aureus* se reproduit dans les montagnes du sud de l'Europe (y compris la Corse et la Crète) jusqu'à la Mongolie et au Sinaï.

**2023 - Mayenne** – Neau, immature, 22 mai, photo, (anonyme par Lionel Manceau).

Info de 3<sup>ème</sup> main par A. Giret (OFB). Certainement l'un des oiseau(x) revu par la suite en Normandie (Baie du Mont-Saint-michel – 02/06/2023, <https://www.ornithomedia.com/brevs/un-gypaete-barbu-immature-observe-dans-la-manche-normandie-le-2-juin-2023/>) et/ou en Bretagne (Locmaria-Plouzané – 02/06/2023, [https://www.faune-bretagne.org/index.php?m\\_id=54&id=6592280](https://www.faune-bretagne.org/index.php?m_id=54&id=6592280)) ?! - (Lionel Manceau).

- **Mayenne - Sarthe** – Survol le Maine, fem. immature, 3 mai, gps, (par Lionel Manceau).

Individu immature, femelle, nommée Eglazine, baguée et équipée d'une balise GPS dans le cadre du Life Gypconnect et du programme Vulture Conservation foundation. Arrive en Sarthe dans la journée du 03 au 04 mai 2023 à hauteur de Savigné-sous-le Lude jusqu'au nord-ouest de Sillé-le Guillaume, rentre en Mayenne à la Boissière ou elle doit passer la nuit ?! 04/05/2023 : dernier pointage GPS accessible via le portail internet. Possiblement le même oiseau pour lequel la balise ne donnait plus de signaux les jours suivants au nord d'Alençon (entre le 04 et le 08/05/2023), probablement morte (Hugo Touzé comm. pers.).

Source : <https://wildlifemonitor.org/telemetry/public/Eglazine> - (Lionel Manceau).

### **VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (0/0 – 1/1)**

Monotypique. Niche en Espagne, France, Grèce et de l'Ukraine à la Chine.

**2023 - Mayenne** – Survol Mayenne, fem. ad., 22 mars, gps, (anonyme par Lionel Manceau).

Individu bagué issu d'un programme de réintroduction espagnol et équipé d'une balise GPS fait un périple dans l'ouest de la France et passe par la Mayenne avant de redescendre vers les Cévennes (source : google earth, donnée programme Castilla-La -Mancha et Rewilding Europe). Source : <https://www.paysansdenature.fr/un-vautour-moine-fait-un-petit-voyage-dans-louest-de-la-france/>  
Infos complémentaires par Matthieu Vaslin : Arandilla est une femelle adulte (5<sup>ème</sup> année calendaire en 2022) libérée en novembre 2021 sur le Parc Naturel Alto Tajo (Province de Guadalajara), en Espagne. C'est un nouveau programme de réintroduction en partenariat avec le gouvernement autonome de Castilla-La -Mancha et Rewilding Europe, le GREFA participe en apportant des balises GPS. Elle a été capturée blessée à Ciudad Real en octobre 2020 et a passé un an en centre de soins avant d'être relâchée ! Pour la Mayenne elle y a fait un transit le 22 mars dans l'après-midi, elle est rentrée à l'est de Daon à 15h14 pour sortir au nord-ouest de Fontaine-Couverte à 16h13. Altitude de vol, autour de 260-300m au-dessus du sol, donc visible !! (Lionel Manceau).

Première donnée pour la Mayenne et le Maine.

### **CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus* (16/16 – 3/4)**



Niche dans la moitié sud de la France, le sud de l'Europe, l'Afrique du nord, la Turquie, et de la Pologne à la Sibérie centrale et en Inde.

**2022 - Sarthe** – Sillé-le-Guillaume, 1<sup>ère</sup> année, 20 juin, photo, (Franck Noël).

**2023 - Mayenne** – Aron, 1 immature, 9 juillet, photo, (Lionel Manceau, Jérôme Boulay).

- **Sarthe** – Parigné l'Évêque, 2 ind., 6 mai, photo, (Vincent Le Brun).

Nicheur et migrateur peu commun. Quatrième donnée pour la Mayenne depuis 2008 (voir graphique ci-dessous).



### **AIGLE BOTTE *Aquila pennata* (5/5 - 1/1)**

Europe, Afrique du Nord, jusqu'en Asie centrale. La population européenne niche en France, Espagne, et des pays d'Europe centrale à la Grèce. Elle hiverne en Afrique subsaharienne. Deux formes dites « claire » et « sombre » sont distinguées selon leur plumage.

**2023 - Sarthe** – Mézeray, 14 juillet, (Vincent Le Brun).

Seulement la troisième donnée pour la Sarthe depuis la création du CH Maine.

### **PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (7/7 - 2/2)**

Niche du Groenland au Japon, depuis la Méditerranée et les zones tempérées jusqu'aux régions boréales et à la toundra. Espèce liée à la proximité des milieux aquatiques.

**2023 - Mayenne** – Aron, mâle 2<sup>ème</sup> année, 27 au 30 septembre (observé 4 jours mais présent en Mayenne du 15 juin au 16 octobre ([ici](#))), photo, gps, (Jean Luc Reuzé, Lionel Manceau).

- **Sarthe** – Coulans sur Gée, 1 mâle 2<sup>ème</sup> année, 3 avril, gps ([ici](#) et [ici](#)), (anonyme par Lionel Manceau).  
Quatrième donnée pour la Mayenne et septième donnée pour la Sarthe.

### **HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (51/93 – 4/5)**

Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.


**2022 - Mayenne** – Louvigné et Bazougers, 2 ind., du 11 février au 4 mars, photos, (Robin et Julien Souriou, Michel Caigneux).

**2023 - Mayenne** – Simplé et Commer, du 27 octobre au 5 novembre, gps ([ici](#)), (anonyme par Lionel Manceau).

– Saint Laurent des Mortiers, du 18 au 30 novembre, photo, (Jérôme Boulay).

- **Sarthe** – La Ferté Bernard, 29 novembre, photo, (Lenny Tauriac, Jaouen Verley).

Migrateur et hivernant peu commun, observé tous les ans dans le Maine depuis la création du CH Maine (2008), sauf en 2010 et 2020.



Hibou des marais, La Ferté Bernard (Sarthe), 29 novembre 2023, (Lenny Tauriac).

### **GUËPIER D'EUROPE *Merops apiaster* (21/130 - 0/0)**

Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. Nicheur peu commun, localisé et migrateur rare.

### Espèce homologable hors des sites connus de nidification Sarthois.

Aucune donnée hors secteur de non homologation.

### PIC CENDRÉ *Picus canus* (2/2 - 0/0)

Niche de la Bretagne jusqu'à l'Altai, et jusqu'à 65° N.

### Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe.

Aucune donnée hors secteur de non homologation.

Pour mémoire, Sarthe – forêt de Bercé, 5 données pour 5 individus en **2022** et 5 données pour 8 individus en **2023** ; aucune en forêt de Perseigne.

### PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE *Lanius senator* (12/19 - 2/2)

*L. s. senator* niche des Pyrénées jusqu'à l'ouest de la Turquie et, çà et là, à la Pologne au nord. *L. s. badius* niche en Corse Sardaigne et Baléares, ainsi qu'à Capraia, en Italie.

**2022 - Mayenne** – Chemazé, ad., 13 août, (Lionel Manceau).

**2023 - Mayenne** – Montourtier, 1 fem. ad., du 9 juillet au 1 août, photo, (Lionel Manceau, Jérôme Boulay).

Cette femelle a formé un couple avec un mâle de Pie-grièche écorcheur et ont élevé 2 jeunes hybrides. Pour rappel en Mayenne, cette espèce a été nicheuse en 2000, 2002, 2003 et 2020.

### CRAVE À BEC ROUGE *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (0/0 – 1 /1)

Polytypique. *P. p. erythrorhampus* niche de l'Espagne et la France jusqu'à l'Autriche, l'Italie (y compris Sicile et Sardaigne) et peut être la Slovénie. Les oiseaux de Bretagne sont intermédiaires entre cette forme et la sous-espèce nominale *P. p. pyrrhocorax* des îles Britanniques quoique plus proches d'*erythrorhampus* (mais les différentes sous-espèces sont mal différenciées et les variations plutôt clinales).

**2023 - Sarthe** – Lavenay, 29 janvier, photo, (Stephen Irons).

Nicheur peu commun très localisé, sédentaire ou transhumant, exceptionnellement erratiques. Habite certaines falaises et pelouses littorales (Bretagne), ainsi que la moyenne et haute montagne avec falaises et alpage. Première donnée pour le Maine, il s'agit probablement d'un oiseau égaré suite à un fort coup de vent d'ouest.



Crave à bec rouge, Lavenay (Sarthe),  
29 janvier 2023, (Stephen Irons).

### COCHEVIS HUPPÉ *Galerida cristata* (7/13 - 0/0)

Niche de l'Europe centrale jusqu'au nord-ouest de l'Espagne et au nord-est de l'Italie.

### Espèce homologable hors des régions de La Flèche, Sablé, La Ferté-Bernard, du plateau calaisien et de la commune de Souvigné sur Sarthe pour la Sarthe et de Saint Denis d'Anjou pour la Mayenne.

Pour mémoire, les observations en 2022 et 2023 sont principalement faites sur les communes de Saint Denis d'Anjou (53) et de Souvigné sur Sarthe (72), ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

### POUILLOT DE SIBERIE *Phylloscopus collybita ssp. tristis* (7/7 - 1/1)

Niche en Sibérie (Petchora, Oural, jusqu'au fleuve Ienisseï).

A noter qu'en plus d'une description circonstanciée, il est essentiel d'entendre le cri pour identifier cette sous-espèce, qui reste délicate à différencier des autres taxons *abietinus* et *fulvescens*.

**2009 - Sarthe** – La Ferté Bernard, 3 et 4 janvier, photo, (Jean-François Blanc, Fabrice Jallu).

A noter pour la **Mayenne** trois données acceptées en **type sibérien** (*P. c. tristis* / *abietinus* / *collybita*) en l'absence de cri entendu.

**2022 - Mayenne** – Saint Denis d'Anjou, 2 janvier, (Rachel Mackey).

– Villiers Charlemagne, 13 décembre, (Laurence Rousselet).

**2023 - Mayenne** – Villiers Charlemagne, 25 octobre, (Laurence Rousselet).

**ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* (7/9 - 0/0)**

*Niche du nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et à l'Oural.*

**Espèce homologable hors des communes de La Ferté-Bernard et Roullée.**

Pour mémoire, **Sarthe** – seulement 2 données pour **2022**, aucune en **2023** en zone non homologable ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

**LOCUSTELLE LUSCINOÏDE *Locustella luscinioides* (4/4 - 1/1)**

*N-O de l'Afrique et de l'Europe jusqu'à l'ouest de la mer d'Azov.*

**2023 - Mayenne** – Juvigné, 27 et 29 avril, photo, enr. diurne ([ici](#)) (François Duchenne)

Exactement au même endroit que la dernière donnée mayennaise qui date de 2014, sur l'un des rares sites pouvant accueillir cette espèce.



Locustelle luscinoïde,  
Juvigné (Mayenne),  
27 avril 2023,  
(François Duchenne).

**FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (14/17 - 3/3)**

*La sous-espèce nominale niche de l'Europe de l'ouest, de 65° de latitude Nord jusqu'au nord de l'Italie et dans les Balkans, le Grand Caucase et le moyen bassin de la Volga, ainsi qu'en Sibérie occidentale jusqu'aux fleuves Ob et Irtych.*

Espèce homologable hors du nord de la Sarthe, au-dessus d'une ligne Sillé-le-Guillaume - La Ferté-Bernard et hors vallée du Loir de Montabon à Pont de Braye.

**2022 - Sarthe** – Chemiré le Gaudin, 9 mai, (Franck Noël).

– Connerré, 15 mai, enr. diurne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Beillé, 5 septembre, photo, (Antoine Muriani).



Trois nouvelles données deux en déplacement pré-nuptial et une en post-nuptial, aucune pour **2023**.

Pour mémoire en secteur hors homologation, **Sarthe** – **2022** 9 données et 6 en **2023** ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

Fauvette babillarde,  
Beillé (Sarthe),  
5 septembre 2022,  
(Antoine Muriani).

### FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (3/3 - 3/4)

*S. u. undata* niche en Méditerranée occidentale de l'Espagne à l'Italie, y compris le sud de la France. *S. u. dartfordiensis* niche dans les régions atlantiques, du nord du Portugal à l'Angleterre.

Espèce homologable hors de la ceinture des sables cénomaniens au sud du Mans (Auvours, Parigné...), la forêt de Bercé.

**2022 - Mayenne** – Villepail, 15 juillet au 31 octobre, photo, (Robin et Julien Souriou).

**2023 - Mayenne** – Villepail, 1 mâle et 1 fem., 11 janvier au 29 septembre, photo, enr. diurne ([ici](#), [ici](#) et [ici](#)), (Robin et Julien Souriou, Thomas Picq, Lionel Manceau).

– Villiers Charlemagne, mâle, 2 et 3 mars, enr. diurne ([ici](#)), (Laurence Rousselet).

Pour mémoire, **Sarthe** – 9 données pour **2022** et 10 pour **2023** dans les zones de non homologation ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).



Fauvette pitchou,  
Villepail (Mayenne),  
26 juin 2023,  
(Robin et Julien  
Souriou).

### GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris* (14/22 - 0/0)

*C. f. familiaris* niche en Scandinavie, Europe de l'est, jusqu'à la Bulgarie et Russie centrale.

*C. f. macrodactyla* niche de l'Europe de l'ouest à l'Europe centrale.

Espèce homologable hors massifs forestiers de Pail et Multonne en Mayenne et de Bercé et Perseigne en Sarthe.

Pour mémoire en zone non homologable, Mayenne – 2 et 2 données et Sarthe – 2 et 5 données respectivement pour **2022** et **2023** ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

### GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (10/16 - 2/2)

*L. s. svecica* : de la Scandinavie à la Sibérie orientale et à l'Alaska occidental ; *L. s. namnetum* : régions françaises proches de la Manche et de l'Atlantique, entre Ille et Vilaine et Gironde. Hivernent en Afrique subsaharienne, Afrique du nord, péninsule ibérique et au Moyen-Orient.

Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe.



**2022 - Mayenne** – Bourgon, mâle 1<sup>ère</sup> année, 4 et 8 septembre, photo, (Michel Caigneux, Benoît Duchenne, Lionel Manceau).

– Bourgon, fem. 1<sup>ère</sup> année, 20 septembre, photo, (Benoît Duchenne, Jean Luc Reuzé).

Aucune donnée en zone non homologable, cinquième et sixième donnée pour la Mayenne.

Gorgebleue à miroir, Bourgon (Mayenne),  
8 septembre 2022, (Lionel Manceau).

### **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (Centre-atlantique) *Motacilla flava x iberiae* (4/6 - 6/6)**

*Nicheur rare en Aquitaine, en Charente Maritime et pourtour méditerranéen.*

**2022 - Sarthe** – Parcé sur Sarthe, mâle, 28 avril et 1 mai, photo, (Jean-François Darras).

– Parcé sur Sarthe, mâle, 20 mai, photo, (Jean-François Darras).

**2023 - Sarthe** – Parcé sur Sarthe, mâle, 7 avril, photo, (Jean-François Darras).

– Parcé sur Sarthe, mâle, 15 avril, photo, (Jean-François Darras).

– Parcé sur Sarthe, mâle, 19 avril, photo, (Jean-François Darras).

– Parcé sur Sarthe, mâle, 30 avril, photo, (Jean-François Darras).

Visiteur régulier depuis 2018 en Plaine de Parcé sur Sarthe 8 données sur les 10 sont issues de cette plaine.

### **PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris* (6/6 - 5/5)**

*Nicheur dans le sud de l'Europe. Hivérne en Afrique.*

**2022 - Mayenne** – Congrier, 24 août, enr. diurne ([ici](#) et [ici](#)), (Siméon Béasse).



– Congrier, 4 septembre, enr. diurne ([ici](#) et [ici](#)), (Siméon Béasse).

– Congrier, 13 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Siméon Béasse).

**2023 - Mayenne** – Maisoncelles du Maine, 19 août, enr. diurne ([ici](#)), (Lionel Manceau).

- **Sarthe** – Parcé sur Sarthe, 3 septembre, photo, (Jean-François Darras).

Cette espèce demeure extrêmement rare en halte migratoire dans le Maine, des oiseaux en migration active peuvent toutefois être détectés occasionnellement. Espèce certainement sous détectée au passage postnuptial comme le montre les enregistrements qu'ils soient diurnes ou nocturnes.



*Espèce uniquement contactée au passage postnuptial dans le Maine comme le montre ces deux graphiques.*

### **SIZERIN FLAMMÉ / CABARET *Acanthis flammea* / cabaret. (10/42 - 1/1)**

*Niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N.*

**2023 - Mayenne** – Congrier, 25 novembre, enr. diurne ([ici](#) et [ici](#)), (Siméon Béasse).

### **SIZERIN INDETERMINÉ *Acanthis* sp. (77/194 - 2/2)**

*A. flammea niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N. A. cabaret niche en Grande-Bretagne, et de la France jusqu'au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, y compris dans les Alpes.*

**2022 - Mayenne** – Aron, 22 janvier, (Benoît Duchenne, Robin et Julien Souriou).

**2023 - Sarthe** – Lavernat, 11 octobre, enr. diurne ([ici](#)), (Vincent Lebrun).

Pas d'invasion de Sizerin lors de ces deux années.

### **BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (3/3 - 1/1)**

*Niche en Amérique du Nord et Groenland, et du nord de la Scandinavie à la presqu'île de Kola, ainsi qu'aux îles Féroé.*

**2023 - Sarthe** – Le Mans, 15 octobre, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

Deuxième donnée sarthoise depuis la création du CH Maine et première en enregistrement nocturne pour le Maine de ce migrateur et hivernant rare.

## **BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus* (2/2 - 1/1)**

*Niche dans l'Arctique eurasiatique, de la Scandinavie à la Kolyma en Sibérie.*

**2023 - Mayenne** - Congrier, 16 octobre, enr. diurne ([ici](#) et [ici](#)), (Siméon Béasse)

Troisième donnée depuis la création du CH Maine et première donnée en enregistrement pour la Mayenne. L'apparition de cette espèce reste très occasionnelle à l'intérieur des terres.

## **BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (21/29 – 39/50)**

*Monotypique. Se reproduit en Europe et en Turquie au sud-est d'une ligne Lisbonne-Oslo et jusqu'à 100°E.*

**2022 - Mayenne** – Congrier, 18 août, enr. nocturne ([ici](#) et [ici](#)), (Siméon Béasse).

– Coudray, 19 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Lionel Manceau).

– Congrier, 24 août, enr. nocturne ([ici](#) et [ici](#)), (Siméon Béasse).

– Congrier, 4 septembre, enr. nocturne ([ici](#) et [ici](#)), (Siméon Béasse).

– Congrier, 10 septembre, enr. nocturne ([ici](#) et [ici](#)), (Siméon Béasse).

- **Sarthe** – Le Mans, 17 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

– Saint Pavace, 3 ind., 21 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Le Mans, 2 ind., 24 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

– Vion, 24 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Jean-François Darras).

– Saint Pavace, 24 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Saint Pavace, 2 ind., 25 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Coulaines, 2 ind., 26 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Coulaines, 27 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Le Mans, 27 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

– Vion, 27 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Jean-François Darras).

– Coulaines, 28 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Vion, 28 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Jean-François Darras).

– Coulaines, 29 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Vion, 29 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Jean-François Darras).

– Le Mans, 30 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

– Coulaines, 31 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Le Mans, 2 ind., 1 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

– Coulaines, 20 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Coulaines, 21 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

**2023 - Mayenne** – L'Huisserie, 22 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Benoît Duchenne).

– Hardanges, 29 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Robin et Julien Souriou).

– Hardanges, 15 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Robin et Julien Souriou).

- **Sarthe** – Le Mans, 16 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

– Coulaines, 2 ind., 17 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Coulaines, 21 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Le Mans, 2 ind., 29 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

– Le Mans, 30 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

– Coulaines, 30 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Le Mans, 4 ind., 3 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

– Saint Pavace, 9 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).



– Vion, 10 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Jean-François Darras).

– Le Mans, 10 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

– Saint Pavace, 11 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

– Le Mans, 23 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

Espèce qui migre principalement la nuit et souvent en solitaire (certains oiseaux peuvent prolonger leur vol en matinée), elle est rarement contactée de jour. Le passage postnuptial est beaucoup plus marqué que le pré-nuptial. Pic de migration fin août début septembre ces deux années ont particulièrement été favorable comme le montre les deux graphiques ci-dessous.



**BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (1/1 – 1/1)**

*Monotypique. Niche dans les forêts inondées de bouleaux nains et de saules, de la Scandinavie (nord-est Norvège, nord Finlande) jusqu’au nord-est de la Chine.*

**2023 - Mayenne** – Congrier, 23 octobre, enr., diurne ([ici](#) et [ici](#)), (Siméon Béasse).

Espèce occasionnelle, fréquente les milieux ouverts tels que labours, prairies rases, dunes, avec buissons. Deuxième donnée pour la Mayenne.

**OBSERVATIONS D’OISEAUX OCCASIONNELS EN 2022 ET 2023 ACCEPTÉES PAR LE CHN :**

**FULIGULE À TÊTE NOIRE *Aythya affinis* (0/0 – 1/1)**

*Monotypique. Niche dans le nord-ouest des États-Unis, l’Ouest du Canada et l’est de l’Alaska.*

**2022 - Mayenne** – Congrier, mâle ad., du 21 avril au 1 juin, photo, (Quentin Benet-Cibois et al).

Espèce occasionnelle, fréquente les plans d’eau douce ou saumâtre.

**VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius* (1/1 – 1/1)**

*Monotypique. Nicheur rare des milieux steppiques dont l’aire de répartition est aujourd’hui limitée à la moitié nord du Kazakhstan.*

**2022 - Mayenne** – Coudray, 1<sup>ère</sup> année, du 16 au 20 octobre, photos, (Lionel Manceau et al).

Migrateur et hivernant très occasionnel, fréquente des milieux similaires à ceux du Vanneau huppé.

Troisième donnée pour le Maine, deuxième pour la Mayenne et deuxième depuis la création du CH Maine.



Vanneau sociable et Vanneau huppé, Coudray (Mayenne), 18 octobre 2022, (Lionel Manceau).

**AIGLE IMPÉRIAL *Aquila heliaca* (0/0 – 1/1)**

*Monotypique. Turquie, Asie occidentale et centrale.*

**2022 - Mayenne** – Château-Gontier, fem. 2<sup>ème</sup> année, 29 au 31 mars, photo, gps ([ici](#)), (anonyme par Lionel Manceau).

Migrateur occasionnel. Forêts de moyenne altitude et steppes.

Première donnée pour le Maine et seulement la onzième donnée pour la France.



Aigle impérial, Château-Gontier (Mayenne),  
30 mars, (Jean-François Arcanger).



Aigle impérial, Château-Gontier (Mayenne),  
30 mars, (Thierry Le Roux).

### **PIPIT À DOS OLIVE *Anthus hodgsoni* (0/0 – 1/1)**

*Polytypique. A. h. yunnanensis, observée en Europe, niche dans l'Oural, en Asie septentrionale jusqu'au Kamtchatka, au sud jusqu'en Mongolie, ainsi qu'en Manchourie et sur Hokkaido, Japon.*

**2022 - Sarthe** – Coulaines, 9 octobre, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

Migrateur occasionnel. Fréquente les prairies, les lisières de haie, les milieux humides et buissonneux. Première pour le Maine. Année fructueuse pour cette espèce de nombreuses données ont été enregistrées en 2022 voir <https://www.faune-france.org/>.

### **OBSERVATIONS EFFECTUÉES AU-DELA DES DATES EXTRÊMES CONNUES ACCEPTÉES PAR LE CH MAINE EN 2022 et 2023 :**

#### **HÉRON POURPRÉ *Ardea purpurea***

**2023 - Sarthe** – Coulaines, donnée précoce, le 28 mars, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

#### **CIGOGNE NOIRE *Ciconia nigra***

**2022 - Mayenne** – Saint Denis de Gastines, donnée précoce, 24 et 26 février, (Flavie Perrier).

– Vimarcé, donnée précoce, 1 mars, photo, (Sylvain Périgois).

– Villepail, donnée précoce, 16 mars, (Jean-François Arcanger).

**2023 - Mayenne** – Fromentières, donnée tardive, 16 novembre, (Alain Giret).

#### **ÉCHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus***

**2022 - Sarthe** – Fillé sur Sarthe, donnée précoce, 29 mars au 5 avril, photo, (Hervé Julliot et *al.*).

#### **PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius***

**2022 - Mayenne** – Mézangers, donnée précoce, 2 mars, photo, (Robin et Julien Souriou).

#### **GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula***

**2022 - Mayenne** – Saint Brice, donnée précoce, 18 février, (André Darras).

#### **PLUVIER ARGENTÉ *Pluvialis squatarola***

**2023 - Sarthe** – Le Mans, donnée précoce, 4 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).

#### **HUPPE FASCIÉE *Upupa epops***

**2022 - Sarthe** – Saint Gervais en Belin, donnée tardive, 14 décembre, (anonyme par Jean-Yves Renvoise).

#### **HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica***

**2023 - Sarthe** – Parnennes, donnée tardive de 2 ind., 23 novembre, (Franck Noël).

**ROSSIGNOL PHILOMÈLE *Luscinia megarhynchos***

**2023 - Mayenne** – Louverné, donnée tardive, 5 septembre, (François Duchenne).  
– Saint Pierre sur Orthe, donnée tardive, 5 septembre, (Franck Noël).

**ROUGEQUEUE À FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus***

**2023 - Mayenne** – Saulges, donnée tardive, 4 novembre, (Antoine Lefloch).

**TARIER DES PRÉS *Saxicola rubetra***

**2023 - Mayenne** – Villiers Charlemagne, donnée tardive, 9 et 10 novembre, (Laurence Rousselet).

**GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus***

**2022 - Mayenne** – Hardanges, donnée précoce, 25 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Robin et Julien Souriou).  
– Sarthe – Coulaines, donnée précoce, 26 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).  
**2023 - Sarthe** – Coulaines, donnée précoce, 11 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

**MERLE À PLASTRON *Turdus torquatus***

**2022 - Mayenne** – Coudray, donnée tardive, 31 octobre, (Lionel Manceau).

**LOCUSTELLE TACHETÉE *Locustella naevia***

**2023 - Sarthe** – Jupilles, donnée précoce, 24 mars, enr. diurne, (Vincent Lebrun).

**POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus***

**2022 - Mayenne** – Ménil, donnée tardive, 19 octobre, (Lionel Manceau, Jérôme Boulay).

**GOBEMOUCHE GRIS *Muscicapa striata***

**2022 - Mayenne** – La Selle Craonnaise, donnée tardive, 16 octobre, (Lionel Manceau).

**LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus***

**2022 - Sarthe** – Saint Rémy du Val, donnée précoce, 5 avril, (Titouan Basset).

**OBSERVATIONS D'OISEAUX OCCASIONNELS NON ACCEPTÉES PAR LE CH MAINE EN 2022 et 2023 :**

La non homologation d'une donnée ne préjuge évidemment pas de l'identité de l'oiseau observé et encore moins de la compétence ou de la crédibilité de l'observateur(trice), mais d'une description insuffisante et peu ou pas documentée.

**MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra***

**2023 - Mayenne** – 13 septembre. L'enregistrement de faible niveau et sonagramme associé pas convaincant ne permettent pas de confirmer cette espèce.

**CAILLE DES BLÉS *Coturnix coturnix***

**2022 - Sarthe** – 12 février. A cette époque de l'année une Caille du Japon ne peut être exclue.

**PLONGEON IMBRIN *Gavia immer***

**2022 - Sarthe** – 26 mars. Le peu d'éléments fournis, même s'ils vont dans le sens de cette espèce, ne suffisent pas au CH Maine pour valider cette donnée.

**CIRCAÈTE JEAN LE BLANC *Circaetus gallicus***

**2022 - Mayenne** – 17 avril. Le manque de description, malgré des remarques allant dans le bon sens, ne permet pas de valider cette espèce.

– 5 juin. Possible mais la description fournie est insuffisante pour pouvoir accepter cette donnée.

**2023 - Mayenne** – 30 mai. Le fait de voir un serpent dépassant du bec de l'oiseau est un élément plutôt favorable mais d'autres espèces de rapaces peuvent avoir le même comportement aussi le CH Maine ne peut valider cette donnée sur ce simple élément.

- **Sarthe** – 27 mai. Même remarque que ci-dessus.

#### **MILAN NOIR *Milvus migrans***

**2023 - Sarthe** – 27 septembre. Donnée tardive. Sans vouloir remettre en cause l'identification, la non description de l'oiseau ne permet pas au CH Maine d'accepter cette donnée.

#### **BONDRÉE APIVORE *Pernis apivorus***

**2022 - Sarthe** – 4 avril. Donnée précoce. Aucune description pour une date très précoce (habituellement dans le Maine les premières arrivées se font après le 20 avril) aussi le CH Maine ne peut accepter cette donnée.

#### **MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana***

**2023 - Mayenne** – 4 avril. L'enregistrement de faible niveau et sonagramme associé pas convaincant ne permettent pas de confirmer cette espèce.

#### **GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans***

**2023 - Mayenne** – 15 janvier. La photo accompagnant la donnée ne permet pas de confirmer un pontique.

**2022 - Sarthe** – 8 mars. Description assez convaincante mais comme le précise le règlement du CH Maine les données de pontique non accompagnées de photo ne sont pas validées.

#### **BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba***

**2023 - Sarthe** – 30 août. La description insuffisante ne permet pas au CH Maine de confirmer un sanderling.

#### **PETIT-DUC SCOPS *Otus scops***

**2022 - Mayenne** – 19 juillet. Ce son peut être émis aussi par un petit crapaud l'Alyte ce qui paraîtrait plus logique au vu de la situation géographique.

#### **TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla***

**2022 - Mayenne** – 27 mars. Donnée précoce. Donnée non acceptée pas de description.

#### **PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris***

**2023 - Sarthe** – 30 juillet. La description fournie est insuffisante et ne permet pas au CH Maine de confirmer cette espèce.

#### **FAUVETTE BABILLARDE *Curruca curruca***

**2023 - Sarthe** – 30 avril. Donnée hors secteur non homologable. La simple description du cri ne permet pas au CH Maine de confirmer cette espèce.

#### **HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta***

**2023 - Sarthe** – 29 mars. Donnée précoce. La simple remarque accompagnant cette donnée est insuffisante au CH Maine pour pouvoir valider cette donnée.

#### **GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva***

**2022 - Sarthe** – 2 septembre. S'agissant d'une première pour la Sarthe, le CHM ne peut valider cette donnée non accompagnée de document probant (photo, vidéo et ou enregistrement) comme le prévoit le règlement du CHM et ce malgré une description somme toute convaincante avec toutefois une date d'observation très précoce pas de donnée en 2022 avant le 3 octobre sur Faune France.

## **PIE-GRIÈCHE GRISE *Lanius excubitor***

**2022 - Mayenne** – 12 novembre. Donnée non acceptée par le CH Maine, oiseau observé au passage en voiture et non revu les jours suivants.

**2023 - Mayenne** – 5 juillet. Description insuffisante ne permet pas au CH Maine de confirmer cette espèce. De plus elle est rare en France en période de nidification.

## **REMERCIEMENTS**

Le CH Maine tient à remercier vivement celles et ceux qui ont contribué à son fonctionnement au cours des années 2022 et 2023 :

- les organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : Mayenne Nature Environnement, le Groupe Sarthois Ornithologique, le Groupe Ornithologique des Avaloirs, la LPO Sarthe, les CPIE du Bas Maine (53) et Vallées de la Sarthe et du Loir (72), SNE, et le CEN Pays de la Loire ;
- la liste de diffusion Obsmaine, le site Biolovision et sa base de données en ligne Faune-Maine, qui a engrangé 147500 données d'oiseaux, en **2022** et 135987 en **2023** sur les deux départements (Mayenne et Sarthe).
- tous les ornithologues, naturalistes et observateurs, dessinateurs et photographes, sans qui le CH Maine ne fonctionnerait pas.
- François Duchenne pour ses graphiques.
- Lionel Manceau pour les données GPS.

## **BIBLIOGRAPHIE**

- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., TAVENON D., 2007- Statut des Oiseaux de la Mayenne, mise à jour, 31/12/2007 in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n°24, p.41-53.
- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., MADIOT D. & TAVENON D., 2015- Statut des Oiseaux de la Mayenne, nouvelle mise à jour, décembre 2015, à paraître, in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences.
- Commission de l'Avifaune Française, 2007 - Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos* 14 (4) : p.234-246, septembre-octobre 2016
- Coordination régionale LPO Pays de la Loire, collectif, 2008 - Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 221 p.
- DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008 - Nouvel inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.
- DUBOIS P-J., DUQUET M., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2014 - *Notes d'Ornithologie Française*, deuxième mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France, *Ornithos* 21-4 : p. 169-213 (2014).
- DUCHENNE B. & F., 2014 - Synthèse des observations d'espèces occasionnelles en Mayenne, in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n° 30.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2005 à 2009 - Inventaires de l'avifaune sarthoise & Observatoire de l'avifaune en Sarthe du GSO. *Sitta cénomane* - suppléments aux bulletins GSO n° 31 à 35.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1977 à 2014 - Bulletins du Groupe Sarthois Ornithologique & *Sitta cénomane* – revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 1 à 44.
- REEBER S., KAYSER Y. & le CHN, 2016 - Les oiseaux rares en France en 2015. 33<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 23-6 : 300-329 (2016).
- LPO Sarthe, 2000 à 2016 - *Le Tarier pâtre puis Sur les chemins de Lacampagne*. Bulletin annuel d'ornithologie de la LPO Sarthe n° 1 à 16.
- MARCHADOUR B. (coord.), 2014. *Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014, 576 p.
- Mayenne-Nature-Environnement, 1982 à 2016 - Chroniques ornithologiques & espèces occasionnelles observées en Mayenne in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne-Sciences n° 1 à 35.
- REEBER S., BLANC J.F., JIGUET F. & le CHN - Les oiseaux rares en France en 2016 et 2017. 34<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 25-6 : 321-369 (2018).
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°47 décembre 2017. Afflux de Sizerins cabarets dans le Nord-Ouest de la France au cours de l'hiver 2018 par Gilles Paineau.

- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°49 mars 2019. Synthèse des observations ornithologiques sarthoises – sélection des faits marquants de 2018- Collectif GSO.
- OLIVIER POISSON et ROMAIN PROVOST - Afflux de Sizerins en France lors de l'hiver 2017-2018 : analyse à l'aide du baguage. *Ornithos* 26-5 Septembre-Octobre 2019 (n°139).
- HUGO TOUZE, SEBASTIEN REEBER & le CHN - Les oiseaux rares en France en 2018. 35<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 27-4 : 201-235 (2020).
- COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANCAISE – Liste officielle des oiseaux de France – version 2020. *Ornithos* 27-3 : 170 -185 (2020).
- DURIGNEUX J.M. – première mention Sarthoise récente du Bruant ortolan – *Sitta cénomane* – Bulletin GSO n° 47 décembre 2017.
- WROZA S. – Connaître les vocalisations des marouettes : un atout précieux pour les détecter – *Ornithos* 27-3 : n°143 Mai - Juin 2020.
- CORNILLEAU A – Nidification sarthoise en vallée du Loir de deux colonies de Guêpiers d'Europe – *Sitta cénomane* – revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 51 mars 2021.
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°52 janvier 2022. Synthèse des observations ornithologiques sarthoises – sélection des faits marquants de 2020- Collectif GSO.
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°53 janvier 2023. Dossier spécial La Lande du Mans.
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°54 janvier 2023. Numéro spécial, recensements des oiseaux d'eau en Sarthe 60 ans. Synthèse des observations ornithologiques sarthoises – sélection des faits marquants de 2021- Collectif GSO.
- HUGO TOUZE & le CHN - Les oiseaux rares en France en 2019. 36<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 29-4 : 193-239 (2022).
- Coordonné par Jérémy DUPUIS & Louis SALLÉ – Atlas des Oiseaux Migrateurs de France – Biotope ÉDITION (2022).

Ce rapport doit être référencé comme suit :

CH Maine – Les oiseaux rares en 2022 et 2023 dans le Maine - 15<sup>ème</sup> rapport et 16<sup>ème</sup> rapports du comité d'homologation du Maine.

Le 02/04/2024

