

Liste des espèces à homologuer par le CH Maine à compter du 01.01.2020

Le comité d'homologation du Maine a pour mission de valider les espèces recensées par le CMR (Comité national des Migrateurs Rares) et toutes les espèces occasionnelles en Mayenne et en Sarthe (moins d'une observation par an en moyenne dans chaque département).

Sont à homologuer les espèces et sous-espèces présentes dans les listes ci-dessous et toutes celles n'ayant jamais été observée ou non revues depuis 1980 dans le Maine et qui ne figurent pas sur la liste du comité d'homologation national (CHN). La nomenclature et l'ordre utilisés sont ceux de la liste des oiseaux de France – version 2016 publiée dans Ornithos 23-5 établie par la Commission de l'avifaune française.

Cygne de Bewick <i>Cygnus columbianus</i>	Labbe à longue queue <i>Stercorarius longicaudus</i>
Cygne chanteur <i>Cygnus cygnus</i>	Grand Labbe <i>Stercorarius skua</i>
Oie des moissons (toundra) <i>Anser fabalis rossicus</i>	Mergule nain <i>Alle alle</i>
Oie rieuse <i>Anser albifrons</i>	Sterne hansel <i>Gelochelidon nilotica</i>
Fuligule à bec cerclé <i>Aythya collaris</i>	Sterne caspienne <i>Hydroprogne caspia</i>
Fuligule nyroca <i>Aythya nyroca</i> (53 uniquement)	Guifette leucoptère <i>Chlidonias leucopterus</i>
Fuligule milouinan <i>Aythya marila</i> (72 uniquement)	Sterne caugek <i>Sterna sandvicensis</i>
Eider à duvet <i>Somateria mollissima</i>	Sterne arctique <i>Sterna paradisaea</i>
Harelde boréale <i>Clangula hyemalis</i>	Mouette tridactyle <i>Rissa tridactyla</i>
Macreuse noire <i>Melanitta nigra</i>	Goéland à bec cerclé <i>Larus delawarensis</i>
Macreuse brune <i>Melanitta fusca</i>	Goéland pontique <i>Larus cachinnans</i> (#)
Harle piette <i>Mergellus albellus</i>	Goéland à ailes blanches <i>Larus glaucooides</i>
Harle huppé <i>Mergus serrator</i>	Goéland bourgmestre <i>Larus hyperboreus</i>
Plongeon catmarin <i>Gavia stellata</i>	Petit-duc scops <i>Otus scops</i>
Plongeon arctique <i>Gavia arctica</i>	Hibou des marais <i>Asio flammeus</i>
Plongeon imbrin <i>Gavia immer</i>	Martinet à ventre blanc <i>Apus melba</i>
Océanite culblanc <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Guêpier d'Europe <i>Merops apiaster</i> (#)
Fou de Bassan <i>Morus bassanus</i>	Pic cendré <i>Picus canus</i> (#)
Cormoran huppé <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Faucon kobez <i>Falco vespertinus</i>
Blongios nain <i>Ixobrychus minutus</i> (#)	Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor</i>
Crabier chevelu <i>Ardeola ralloides</i>	Pie-grièche à tête rousse <i>Lanius senator</i>
Ibis falcinelle <i>Plegadis falcinellus</i>	Cassenoix moucheté <i>Nucifraga caryocatactes</i>
Flamant rose <i>Phoenicopterus roseus</i>	Corneille mantelée <i>Corvus cornix</i>
Ibis sacré <i>Threskiornis aethiopicus</i>	Grand Corbeau <i>Corvus corax</i>
Grèbe jougris <i>Podiceps grisegena</i>	Rémiz penduline <i>Remiz pendulinus</i>
Grèbe esclavon <i>Podiceps auritus</i>	Mésange boréale <i>Poecile montanus</i>
Elanion blanc <i>Elanus caeruleus</i>	Panure à moustaches <i>Panurus biarmicus</i>
Pygargue à queue blanche <i>Haliaeetus albicilla</i>	Cochevis huppé <i>Galerida cristata</i> (#)
Vautour fauve <i>Gyps fulvus</i>	Hirondelle rousseline <i>Cecropis daurica</i>
Circaète Jean-le-Blanc <i>Circaetus gallicus</i>	Pouillot à grands sourcils <i>Phylloscopus inornatus</i>
Busard pâle <i>Circus macrourus</i>	Fauvette babillarde <i>Sylvia curruca</i> (#)
Buse pattue <i>Buteo lagopus</i>	Fauvette pitchou <i>Sylvia undata</i> (#)
Aigle botté <i>Aquila pennata</i>	Locustelle lusciniôide <i>Locustella luscinioides</i>
Aigle de Bonelli <i>Aquila fasciata</i>	Phragmite aquatique <i>Acrocephalus paludicola</i>
Marouette ponctuée <i>Porzana porzana</i> (#)	Rousserolle verderolle <i>Acrocephalus palustris</i> (#)
Marouette poussin <i>Zapornia parva</i>	Rousserolle turdoïde <i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Râle des genêts <i>Crex crex</i>	Jaseur boréal <i>Bombycilla garrulus</i>
Outarde canepetière <i>Tetrax tetrax</i>	Tichodrome échelette <i>Tichodroma muraria</i>
Huitrier pie <i>Haematopus ostralegus</i>	Grimpereau des bois <i>Certhia familiaris</i> (#)
Guignard d'Eurasie <i>Charadrius morinellus</i> (#)	Etourneau roselin <i>Pastor roseus</i>
Gr. à collier interrompu <i>Anarhynchus alexandrinus</i>	Gorgebleue à miroir <i>Luscinia svecica</i> (#)
Barge rousse <i>Limosa lapponica</i>	Gobemouche nain <i>Ficedula parva</i>
Tournepierrre à collier <i>Arenaria interpres</i> (#)	Monticole de roche <i>Monticola saxatilis</i>
Bécasseau maubèche <i>Calidris canutus</i>	Accenteur alpin <i>Prunella collaris</i>
Bécasseau cocorli <i>Calidris ferruginea</i>	Pipit de Richard <i>Anthus richardi</i>
Bécasseau de Temminck <i>Calidris temminckii</i>	Pipit rousseline <i>Anthus campestris</i>
Bécasseau sanderling <i>Calidris alba</i>	Pipit à gorge rousse <i>Anthus cervinus</i>
Bécasseau tacheté <i>Calidris melanotos</i>	Pipit maritime <i>Anthus petrosus</i>
Bécasseau falcinelle <i>Limicola falcinellus</i>	Sizerin cabaret <i>Acanthis cabaret</i>
Phalarope à bec large <i>Phalaropus fulicarius</i>	Sizerin flammé <i>Acanthis flammea</i>
Chevalier stagnatile <i>Tringa stagnatilis</i>	Sizerin indéterminé <i>Acanthis sp.</i>
Glaréole à collier <i>Glaucopis pratensis</i>	Bruant nain <i>Emberiza pusilla</i>
Labbe pomarin <i>Stercorarius pomarinus</i>	Bruant des neiges <i>Plectrophenax nivalis</i>
Labbe parasite <i>Stercorarius parasiticus</i>	Bruant lapon <i>Calcarius lapponicus</i>

(#) Espèce à homologuer en dehors des zones de présence régulière connue :

- **Blongios nain** hors des deux sites de nidification connus en Sarthe
- **Marouette ponctuée** hors des communes suivantes : Bazouges sur le loir, La Flèche, Cré-sur-Loir, Vaas
- **Tournepieuvre à collier** hors des communes de La Ferté Bernard et de la Flèche
- **Guignard d'Eurasie** hors des plaines de Parcé et de Mamers (72)
- **Goéland pontique** hors Le lac de Haute Mayenne, le CET de Saint-Fraimbault et la sablière de Glaintain, l'étang d'Olivet et le CET de Changé. Le CHM ne validera les données relatives à cette espèce que si elles sont accompagnées de photographies et/ou de vidéos exploitables, ou mieux encore d'une fiche d'homologation dûment complétée obligatoirement accompagnée de document(s) photographique(s) et/ou vidéo(s). Les données recueillies dans les zones d'exclusion (et donc non soumises à homologation) devront être circonstanciées au maximum (description permettant d'âger les oiseaux) et si possible accompagnées de photographie(s) et/ou vidéo(s).
- **Guêpier d'Europe** hors des sites de nidification connus
- **Pic cendré** hors des massifs de Bercé et de Perseigne (72)
- **Cochevis huppé** hors des régions de la Flèche, de la vallée du Loir, de La Ferté-Bernard, du plateau Calaisien (72) et de la commune de Saint Denis d'Anjou (53).
- **Gorgebleue à miroir** hors de la commune de La Ferté-Bernard
- **Rousserolle verderolle** hors des communes de La Ferté-Bernard et Roullée.
- **Fauvette babillarde** hors du nord de la Sarthe (au-dessus d'une ligne Alençon – Saint Calais) et hors vallée du Loir de Montabon à Pont de Braye.
- **Fauvette pitchou** hors de la ceinture des sables cénomaniens à l'est et au sud de l'agglomération mancelle entre l'autoroute A11 et la RD323 (Auvours, Parigné ..., jusqu'à La Flèche) (72).
- **Grimpereau des bois** hors des massifs forestiers de Pail et Multonne (53) et de Bercé et Perseigne (72)

Sous-espèces à homologuer :

Pouillot de Sibérie / Pouillot de type sibérien *Phylloscopus collybita tristis* Les oiseaux homologués en Pouillot de Sibérie le seront sur la base de la description et du cri. Les oiseaux qui ne sont pas entendus pourront être homologués en Pouillot de type sibérien sur la base de la description du plumage. Les photographies ou vidéos sont recommandées.

Bergeronnette printanière non type, non flavéole *Motacilla flava ssp.*

Bouvreuil des komis (trompeteur) (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*).

Goéland argenté scandinave (*Larus argentatus argentatus*).

Effraie des clochers (guttata) (*Tyto alba guttata*).

Autres observations à homologuer :

Les observations effectuées au-delà des dates fixées par le CHM pour les espèces non sédentaires dans le Maine (Listes de référence en annexe et sur faune-Maine)

Cas des espèces exotiques qui pourraient être issues de populations sauvages ou acclimatées :

Le CH Maine se réserve le droit de demander aux observateurs une fiche pour vérification, au cas par cas. (Validation par le secrétaire et le secrétaire adjoint)

Autres observations à renseigner avec précision mais sans prise en charge par le CH Maine :

Les hybrides : Le CHN et d'autres CH régionaux ne les prenant pas en charge, le CH Maine procédera de même.

Dates d'homologation des migrateurs hivernants au-delà desquelles il est nécessaire de remplir une fiche d'homologation ou de justifier une donnée (photo, vidéo, enregistrement).

Nom de l'espèce	Dates homologation	
	Départ	Arrivée
Butor étoilé	11-avril	23-sept.
Oie rieuse	8-avril	6-nov.
Bernache cravant	18-avril	6-sept.
Fuligule milouinan	22-avril	9-oct.
Garrot à œil d'or	29-avril	27-oct.
Harle bièvre	12-avril	15-nov.
Faucon émerillon	1-mai	2-sept.
Grue cendrée	25-mai	29-août

Pluvier doré	17-mai	27-août
Pluvier argenté	4-juin	20-août
Bécassine sourde	28-avril	10-sept.
Bécassine des marais	7-mai	3-juil.
Goéland marin	23-mai	15-juil.
Pipit spioncelle	22-avril	22-sept.
Bergeronnette de Yarrell	20-avril	5-sept.
Grive litorne	14-mai	22-sept.
Grive mauvis	1-mai	27-sept.
Pinson du nord	21-avril	4-oct.
Tarin des aulnes	17-mai	12-sept.

Dates d'homologation des migrateurs estivants au-delà desquelles il est nécessaire de remplir une fiche d'homologation ou de justifier la donnée (photo, vidéo, enregistrement).

Nom de l'espèce	Dates homologation par le CHM			
	Du	au	et du	au
Sarcelle d'été	09-oct.	23-févr.		
Caille des blés	01-nov.	15-mars		
Héron pourpré	10-oct.	01-avril		
Cigogne noire	16-oct.	20-mars		
Bondrée apivore	01-oct.	20-avril		
Milan noir	08-sept	04-mars		
Busard cendré	11-sept	31-mars		
Balbuzard pêcheur	16-nov.	09-mars		
Faucon hobereau	24-oct.	31-mars		
Echasse blanche	01-sept	05-avril		
Œdicnème criard	non	non		
Petit gravelot	15-oct.	02-mars		
Grand gravelot	03-nov.	28-févr.		
Barge à queue noire	01-déc.	01-févr.		
Courlis corlieu	01-nov.	11-mars		
Chevalier sylvain	10-oct.	02-avril		
Sterne pierregarin	01-nov.	20-mars		
Sterne naine	10-sept	17-avril		
Guifette moustac	20-sept	27-mars		
Guifette noire	19-oct.	03-avril		
Tourterelle des bois	10-oct.	09-avril		
Coucou gris	02-oct.	10-mars		
Engoulevent d'Europe	25-sept	15-avril		
Martinet noir	01-oct.	03-avril		
Huppe fasciée	30-sept	05-mars		
Torcol fourmilier	07-oct.	31-mars		
Hirondelle de rivage	16-oct.	26-févr.		
Hirondelle rustique	10-nov.	27-févr		
Hirondelle de fenêtre	01-nov.	08-mars		
Pipit des arbres	14-oct.	22-mars		
Bergeronnette printanière	22-oct.	19-mars		
Bergeronnette flavéole	04-oct.	22-mars	01-juin	31-juil.
Rosignol Philomèle	05-sept	25-mars		
Rougequeue à front blanc	13-oct.	23-mars		
Tarier des prés	22-oct.	24-mars	01-juin	20-juil.
Traquet motteux	02-nov.	05-mars	10-juin	31-juil.
Merle à plastron	31-oct.	19-mars	15-mai	25-sept

Locustelle tachetée	21-sept	27-mars		
Phragmite des joncs	03-oct.	24-mars		
Rousserole effarvatte	12-oct.	29-mars		
Hypolais polyglotte	21-sept	04-avr.		
Fauvette grissette	13-oct.	25-mars.		
Fauvette des jardins	29-sept.	04-avril		
Pouillot de Bonelli	27-août	01-avril		
Pouillot siffleur	09-sept.	06-avr.		
Pouillot fitis	17-oct.	13-mars		
Gobemouche gris	04-oct.	15-avr.		
Gobemouche noir	03-oct.	31-mars	11-mai	31-juil.
Loriot d'Europe	08-sept	17-avril		
Pie-grièche écorcheur	27-sept	24-avril		

Mis à jour le 13/12/2019