



## LES GRENOUILLES BRUNES

Bien que toutes les espèces d'amphibiens ne pondent pas à la même période, février est un bon mois pour en rechercher certaines. Nous vous invitons à prospecter notamment les grenouilles brunes qui sont, avec le Crapaud épineux, les espèces les plus précoces.

**QUI SONT-ELLES ?** Les adultes présentent une coloration de la face supérieure du corps **brunâtre ou roussâtre**. Un **masque temporal** brun foncé s'étend en arrière de l'œil et recouvre le tympan. Un chevron foncé entre les épaules est souvent présent. On peut les confondre, sinon ce serait trop facile ! D'ailleurs, certaines observations alpines sont parfois sujettes à débat par les spécialistes !

### La Grenouille rousse (*Rana temporaria*)

L'aspect général est **ramassé** avec une **tête courte et épaisse**.



- museau court, arrondi et busqué
- pattes arrières plus courtes
- palmures importantes

© Frank Dhermain

Callosités nuptiales des mâles : brun foncé ou noires

Le **chant**, d'intensité faible, fait penser au ronronnement grave d'une panthère.

La ponte est un **amas d'œufs**. Typiquement cet amas est flottant **et non attaché à la végétation**. Il **s'étale** davantage à la surface de l'eau. Par ailleurs, la rousse pond plus tôt que l'agile.



© Marc Corail

### La Grenouille agile (*Rana dalmatina*)

L'aspect général est **élané**.



- museau long et proéminent
- pattes arrières longues

© Gaëtan Jouvinez

Callosités nuptiales des mâles : grises

Le **chant**, d'intensité faible est émis au fond de l'eau et fait penser aux frottements saccadés d'un chiffon sur une vitre mouillée.

La ponte est un amas de la taille du poing environ. Il est **fixé à la végétation**, juste sous la surface de l'eau et affleurant à peine.



© Aurélie Johanet



## La Grenouille rousse (*Rana temporaria*)

C'est l'amphibien qui atteint les plus hautes altitudes : jusqu'à 2 800 m dans les Alpes. Elle vit dans les prairies, pâturages, forêts. Elle pond dans une diversité de milieux stagnants ou légèrement courants : lacs, étangs, mares, fossés, tourbières...




Lac de montagne © François Grimal

## La Grenouille agile (*Rana dalmatina*)


Sa présence est généralement associée au boisements et aux fourrés : forêts de plaine, boisements alluviaux, bocages. Elle pond dans des mares, étangs, fossés, ainsi que les ornières, presque toujours en milieu forestier.



Prairie humide © Aurélie Johanet



Source : Faune-paca.org



Source : Faune-paca.org



## ASTUCES SUR FAUNE-PACA


Il est impossible de compter les œufs, donc comptez les pontes :  
1 amas d'œufs de grenouille = 1 ponte !

Précisez au mieux le nombre de pontes.

Renotez-le et choisissez le stade « ponte ».

S'il y avait des adultes, pensez à « ajouter des individus supplémentaires » et cochez éventuellement les cases « accouplement » ou « pond » selon les circonstances.

En cas de doute n'hésitez pas à ajouter une **photo** de l'adulte, la ponte ou le têtards, un **enregistrement** de chant (possible avec le smartphone) ou en **commentaire** tous les détails susceptibles de permettre aux vérificateurs de Faune-PACA de valider la donnée.



NB : En particulier pour les observations herpéto, sur la carte, pointez exactement les observations en choisissant « **Ajoutez une observation précise** ».

**PARTICIPEZ AU DÉFI NATURE SUR FAUNE-PACA.ORG !**

