Les oiseaux rares dans le Tarn, l'Aveyron et le Lot

7ème rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron-Lot

Année 2018

Amaury Calvet, Daniel Latrouite, Samuel Talhoët et le CHTAL.

Introduction

Ce 7ème rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron-Lot (CHTAL) couvre l'année 2018.
197 fiches concernant environ 400 observations[1] ont été examinées (91 tarnaises, 89 aveyronnaises et 16 lotoises). Elles concernent 70 espèces (plus 3 sous-espèces). Le taux d'acceptation global est de 84,3% soit 166 fiches.

En 2018, la composition du Comité d'homologation reste inchangée : Timothée Bonnet (LPO Tarn), Pascal Bouet (LPO Aveyron), Amaury Calvet (LPO Tarn), Pierre Chavanon (LPO Tarn), Patrice Delgado (LPO Tarn - Secrétaire), Alain Hardy (LPO Aveyron), Benjamin Long (LPO Tarn), Samuel Talhoët (LPO Aveyron) et Philippe Tyssandier (LPO Lot).

Le fonctionnement du comité et la liste des espèces soumises à homologation sont consultables sur http://www.faune-tarn-aveyron.org/index.php?m_id=20025

Révision de la liste des espèces soumises à homologation dans le Tarn, l'Aveyron et le Lot.
La liste des espèces soumises à homologation reste inchangée pour l'année 2018 par rapport à l'année 2017 hormis l'introduction de deux exceptions géographiques concernant :

- le Harle bièvre dont les observations sur le secteur de St-Rome-de-Tarn en Aveyron ne sont plus soumises à homologation en raison de la présence d'un couple reproducteur sur cette partie de la vallée du Tarn depuis 2015 ;
- le Grimpereau des bois dont les observations ne sont plus soumises à homologation sur l'Aubrac (nord de l'Aveyron) en raison d'une meilleure connaissance de la répartition de l'espèce (nicheuse régulière sur ce secteur).

Ces deux espèces restent soumises à homologation sur le reste des trois départements.

---

[1] *La différence entre le nombre de fiches examinées et le nombre d'observations concernées est essentiellement liée à des séjours prolongés d'un même oiseau sur un même site, donnant lieu à des observations multiples par des observateurs différents.*

Validation des fiches

Chaque fiche (papier, numérique ou directement saisie en remarque de l'observation sur www.faune-tarn-aveyron.org) qui parvient au comité est examinée par les membres. Une fiche peut être validée ou acceptée par un membre (vote A) ou bien refusée (vote R). Un membre peut aussi demander que la fiche soit discutée en réunion plénière (vote D) ou bien se déclarer non compétent pour donner un avis sur telle ou telle espèce ou pour statuer sur tel ou tel problème d'identification (NC). Si plus de 2 membres se déclarent incompétents, l'avis d'un expert extérieur peut être sollicité. La fiche est acceptée ou refusée par l'avis unanime des membres se déclarant compétents. Dans les autres cas, la fiche est examinée lors de la réunion plénière du CH et doit recevoir un avis unanime. Les données des trois départements sont validées par l'ensemble des membres composant le CH, sans distinction quant à leur origine géographique et départementale. Un membre du CH ayant rédigé une fiche ne participe pas à son examen ni à son homologation. Le CH se réuni en séance plénière au moins une fois par an. La séance plénière traitant de l'année 2018 a eu lieu le 8 décembre 2018 à Recoules-Prévinquières (Aveyron).

Fiche d'homologation

Une fiche d'homologation est constituée de deux parties : une partie *signalement* destinée à recueillir les informations générales concernant l'observation et une partie *description* de l'oiseau observé. Cette dernière, indispensable pour que le comité puisse se prononcer, doit être rédigée à partir des notes prises sur le terrain et non après consultation des guides, ce qui fausse très souvent l'objectivité. Lorsque des photos sont prises, et nous engageons fortement tous les observateurs à essayer de photographier systématiquement les oiseaux lorsque cela ne remet pas en cause l'intérêt de ces derniers (éviter tout dérangement), il est bon de les joindre à la fiche, accompagnées d'une ou deux lignes de commentaires. Un simple croquis annoté ou un dessin constitue également un document précieux, souvent plus fidèles à la réalité qu'une rédaction différée fondée sur le souvenir, d'autant qu'ils peuvent facilement être scannés ou photographiés puis envoyés par courrier électronique. Un ***réel effort de rédaction*** est demandé à tous les observateurs qui nous envoient une fiche. Dans une majorité de situations, il est tout à fait possible de faire une description claire et sans ambiguïté en quelques lignes. Une bonne description se contente de lister les uns sous les autres les critères déterminants qui ont permis l'identification. Cette méthode de la liste de critères est beaucoup plus convaincante qu'un long commentaire qui s'attarderait sur des aspects non diagnostiques du plumage.

Rappelons que désormais, afin de faciliter la procédure de transmission des fiches par les observateurs, le CH peut se prononcer directement à partir d'une description suffisamment détaillée renseignée dans l'onglet « Remarque » lors de la saisie de l'observation sur www.faune-tarn-aveyron.org, ainsi qu'à partir de clichés explicites joints à cette dernière. Ce mode de transmission / validation a d'ailleurs été largement majoritaire en 2018 par rapport aux fiches « papier ».

Le Comité tient à remercier chaleureusement les observateurs ayant joué le jeu en lui soumettant leurs observations. Ils ont contribué au succès de cette 7ème année de fonctionnement !

L'année 2018 aura été riche en observations remarquables avec en particulier :

Département de l'Aveyron : 1ères observations de le Barge rousse (Coubissou), de la Sterne caugek (Salles-Curan) et du Sizerin flammé (Millau et Soulages-Bonneval) ; 2ème, 3ème et 4ème observations du Pouillot à grands sourcils (Boisse-Penchot, Espalion et Saint-Affrique).

Département du Tarn : 1ère mention départementale du Pipit de Richard (Labruguière) ; 2nde observation du Pouillot à grands sourcils (Labruguière) ; 3èmes mentions de la Talève sultane (Cambounet-sur-le-Sor) et de l'Huitrier pie (Nages).
A noter également une année record pour le Faucon d'Eléonore tant au niveau du nombre de données (10) que de l'effectif maximal avec un groupe d'au moins une dizaine à Arfons.

Département du Lot : 1ères mentions de Garrot à œil d'or (Le Roc), de Busard pâle (Cavagnac) et de Sterne caugek (Sénaillac-Latronquière) ; 2nde observation de Mouette pygmée (Felzins).

Liste systématique des données homologuées

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.

2. Dates pour lesquelles l'espèce est soumise à homologation.

3. Entre parenthèses, les chiffres représentent respectivement le nombre de données et le nombre d'individus correspondant homologués en 2018.

4. Présentation des données par année classées par ordre alphabétique des départements.

5. Commune par ordre alphabétique.

6. Effectif (si non précisé : se réfère à 1 individu).

7. Age et sexe si connus. (fem. = femelle ; ad. = adulte ; imm. = immature ; pull = poussin ; 1A = 1re année civile ; 2A = 2ème année civile).

8. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.

9. Précision si l'oiseau a été photographié (photo), enregistré en vidéo (vidéo) ou sur bande audio (enr.) ou dessiné (croq.).

10. Date(s) d'observation.

11. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique). La mention *et al.* Indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseaux en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné dans le rapport CHTA est celui du découvreur.

La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux de France (CAF 2007), complétée par les mises à jour publiés par la CAF (Jiguet *et al.* 2009).

Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Garrot à œil d'or – Le Roc, 26 février 2018 (J. Knappert), *in Calvet A., Latrouite D., Talhoët S. et al. (2024). Septième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron-Lot – année 2018. CHTAL*

Afin que chaque observateur ait un aperçu global des observations d'oiseaux rares dans la région, le rapport du CHTAL mentionne également les données d'espèces présentes sur la liste nationale et observées dans l'Aveyron, le Lot et le Tarn l'année couverte par ce rapport (quand l'information est disponible) ainsi que l'année précédente. Ces données, homologuées ou au contraire rejetées par le Comité d'Homologation National, sont extraites des rapports annuels de ce comité et figurent ci-après, précédées de la mention CHN.

SARCELLE D'ETE *Anas querquedula* (1er octobre - 29 février) **(1/1)**

Tarn – Labruguière, photo, 3 novembre, (B. Long).

Le passage post-nuptial intervient entre fin juillet et fin septembre, mais s'observe occasionnellement dans la région en octobre et novembre (au moins 6 cas indépendants depuis 1992).

FULIGULE MORILLON *Aythia fuligula* (1er mai – 30 septembre) **(3/2)**

Tarn – Lasgraisses, photo, 28 juillet (J.P. Berlic) ; Cambournet-sur-le-Sor, 1 mâle, 23 août-au 8 septembre (A. Calvet, S. Maffre)

Les données estivales sont peu nombreuses (9 données entre 2003 et 2017, dont 7 dans le Tarn et 2 en Aveyron). Trois observations ont été faites dans le Tarn hors période habituelle de présence (octobre à mars-avril) dont une relative à un mâle qui a séjourné plus de deux semaines à Cambounet-sur-le-Sor.

GARROT A ŒIL D'OR *Bucephala clangula* (1er janvier – 31 décembre) **(1/4)**

Lot – Le Roc, 4 mâles ad., 26 février (J. Knappert).

Première observation *dans le Lot de ce canard plongeur qui, par ailleurs, n'a été signalé qu'à trois reprises en Aveyron (janvier 1987, mars 2011 et mars 2017). Dans le Tarn, l'espèce qui était assez régulière en très petit nombre en hiver durant les années 1990 n'a fait qu'une apparition depuis le début du XXIème siècle, en janvier et février 2011 à Albi.*

HARLE HUPPE *Mergus serrator* (1er janvier – 31 décembre) **(3/1)**

Aveyron – Saint-Chély-d'Aubrac, mâle ad., photo, 22 et 24 novembre (G. Alric, P. Ayral, S. Talhoët).

Un mâle adulte séjourne au moins 3 jours sur le lac des Moines situé à 1 300 m d'altitude. Il s'agit seulement de la 4ème mention de l'espèce pour le département de l'Aveyron, la dernière remontant à janvier 2009 sur le lac de Montézic (P. Bouet).

HARLE BIEVRE *Mergus merganser* (1er janvier – 31 décembre) **(5/3)**

Tarn – Nages, 1 mâle et 1 fem., photo, 19 novembre au 28 novembre (F. Bonnet) ; Nages, fem., 25 décembre (F. Bonnet).

En raison de la présence d'un couple reproducteur dans la vallée du Tarn (secteur St-Rome-de-Tarn – en Aveyron) depuis 2015, les observations du Harle bièvre sur ce secteur ne sont plus soumises à homologation. En 2018, une femelle et 5 poussins sont observés début mai mais une diminution progressive des poussins jour après jour a été constatée (fort soupçon de prédation par le Goéland leucophée). Aucune observation n'a été rapportée ailleurs dans le département cette année.
Dans le Tarn, le Harle bièvre est un hivernant rare, qui n'avait pas été noté depuis 2013.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (1er janvier – 31 décembre) **(11/1)**

Tarn – Sorèze, 1A, photo, 20 au 31 décembre (J.M. Coste, C. Daussin *et al*.).

Site d'observation « classique » pour cet hivernant rare dans le Tarn, le Bassin de Saint-Ferréol (limite avec l'Aude et la Haute-Garonne) à l'extrémité occidentale de la Montagne noire fournie la très grande majorité des données tarnaises.

Plongeon imbrin, Sorèze, 21 décembre
Photo Claude Daussin

GREBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis* (1er janvier – 31 décembre) **(23/12)**

Aveyron – Canet-de-Salars, 19 novembre (S. Talhoët) ; Soulages-Bonneval, 23 novembre (P. Ayral).

Tarn – Labruguière, 1 à 3 ind., photo, 23 août au 3 septembre (M. Malaterre, C. Daussin *et al*.) ; Sauveterre, 1 à 3 ind., photo, 7 au 13 mai (M.J. Parayre, C. Daussin *et al*.) ; Sorèze, 2 ind., photo, 1er et 14 janvier (J.M. Coste) ; Sorèze, 1A, 30 octobre (J.M. Coste) ; Sorèze, 28 décembre (J.M. Coste).

Ce petit grèbe n'est pas observé chaque année en Aveyron. La majorité des observations sont réalisées sur les grands plans d'eau (lac de Pareloup, lac de Montézic, lac de Bage). Cela a été le cas en 2018 mais on peut toutefois signaler la 1ère mention de l'espèce sur le lac des Galens.
Le Grèbe à cou noir est par contre d'apparition plus fréquente dans le département du Tarn où des observations ont lieu chaque année en périodes migratoires et hivernales, à l'image des données de 2018.

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris* (1er janvier – 31 décembre) **(2/1)**

Tarn – Cuq, photo, 3 août (B. Long, C. Long).

Il s'agit de la 7ème donnée seulement pour le Tarn pour cette espèce rare, discrète et en net déclin en France comme ailleurs en Europe. La date d'observation estivale est à souligner (déplacement postnuptial précoce ?) car les six mentions précédentes se répartissent plus classiquement entre les mois de novembre et mai.

Butor étoilé, Cuq, 3 août
Photo Benjamin Long

HERON POURPRE *Ardea purpurea* (15 octobre – 15 mars) **(1/1)**

Lot – Cénevières, 6 novembre (J.C. Thuillier).

Dans notre région le passage post-nuptial se termine normalement début octobre. Cette observation est la plus tardive dans le Lot et plus en général pour nos départements, hormis un juvénile trouvé mort dans le Tarn le 11 novembre 2013.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (1er janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Tarn – Técou, photo, 25 juin (C. Bernard).

L'espèce est notée presque annuellement dans le Tarn depuis 2010, suite à une rapide augmentation des effectifs nicheurs sur le littoral méditerranéen.

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (1er janvier – 31 décembre) **(1/2)**

Tarn – Fréjeville, 2 ad., 16 mars (B. Long).

13ème mention tarnaise pour ce migrateur très rare. Comme toutes les précédentes, cette observation a été réalisée sur le complexe de gravières de Cambounet-sur-le-Sor et Fréjeville.

MILAN NOIR *Milvus migrans* (1er novembre – 31 janvier) **(6/5)**

Tarn – Graulhet, photo, 27 janvier (B. Long) ; Labessière-Candeil et Montdragon, 27 et 28 janvier (B. Long, S. Maffre) ; Montdragon, 13 janvier (B. Long) ; Labessière-Candeil, 26 décembre (S. Maffre) ; Saint-Pierre-de-Trivisy, 17 janvier (S. Maffre).

*Les deux principaux dortoirs de Milans royaux (*Milvus mlilvus*) tarnais ont accueillis un Milan noir hivernant chacun. L'hivernage de l'espèce est annuel dans la région depuis 2006.*

BUSARD PALE *Circus macrourus* (1er janvier – 31 décembre) **(2/2)**

Aveyron – Villefranche-de-Rouergue, mâle, photo, 4 avril (G. Cantaloube).

Lot – Cavagnac, mâle ad., photo, 5 avril (M. Vérité).

Il s'agit seulement de la 4ème observation aveyronnaise après 2008, 2012 et 2016 et de la 1ère mention de ce busard dans le Lot. Ces observations sont à replacer dans le contexte national où de plus en plus d'oiseaux sont observés chaque année.

Busard pâle, Cavagnac, 5 avril
Photo Mathis Vérité

CHN – AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (1er janvier – 31 décembre) **(3/1)**

Aveyron – mâle, données de balise GPS, Thérondels, 18 octobre (anonyme), Grand-Vabre, Galgan, La Fouillade, Malleville, 19 octobre (anonyme).

Tarn – Labessière-Candeil, mâle, photo et données de balise GPS, 20 octobre (C. Mroczko).

Tõnn, un Aigle criard mâle né en 2008 en Estonie. La balise Argos dont il est équipé a permis d'établir qu'il a survolé l'Aveyron en 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, le Lot en 2017 et le Tarn 2017 et 2018. La première observation visuelle en a été faite dans des conditions peu favorables le 20 octobre 2018 dans le Tarn (cf. photo). A noter que ce même 20 octobre, un individu de 1ère année a été noté en migration active à Mazamet (observation soumise au CHN).

Aigle criard, Labessière-Candeil.
Photo Cédric Mroczko

AIGLE DE BONELLI *Aquila fasciata* (1er janvier – 31 décembre) **(2/2)**

Aveyron – Millau, imm., 26 octobre (F. Legendre) ; Salles-Curan, 1A, photo, 11 décembre (E. Dumain).

Ce rapace, d'apparition occasionnelle mais régulière dans le département de l'Aveyron, est généralement observé dans les gorges de la Jonte ou dans les gorges du Tarn. Il est beaucoup plus rare en dehors de ces secteurs. L'observation de 2018 sur le Lévézou est une première pour cette région.

Aigle de Bonelli. Salles-Curan, 11 décembre
Photo Emmanuel Dumain

AIGLE BOTTE *Aquila pennata* (1er octobre – 15 mars) **(2/2)**

Tarn – Coufouleux, forme claire, photo, 24 février (J.P. Grèzes) ; Jonquières, forme claire, 7 octobre (S. Maffre).

Deux mentions en dehors des dates de présence classiques de l'espèce dans le département du Tarn en 2018 : si la 1ère n'exclue pas un possible cas d'hivernage (ou un retour précoce), la seconde concerne un migrateur tardif.

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus* (1er janvier – 31 décembre) **(2/2)**

Aveyron – Saint-Affrique, type fem., 20 mai (V. Romera) ; Saint-Rome-de-Cernon, fem. ad., photo, 7 juin (A. Hardy).

S'il est régulier dans l'est de la France et sur le littoral méditerranéen, le Faucon kobez est beaucoup moins fréquent ailleurs. Dans l'Aveyron, cette espèce est presque annuelle puisque sur les 20 dernières années, seules 5 années n'ont pas fait l'objet d'observations : 1999, 2005, 2006, 2009 et 2013.

Faucon Kobez, 7 juin, Saint-Rome-de-Cernon
Photo Alain Hardy

FAUCON EMERILLON *Falco columbarius* (15 septembre – 15 mai) **(1/1)**

Tarn – Labruguière, type fem., 9 septembre (B. Long).

Donnée précoce pour ce migrateur et hivernant qui n'est habituellement noté au passage post-nuptial qu'à partir de la fin septembre et surtout en octobre-novembre. Depuis le début du siècle, seules 3 autres mentions sont antérieures au 15 septembre dans le Tarn et l'Aveyron : 1 le 1er septembre 2007 et le 10 septembre 2013 à Laval-Roquecézière (12) ainsi que le 3 septembre 2012 à Caucalières (81).

FAUCON D'ELEONORE *Falco eleonorae* (1er janvier – 31 décembre) **(43/>105)**

Aveyron – Castelnau-de-Mandailles, forme claire, 27 août (P. Bouet) ; Fondamente, imm., forme claire, 3 septembre (V. Romera) ; Fondamente, ad., forme claire, 9 septembre (V. Romera) ; Laval-Roquecezière, 2 ind., formes claire et sombre, 20 août au 2 septembre (B. Long *et al*.) ; Marnhagues-et-Latour, 1 à 3 ind., imm., forme claire, photo, 21 au 24 août (V. Romera) ; Peux-et-Couffouleux, 10 août (S. Talhoët) ; Saint-Affrique, ad., forme claire, 25 octobre (A. Hardy).

Tarn – Frejeville, forme claire, 28 avril (S. Maffre) ; Massaguel, forme inconnue, photo, 7 juillet (M. Réglade) et forme claire, 2 août (B. Long) ; Arfons, 3 à 14 ind., surtout formes claires et au moins une forme sombre, photo, 14 juillet au 20 août (T. Ricard *et al.*).

Encore une bonne année pour cette espèce en Tarn et Aveyron. Comme en 2017, un groupe important a fréquenté le plateau d'Arfons en Montagne noire durant le milieu de l'été.
L'espèce est un migrateur régulier sur le pourtour méditerranéen en été, avant d'aller nicher sur les îles méditerranéennes en automne, puis de migrer vers Madagascar et l'Afrique du Sud-Est.

Faucons d'Eléonore, Arfons, 2 août.
Photo Benjamin Long

MAROUETTE PONCTUEE *Porzana porzana* (1er janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Tarn – Cuq, 13 octobre (B. Long).

Il s'agit de la 7ème donnée tarnaise depuis 1985, mais surtout la plus tardive pour notre région, l'espèce étant majoritairement observée en passage pré-nuptial (mars-avril) et très rarement au passage post-nuptial (seulement deux données d'août dans la base).

TALEVE SULTANE *Porphyrio porphyrio* (1er janvier – 31 décembre) **(36/1)**

Tarn – Cambounet-sur-le-Sor, ad., photo, 13 septembre au 27 octobre (Y. Tremauville, S. Maffre et al.).

*Outre le fait qu'il s'agit seulement de la **3ème mention tarnaise** de ce spectaculaire rallidé méditerranéen, la présence d'un oiseau dans la Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor est remarquable de par la durée du séjour. Présent pendant un mois et demi, cet individu a fait le bonheur des observateurs et des photographes. A noter que la précédente observation de Talève avait été réalisée sur le même site le 1er juillet 2016 (A. Calvet) et que l'espèce avait été mentionnée pour la 1ère fois dans le Tarn le 7 octobre 2015 à Albi (individu trouvé blessé).*

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus* (1er janvier – 31 décembre) **(1/7)**

Tarn – Nages, 7 ind., 13 mai (F. Bonnet).

***3ème mention tarnaise** seulement pour ce limicole côtier qui ne s'aventure que très rarement à l'intérieur des terres. L'espèce se reproduit régulièrement sur le littoral languedocien, à seulement une soixantaine de kilomètres à vol d'oiseau du lac du Laouzas où a été faite cette observation. La donnée précédente remontait à 10 ans au lagunage de Labruguière (1 oiseau du 19 au 23 avril 2008 – B. Rey) et la première mention départementale au 25 février 1995 sur la commune de Peyrole (P. Caniot).*

AVOCETTE ELEGANTE *Recurvirostra avosetta* (1er janvier – 31 décembre) **(7/15)**

Aveyron – Saint-Chély-d'Aubrac, 2 ind., 20 novembre (P. Ayral) ; Thérondels, 5 ind., 29 mars (S. Talhoët).

Tarn – Albi, 4 ind., 5 mars (G. Quelen) ; Labruguière, 24 mars (M. Malaterre) ; Lagrave, photo, 29 mars (J.P. Berlic, M. Abutaa) ; Réalmont, 2 ind., photo, 31 mai (P. Hallet).

Avocette élégante, 31 mai, Réalmont
Photo Philippe Hallet

Il s'agit de la 10ème et de la 11ème observations en Aveyron où cette espèce plutôt littorale n'est pas annuelle. L'observation de 5 individus sur la presqu'île de Laussac (Thérondels) constitue le groupe le plus important dans le département. Un passage important a sans doute eu lieu fin mars à l'intérieur des terres comme en témoignent 3 groupes totalisant 65 individus présents le 28 mars dans le département du Puy-de-Dôme.
Dans le Tarn, c'est un visiteur plus fréquent, même s'il n'est pas noté tous les ans. L'année 2018 a été marquée par un « beau » passage printanier avec 4 mentions de l'espèce.

BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta* (1er janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Tarn – Labruguière, ad., 29 octobre (M. Malaterre).

Donnée tardive pour ce bécasseau d'apparition quasi-annuelle dans le Tarn, surtout en migration postnuptiale (fin août à mi-octobre).

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (1er janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Tarn – Labruguière, 13 mai (M. Malaterre).

Ce migrateur rare dans la région avait déjà été vu sur le lagunage de Labruguière en 2011 et 2016. Il s'agit seulement de la 9ème observation recensée dans le département depuis 1985.

BECASSINE SOURDE *Lymnocryptes minimus* (1er janvier – 31 décembre) **(22/22)**

Aveyron – Bournazel, 5 mars (E. Gilhodes) ; Condom-d'Aubrac, capt., 1er novembre (ONCFS) ; Onet-le-Château, 2 ind., capt., 4 février (E. Gilhodes) ; Onet-le-Château, 3 ind., photo, 3 mars (B. Long) ; Sainte-Geneviève-sur-Argence, capt., 15 mars (ONCFS).

Lot – Cavagnac, du 27 févier au 29 mars (M. Vérité).

Tarn – Albi, photo, 27 janvier au 25 mars, (B. Long, L. Carrié) ; Albi, 25 février, trouvé mort (B. long) ; Cuq, 14 et 28 janvier, photo (B. Long), Labruguière, 1 à 6 ind., 28 octobre au 25 novembre, photo (B. Long) ; Saïx, 1 à 3 ind. 17 et 25 novembre (B. Long).

De nombreuses observations de cette espèce discrète et généralement très rarement notée par les ornithologues (moins d'une observation par an), ont été réalisées cette année grâce à des recherches spécifiques par les naturalistes mais aussi par les bagueurs. La Bécassine sourde est en effet beaucoup moins rare qu'on ne le pense au regard des tableaux de chasse effectués chaque année !

Bécassine sourde, Albi, 25 février
Photo Benjamin Long

BARGE A QUEUE NOIRE *Limosa limosa* (1er janvier – 31 décembre) **(1/2)**

Tarn – Labruguière, 2 ind., 28 mars (M. Malaterre).

Date et localisation typiques pour ce migrateur quasi-annuel dans le Tarn.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (1er janvier – 31 décembre) **(3/1)**

Aveyron – Coubisou, photo, 4 mai (P. Ayral, G. Alric, P. et J. Venturin).

*Il s'agit de la **1ère mention** de l'espèce en Aveyron. Le milieu était assez atypique pour l'espèce puisque cet oiseau était posé dans une prairie (même pas humide !) tout près de bâtiments agricoles. Cette observation est toutefois conforme à la période de migration prénuptiale de l'espèce (pic entre mi-avril et début mai).*

Barge rousse, Coubisou, 4 mai.
Photo J. et P. Venturin

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (1er janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Tarn – Cuq, 18 août (B. Long).

Il s'agit seulement de la troisième observation pour le Tarn de cette espèce migratrice lors du passage post-nuptial. La plupart des observations concernent le passage pré-nuptial, durant lequel elle reste néanmoins rare.

MOUETTE PYGMEE *Hydrocoloeus minutus* (1er janvier – 31 décembre) **(5/6)**

Aveyron – Canet-de-Salars, 1A, 2 novembre (S. Talhoët) ; Salles-Curan, ad., photo, 21 avril (B. Long).

Lot – Felzins, ad., 27 octobre (J.C. Schoeffel).

Tarn – Belleserre, ad., photo, 10 novembre (C. Daussin) ; Labruguière, 2 ind., 2A, 19 avril (M. Malaterre).

Cette petite mouette n'est pas annuelle en Aveyron, les dernières observations remontent à novembre 2016 et novembre 2011. Les deux observations réalisées en 2018 sont classiques au niveau des dates (passage prénuptial et passage postnuptial).

Même chose pour les sites d'observations : tous les oiseaux vus en Aveyron l'ont été au-dessus du lac de Pareloup, à l'exception de 4 individus en mai 1989 au-dessus du lac de Montézic !
L'observation de Felzins, au-dessus du plan d'eau, est la seconde dans le Lot après celle faite en novembre 2000 au-dessus du lac de Bannac à Laramière.
Dans le Tarn cette espèce est notée environ tous les deux ans, entre septembre et fin avril, avec un pic d'observation en novembre.

GOELAND CENDRE *Larus canus* (1er janvier – 31 décembre) **(3/1)**

Tarn – Montdragon, 2A, photo, 18 et 25 février (B. Long, L. Carrié).

Ce petit goéland est un visiteur hivernal rare dans le département du Tarn. Depuis 2016 et le début du suivi des rassemblements hivernaux de goélands sur le site de stockage des déchets ménagers de Labessière-Candeil (B. Long et al.*), il y est observé tous les hivers (en très petit nombre).*

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (1er janvier – 31 décembre) **(4/3)**

Tarn – Montdragon, 2A, photo, 13 janvier (B. Long) ; Montdragon, 2 ind., 2A, photo, 18 février (B. Long) ; Montdragon, 2A, 25 février (B. Long, L. Carrié).

Suite à la découverte de l'espèce en novembre 2016 (Labessière-Candeil - B. Long) et aux observations de 2017, les données de 2018 confirment la présence hivernale régulière, en petit nombre, de ce laridé oriental dans le département du Tarn.

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* (1er janvier – 31 décembre) **(2/6)**

Aveyron – Salles-Curan, ad., photo, 21 avril (B. Long).

Lot – Sénaillac-Latronquière, 5 ind., 14 août (J.C. Schoeffel).

*Il s'agit des **1ères mentions** de l'espèce dans les départements de l'Aveyron et du Lot. La Sterne caugek est une espèce du littoral très occasionnelle à l'intérieur des terres. La présence d'un adulte au bord du lac de Pareloup le 21 avril et de 5 individus à Sénaillac-Latronquière le 14 août sont conformes aux périodes de migration de l'espèce (début mars à mi-mai puis de fin juillet à octobre).*

COUCOU GEAI *Clamator glandarius* (1er janvier – 31 décembre) **(5/2)**

Tarn – Caucalières, 2A, photo, du 1er au 9 avril (P. Delgado, B. Long *et al*.) ; Dourgne, 1A, 14 juin (P. Delgado).

Deux observations cette année pour le Coucou geai dans le Tarn. Migrateur occasionnel pour le département, il est observé quasi-annuellement depuis 2011 (excepté en 2013, 2016 et 2017). Les données de Coucou geai n'étant pas soumise à homologation avant cette année, l'espèce fait donc son apparition dans ce bilan.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (1er janvier – 31 décembre / Lot, Tarn) **(3/3)**

Tarn – Labruguière, 7 mai (M. Malaterre) ; Le Margnès, photo, 17 mai (A. Waleau) ; Montfa, blessé, photo, 4 mai (Mme Alozy).

Cette espèce est devenue régulière en Aveyron depuis quelques années, c'est pourquoi les observations de Hibou des marais ne sont plus soumises à homologation dans ce département (2 observations ont été réalisées en 2018 : en avril à Pradinas et en juin à Montlaur). Dans le Tarn, l'espèce est plus rare, avec seulement 12 mentions précédentes.

Hibou des marais (blessé), 4 mai, Montfa
Photo Dorine Gisclard

ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus* (1er octobre – 15 avril) **(2/2)**

Lot – Cours, 26 octobre (A. Maury Dalmazane).

Tarn – Rouffiac, type fem., blessé, photo, 21 octobre (M. Cacciari).

Ces observations sont assurément tardives pour l'espèce mais pas uniques au plan national.

MARTINET PALE *Apus* pallidus (1er janvier – 31 décembre) **(9/3)**

Tarn – Cordes-sur-Ciel, 1 à 3 ind., photo, enr., du 7 mai au 13 juin (C. Mroczko).

Remarquable découverte que ce couple nicheur dans le village médiéval de Cordes-sur-Ciel ! Il s'agit de la 1ère mention de l'espèce dans le Tarn depuis 1991 et du 1er cas de nidification depuis 50 ans. Ce martinet méditerranéen avait en effet été découvert nicheur en 1967 sur plusieurs localités de la vallée du Tarn, d'Arthès à Rabastens en passant par Albi et Gaillac (Maurel et al). En Midi-Pyrénées, il est actuellement connu nicheur exclusivement en centre-ville de Toulouse, alternant entre la façade de l'Hôtel Dieu et le Pont neuf.

Martinet pâle, Cordes-sur-Ciel, 4 juin
Photo Cédric Mroczko

*Cette colonie découverte en 1966 était la plus important de la région et la seule connue en France continentale (Frémaux S. 1998). La population estimée à moins de 1000 couples en France à la fin des années 1990 a été réévaluée entre 3000 et 5000 couples en 2012. L'expansion de l'aire de répartition ainsi que la révision des effectifs semblent traduire une meilleure connaissance de l'espèce (*Issa, Barbaro 2014*). La difficulté d'identification de l'espèce en dehors de la période de reproduction, due à sa proximité morphologique avec le Martinet noir (Apus apus) peut expliquer le faible nombre de données. L'espèce reste à rechercher sur les sites de reproduction historiques dans les années à venir.*

MARTINET A VENTRE BLANC *Apus melba* (1er novembre – 15 mars) **(1/1)**

Tarn – Fréjeville, 10 mars (S. Maffre).

Cette donnée est la plus précoce jamais notée dans pour nos trois départements. Le passage pré-nuptial est généralement marqué à partir de la fin mars.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (1er janvier – 31 décembre) **(9/8)**

Tarn – Labruguière, 1 à 6 ind., photo, enr., 25 mars au 8 avril (B. Long, M. Malaterre) ; Labruguière, 1 à 2 ind., 28 et 31 octobre (B. Long, L. Carrié).

***1ères mentions** tarnaises pour ce pipit originaire de Sibérie et d'Asie centrale, noté régulièrement mais en petit nombre dans notre pays, principalement sur le littoral méditerranéen. Les données concernent les migrations d'automne (septembre-octobre) et de printemps (avril-mai) ainsi que de rares, mais réguliers, cas d'hivernage. La découverte de l'espèce au printemps 2018 sur le Causse de Caucalières – Labruguière est d'autant plus remarquable qu'elle concerne le stationnement pendant au moins 15 jours de plusieurs individus. Le fait que des oiseaux aient été à nouveau contactés en octobre suivant permet d'envisager une présence régulière sur ce site, passée jusqu'ici inaperçue compte-tenu de la discrétion de l'espèce.*

Pipit de Richard, Labrugière, 31 mars
Photo Benjamin Long

BERGERONNETTE PRINTANIERE NORDIQUE *Motacilla flava thunbergi* (1er janvier–31 décembre) **(5/7)**

Aveyron – Lanuéjouls, 4 mâles, 1er mai (A. Amiel) ; Soulages-Bonneval, 2 mâles, 4 mai (P. Ayral).

Tarn – Labruguière, mâle, 24 et 26 avril (P. Hallet, D. Préd'homme, B. Long).

Cette sous-espèce de bergeronnette est observée en Aveyron et dans le Tarn quasiment annuellement depuis 2002, essentiellement entre mi-avril et mi-mai. Les observations réalisées en 2018 sont conformes aux dates de passages habituelles.

BERGERONNETTE PRINTANIERE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima* (1er janvier–31 décembre) **(3/3)**

Aveyron – Anglars-Saint-Félix, mâle, 1er avril (A. Amiel), Soulages-Bonneval, mâle, 6 avril (P. Ayral).

Tarn – Dourgne, mâle, 11 septembre (Y. Tremauville).

Cette sous-espèce est un peu plus rare que la précédente, mais comme elle, elle s'observe régulièrement en passage pr-nuptial de fin mars à fin avril. La donnée tarnaise de septembre est la première observation en passage postnuptial pour nos trois départements. Cependant, toutes les sous-espèces de bergeronnettes printanières sont plus faciles à identifier en plumage nuptial, ce qui pourrait expliquer la rareté des données postnuptiales.

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (1er janvier – 31 décembre) **(16/14)**

Aveyron – Decazeville, 1 à 3 ind., mâles, photo, 29 mars au 1er avril (J.L. Cance, E. Gilhodes, F. Calmettes) ; Decazeville, fem., 4 octobre (P. Bounie) ; Flavin, 29 mars (P. Defontaines)

Lot – Cavagnac, mâle ad., 21 mars (M. Vérité) ; Cavagnac, 2 ind., mâle ad., fem. ad., photo, 29 mars (M. Vérité) ; Cavagnac, 2 ind., mâle, fem., photo, 18 août (M. Vérité).

Tarn – Castres, fem., 8 avril (B. Long) ; Cuq, mâle, photo, 1er et 2 avril (B. Long, C. Long) ; Cuq, photo, 8 septembre (B. Long) ; Cuq, photo, 22 septembre (B. Long) ; Labruguière, 29 mars (M. Malaterre) ; Labruguière, 7 septembre (B. Long).

Gorgebleue à miroir, Cavagnac, 18 août, Mathis Vérité

Encore une bonne année pour cette espèce en Aveyron avec pas moins de 5 oiseaux différents ! C'est la 10ème année consécutive où l'espèce est observée dans le département, probablement en raison d'une recherche spécifique des observateurs. L'observation du 4 octobre est désormais la date la plus tardive en Aveyron. 84% des observations concernent le passage prénuptial (entre le 4 mars et le 21 avril) et seulement 5 données se réfèrent au passage postnuptial (entre le 23 août et le 4 octobre). Dans le Lot l'espèce est notée pour la troisième année consécutive dans ce petit marais du nord du département peu prospecté auparavant. Les observations se rapportent aux passages pré- et post-nuptiaux et concernent plusieurs individus.
Également une bonne année dans le Tarn, qui plus est avec de nouveaux sites en plus du lagunage de Labruguière qui rassemble la grande majorité des observations des années précédentes.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe* (1er novembre – 29 février) **(1/1)**

Aveyron – La Loubière, photo, 15 novembre (J. Vauthier).

Il s'agit de la seconde date d'observation la plus tardive en Aveyron pour cette espèce quittant généralement nos départements au mois de septembre ou début octobre. La date la plus tardive concerne un oiseau présent le 16 novembre 2017 à La Loubière (P. Ayral), sur la même commune que l'observation réalisée en 2018 !

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica* (1er janvier – 31 décembre) **(2/1)**

Tarn – Labruguière, mâle ad., photo, 12 avril (A. Waleau, C. Mroczko).

6ème donnée tarnaise et 2nde année consécutive d'observation dans le département pour ce rare traquet méditerranéen. A l'exception d'une observation à Roquevidal en 2017, toutes les mentions tarnaises, y compris celle de cette année, proviennent du causse de Caucalières-Labruguière. Ce site, à l'ambiance très méditerranéenne, a d'ailleurs abrité la reproduction du Traquet oreillard dans les années 1970 (Maurel, 2001).

Traquet oreillard, 12 avril, Labruguière
Photo Audrey Waleau

ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus* (1er janvier – 31 décembre) **(2/1)**

Tarn – Albi, enr., 30 avril (B. Long, L. Carrié).

L'espèce n'avait pas été notée dans le Tarn depuis 2012. Dans le département elle a disparue en tant que nicheuse dans les années 1990, et les données plus récentes semblent ne concerner que des oiseaux chanteurs en halte migratoire.

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus* (1er janvier – 31 décembre) **(6/5)**

Aveyron – Decazeville, 12 avril (J.L. Cance) ; Flavin, 29 mars (P. Defontaines).

Lot – Cavagnac, 18 août (M. Vérité).

Tarn – Les Cabannes, 8 et 9 avril (C. Mroczko) ; Teulat, photo, 23 juillet (P. Leprince).

Ce petit passereau est observé presque tous les ans en Aveyron depuis 2004, généralement entre fin mars et fin avril puis de fin juillet à début octobre. En 2018, les dates et les lieux d'observations (plans d'eau avec une végétation rivulaire développée) sont assez classiques.
Il s'agit seulement de la troisième observation lotoise de cette espèce souvent discrète et qui dispose de peu de sites favorables dans le département.
Dans le Tarn, il s'agit également d'un migrateur rarement observé avec seulement une dizaine de mentions ces 10 dernières années.

FAUVETTE ORPHEE *Sylvia hortensis* (15 septembre – 31 mars) **(1/1)**

Aveyron – Fondamente, mâle, 20 septembre (V. Romera).

La Fauvette orphée quitte généralement le département au cours du mois d'août. Cette observation constitue la date la plus tardive (ancien record : 10 septembre 2012 à Saint-Félix-de-Sorgues, R. Straughan).

POUILLOT DE TYPE SIBERIEN *Phylloscopus collybita tristis/fulvescens* (1er janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Lot – Figeac, 31 décembre (E. Chapoulie).

***Première donnée pour le Lot** et seconde pour l'ensemble Tarn-Aveyron-Lot de cette sous-espèce de Pouillot véloce qui niche à l'est de l'Oural et dont les mentions hivernales en France sont en accroissement.*

POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (1er janvier – 31 décembre) **(5/4)**

Aveyron – Boisse-Penchot, 4 octobre (S. Talhoët) ; Espalion, 30 octobre (P. Ayral) ; Saint-Affrique, 11 novembre (V. Romera).

Tarn – Labruguière, photo, 7 et 8 novembre (A. Calvet).

Cette espèce sibérienne n'avait été observée qu'une fois en Aveyron avant 2018 : 1 individu le 14 octobre 2012 à Montlaur (V. Guiraud). En 2018, pas moins de 3 observations en vallée du Lot et à Saint-Affrique ! Ces données sont à replacer dans un contexte national où de plus en plus d'oiseaux sont observés depuis le début des années 2010 (M. Zucca, 2017).

Dans le Tarn, la présence d'un oiseau dans le houppier d'un bouquet de saules devant une fenêtre des bureaux de la LPO Tarn (!) constitue également la 2nde mention départementale (la 1ère avec photos), après l'observation d'un individu le 9 octobre 2015 à Castres (A. Cherkaoui).

Pouillot à grands sourcils, Labruguière, 8 novembre.
Photo Amaury Calvet

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris* (1er janvier – 31 décembre) **(5/5)**

Aveyron – Brommat, photo, enr., 20 avril (J.P. Ladoux) ; Soulages-Bonneval, photo, 4 et 26 mars (B. Long, S. Talhoët), Taussac, 22 avril (B. Stenou) ; Thérondels, 2 ind., photo, enr., 15 juillet (J.P. Ladoux).

En raison d'une meilleure connaissance de sa répartition, les observations du Grimpereau des bois ne sont plus soumises à homologation sur l'Aubrac mais elles le demeurent ailleurs dans le département en raison de sa distinction délicate avec le Grimpereau des jardins. Les cinq observations validées par le comité d'homologation proviennent de secteurs où l'espèce était déjà connue (Viadène et Carladez).

CORBEAU FREUX *Corvus frugilegus* (15 mars – 15 octobre) **(1/12)**

Aveyron – Saint-Santin, 12 ind., 19 juin (T. Ricci).

En Aveyron, le Corbeau freux était régulier en hivernage jusqu'au début des années 2000 mais ce n'est actuellement plus le cas actuellement où seules quelques observations ponctuelles sont encore réalisées à cette saison. Dans le même temps, ce corvidé est en pleine expansion dans le Massif central en période de reproduction et se reproduit dans le sud du Cantal (Aurillac). L'observation de 12 individus à Saint-Santin (en limite du Cantal) en 2018 est la seconde observation de l'espèce en période de reproduction en Aveyron, la première se référant à un individu en mai 2013 sur la commune de Thérondels (également en limite du Cantal). Cette espèce étant classée « nuisible » (destruction régulière des nids), ces observations concernent peut-être des individus en erratisme.

CORNEILLE NOIRE X MANTELEE *Corvus corone x cornix* (1er janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Aveyron – Saint-Beauzély, 12 janvier (R. Nadal).

Observation à une date classique pour l'espèce au sens strict ou son hybride avec la Corneille noire qui reste néanmoins une espèce qui n'est pas vu tous les ans en Aveyron. Pour mémoire, un hivernage complet d'une Corneille mantelée avait été noté de novembre 2007 à mars 2008 près de l'aéroport de Rodez-Marcillac.

PIE-GRIECHE MERIDIONALE *Lanius meridionalis* (1er janvier – 31 décembre / Lot, Tarn) **(16/2)**

Tarn – Fréjeville, photo, 22 octobre au 12 décembre (B. Long, S. Maffre) ; Labruguière, 18 au 26 février (M. Malaterre *et al*.).

3ème année consécutive d'observation pour cette espèce très rarement notée dans le Tarn (hivernant) et qui n'y avait pas été notée entre 2007 et 2016. A noter le séjour prolongé sur la commune de Fréjeville, prémices d'un hivernage.

ETOURNEAU ROSELIN *Pastor roseus* (1er janvier – 31 décembre) **(4/16)**

Aveyron – La Cavalerie, ad, photo, 31 mai (A. Rhodde) ; Saint-Affrique, 30 mai (F. Fabre) ; Villeneuve, 14 ind., photo, 28 mai (A. Amiel, M. Fayret).



L'Etourneau roselin est un migrateur rare en France. Entre fin mai et juin 2018, un afflux d'une ampleur exceptionnelle s'est produit en Europe centrale. Spectaculaire par son importance et sa soudaineté, il a donné lieu à des déplacements de milliers d'individus. En France, ce sont au moins 2 307 individus qui ont été comptabilisés. C'est dans ce contexte que 16 individus ont pu être observés en Aveyron : un groupe de 14 à Villeneuve, 1 individu à Saint-Affrique et 1 à La Cavalerie. Il s'agit des 1ères mentions de l'espèce en Aveyron.

Répartition des Etourneaux roselins *Pastor roseus* observés en France au cours de l'afflux de 2018 (24 mai – 9 août). Touzé *in* Ornithos 26-3 : 105-119 (2019).

VENTURON MONTAGNARD *Serinus citrinella* (1er janvier – 31 décembre) **(2/25)**

Aveyron – Cornus, 30 octobre (F. Legendre).

Tarn – Mazamet, 24 ind., photo, 26 février (B. Long).

L'observation aveyronnaise a été réalisée à une date habituelle (période de migration) et sur un lieu également classique pour l'espèce (Grands Causses).
Il en va de même pour la donnée tarnaise, l'espèce étant régulière, en petit nombre, en Montagne noire en migration et en hivernage.

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea* (1er janvier – 31 décembre) **(2/4)**

Aveyron – Millau, 3 type fem., 7 février (S. Combaud) ; Soulages-Bonneval, mâle, 4 mars (B. Long).

Lors de l'hiver 2017/2018, un afflux exceptionnel de Sizerins flammé et cabaret a eu lieu en Europe. Des milliers de contacts ont ainsi eu lieu partout en France, notamment dans nos départements. C'est dans ce contexte que 4 individus de Sizerin flammé ont pu être dûment identifiés en Aveyron : 3 types femelles à Millau dans un grand groupe de fringilles (pinsons, chardonnerets, Sizerin cabaret…) et 1 mâle à Soulages-Bonneval dans un groupe de 14 sizerins (cabaret, flammé et Sizerin indéterminé). Il s'agit des 1ères mentions de l'espèce en Aveyron.

SIZERIN CABARET *Carduelis cabaret* (1er janvier – 31 décembre) **(25/21)**

Aveyron – Castelnau-de-Mandailles, 17 et 23 mars (P. Bouet) ; Le Cayrol, 1 mâle, 3 fem., photo, 14 mars (B. Long) ; Golinhac, mâle, photo, 2 février (S. Michelin) ; Millau, 4 type fem., 7 février (S. Combaud) ; Soulages-Bonneval, 1 à 5 ind., 2 mâles, 2 fem., photo, 4 au 14 mars (B. Long, G. Alric) ; Soulages-Bonneval, 5 ind., 2 mâles, 3 fem., 26 mars (S. Talhoët).

Tarn – Labruguière, type fem., photo, 9 au 26 février (P. Delgado, B. Long *et al.*).

Dans l'afflux exceptionnel de Sizerins flammé et cabaret qui a eu lieu en Europe cité précédemment, au moins 20 individus de Sizerin cabaret ont été identifiés en tant que tel en Aveyron (essentiellement dans le nord du département mais aussi à Millau) et 1 individu dans le département du Tarn.

Sizerin cabaret, 2 février, Golonhac
Photo Sylvie Michelin

SIZERIN FLAMME / CABARET *Carduelis flammea / cabaret* (1er janvier – 31 décembre) **(16/50)**

Aveyron – Canet-de-Salars, 2 ind., 29 janvier (S. Talhoët) ; Le Cayrol, 3 ind., photo, 4 mars (B. Long) ; Millau, 7 ind., 7 février (S. Combaud) ; Montézic, 3 ind., photo (M. Guerard, J. et P. Venturin) ; Saint-Santin, 3 ind., 2 janvier (D. Wagenmann) ; Salles-la-Source, 8 à 13 ind., photo (J.C. Peers, T. Andrieu) ; Soulages-Bonneval, 7 ind., photo, 29 janvier (P. Ayral, G. Alric) ; Soulages-Bonneval, 4 mars (B. Long) ; Soulages-Bonneval, 1 à 8 ind., photo, 4 et 13 mars (B. Long).

Tarn – Graulhet, 27 janvier (R. Hilaire) ; Sorèze, 2 ind., 1 mâle, 4 février (H. Darmandieu).

Dans l'afflux exceptionnel de Sizerins flammé et cabaret qui a eu lieu en Europe cité précédemment, au moins 50 individus ont été observés mais n'ont pas pu être identifiés précisément : 47 en Aveyron (essentiellement dans le nord du département mais aussi sur le causse Comtal, le Lévézou et à Millau) et 3 dans le département du Tarn.

Liste systématique des données non homologuées

Bondrée apivore *Pernis apivorus* (1er octobre – 15 avril)

Aveyron – Lavernhe, 13 octobre : absence de description de l'oiseau observé.
Aveyron – Veyreau, 1er avril : absence de description de l'oiseau observé.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* (1er novembre – 29 février)

Lot – Lamativie, 27 janvier : absence de description de l'oiseau observé.

Busard cendré *Circus pygargus* (1er octobre – 31 mars)

Aveyron – Rignac, fem., 26 mars : description insuffisante ne permettant pas d'exclure un Busard pâle.
Tarn – Alban, mâle, 23 mars : description insuffisante, ne comportant pas de critères diagnostiques du Busard cendré (barres alaires, parties inférieures striées de roux...) et ne permettant pas d'écarter un autre busard gris mâle en particulier le Busard Saint-Martin, espèce la plus probable au regard du secteur et de la date d'observation.

Aigle botté *Aquila pennata* (1er octobre – 15 mars)

Tarn – Rabastens, 25 février : description insuffisante ne permettant pas d'exclure d'autres espèces de rapaces.

Faucon d'Eléonore *Falco eleonorae* (1er janvier – 31 décembre)

Aveyron – Bozouls, 12 septembre : absence de description de l'oiseau observé.
Aveyron – Peux-et-Couffouleux, 2 août : description insuffisante ne permettant pas d'écarter le Faucon hobereau.
Tarn – Arfons, 5 ind., 10 juin : observation insuffisante pour noter des critères réellement discriminants permettant d'écarter d'autres espèces de faucons.
Tarn – Sorèze, 6 juillet : les critères diagnostiques de l'espèce ne sont pas mentionnés (dessins de la tête, sous alaires sombres...). Un Faucon pèlerin immature n'est pas écarté.
Tarn – Pont de L'Arn, 6 août : photo ne permettant pas d'exclure un Faucon hobereau voire un Faucon kobez.
Tarn – Puylaurens, 19 septembre : description insuffisante pour noter des critères réellement discriminants permettant d'écarter d'autres espèces de faucons.
Tarn – Lasgraisses, 24 octobre : description insuffisante pour noter des critères réellement discriminants permettant d'écarter d'autres espèces de faucons.

Petit Gravelot *Charadrius dubius* (1er octobre – 29 février)

Tarn – Albi, 1 à 5 ind., 5 au 14 octobre : absence de description des oiseaux observés.

Bécassine sourde *Lymnocryptes minimus* (1er janvier – 31 décembre)

Aveyron – Aurelle-Verlac, 1er décembre : absence de description de l'oiseau observé.

Pigeon colombin *Columba oenas* (15 novembre – 15 février / Lot, Aveyron)

Lot – Calès, 2 ind., 6 février : malgré une description des oiseaux et du chant, un doute persiste avec des Pigeons bisets domestiques.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (1er octobre – 10 avril)

Aveyron – Gabriac, 8 avril : absence de description de l'oiseau observé.

Coucou geai *Clamator glandarius* (1er janvier – 31 décembre)

Aveyron – Castelnau-Pégayrols, imm., 9 août : absence de description de l'oiseau observé.

Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* (1er janvier – 31 décembre)

Aveyron – Hippolyte, 7 août : la description du chant ne permet pas d'écarter un chant de Chouette hulotte *Strix aluco* ; cette dernière pouvant en effet imiter la Chouette de Tengmalm.

Huppe fasciée *Upupa epops* (1er novembre – 15 février)

Lot – Lamativie, 27 janvier : le comportement observé et l'absence de description de l'oiseau observé ne plaident pas pour cette espèce.

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (1er octobre – 10 mars)

Aveyron – Le Fel, 3 ind., 28 janvier : absence de description des oiseaux observés.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (1er janvier – 31 décembre)

Lot – Cavagnac, 23 mars : oiseau uniquement entendu et absence de description du cri de l'oiseau (les rousserolles pouvant également répondre à la repasse pour cette espèce).

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (1er novembre – 15 mars)

Tarn – Gaillac, 11 novembre : absence de description de l'oiseau observé.

Merle à plastron alpestre *Turdus torquatus alpestris* (1er janvier – 31 décembre)

Aveyron – Veyreau, 26 octobre : absence de description de l'oiseau observé.

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* (15 septembre – 15 avril)

Tarn – Albi, 3 ind., 26 février : description insuffisante et absence de description du chant. Des photos et/ou enregistrements auraient été nécessaires au regard de la date particulièrement précoce (couplée à l'effectif), notamment pour écarter des Pouillots véloces et un chant incomplet/atypique de Fauvette à tête noire.

Fauvette des jardins *Sylvia borin* (15 octobre – 15 avril)

Aveyron – La Cayrol, 15 avril : absence de description de l'oiseau observé.
Aveyron – La Fouillade, 29 mars : absence de description de l'oiseau observé.

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* (1er janvier – 31 décembre)

Aveyron – Saint-Félix-de-Sorgues, 6 avril : description insuffisante, le critère du chant mis en avant n'est pas suffisamment fiable pour identifier cette espèce.
Tarn – Sorèze, 2 ind., photo, 10 avril : les différences de plumages Pouillot véloce / Pouillot ibérique sont subtiles et variables c'est pourquoi la photo d'excellente qualité n'est pas suffisante pour une identification. Malheureusement, le chant n'a pas été enregistré (ni décrit).

Gobemouche gris *Muscicapa striata* (15 octobre – 15 avril)

Aveyron – Peyrusse-le-Roc, 27 janvier : absence de description de l'oiseau observé.
Aveyron – Saint-Rome-de-Cernon, 2 ind., 28 janvier : absence de description des oiseaux observés.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (1er novembre – 15 mars)

Tarn – Cambounet-sur-le-Sor, 18 novembre : absence de description de l'oiseau observé.

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* (1er janvier – 31 décembre)

Tarn – Cambounet-sur-le-Sor, 2 ind., 1er mai : absence de description des oiseaux observés.
Tarn – Cestayrols, 1er mai : absence de description de l'oiseau observé.

Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* (1er janvier – 31 décembre / Lot, Tarn)

Tarn – Arfons, 26 décembre : absence de description de l'oiseau observé.
Tarn – Saint-Sulpice, 6 novembre : absence de description de l'oiseau observé.

CHN- Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus* (1er janvier – 31 décembre)

Aveyron – Belmont-sur-Rance, 3 septembre 2018 : les photos montrent une Pie-grièche écorcheur

Etourneau roselin *Pastor roseus* (1er janvier – 31 décembre)

Aveyron – Millau, de 1 à 60 ind., 25 août au 22 septembre : absence de description des oiseaux observés.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* (1er mai – 15 septembre)

Aveyron – La Fouillade, 2 ind., 10 juillet : absence de description des oiseaux observés.

Sizerin cabaret *Carduelis flammea cabaret* (1er janvier – 31 décembre)

Lot – Prayssac, 2 ind., 14 janvier : absence de description des oiseaux observés.

Bibliographie

Calvet A., Talhoët S. et le CHTA (2012). Les oiseaux rares dans le Tarn et l'Aveyron – Premier rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron – Année 2012.

Calvet A., Talhoët S. et le CHTA (2013). Les oiseaux rares dans le Tarn et l'Aveyron – Deuxième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron – Année 2013.

Calvet A., Talhoët S. et le CHTA (2014). Les oiseaux rares dans le Tarn et l'Aveyron – Troisième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron – Année 2014.

Calvet A., Talhoët S. et le CHTA (2015). Les oiseaux rares dans le Tarn et l'Aveyron – Quatrième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron – Année 2015.

Calvet A., Talhoët S. et le CHTA (2020). Les oiseaux rares dans le Tarn et l'Aveyron – Cinquième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron – Année 2016.

Calvet A., Latrouite D., Talhoët S. et al. (2020). Sixième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron-Lot – année 2017. CHTAL.

Commission de l'Avifaune de France (2007). En direct de la CAF. Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B et C). Ornithos 14-4 : 234-246.

Dubois P.J., Le Maréchal P., Olioso G & Yésou P. (2008). Nouvel Inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.

Forsman D. (2017). Identifier les rapaces en vol – Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Delachaux et Niestlé, Paris.

Frémaux F. et Ramière J., coord. (2012). Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées. Nature-Midi-Pyrénées, Delachaux et Niestlé, Paris.

Issa N., Muller Y., coord (2015). Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris. 1408 p.

Joachim J., Bousquet J.F., Fauré C. (1997). Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées. Association régionale ornithologique de Midi-Pyrénées. 262 p.

Jiguet F., Crochet P.-A., Dubois P.J., Pons J.-M., Yésou P. & Le Maréchal P. (2009). Décisions prises par la Commission Avifaune Française en 2008-2009. 12e rapport de la CAF. Ornithos 16-6 : 382-393

LPO Aveyron. (2008). Faune sauvage de l'Aveyron – Atlas des vertébrés. Éd. du Rouergue. Rodez.

Maurel C. coord. (2001). Les oiseaux du département du Tarn. LPO Tarn. Castres

Touzé H. (2019). Afflux record d'Etourneaux roselins *Pastor roseus* en France au printemps 2018. Ornithos 26-3 : 105-119.

Touzé H., Reeber S. & le CHN (2020). Les oiseaux rares en France en 2018. 35ème rapport du Comité d'Homologation National. Ornithos 27-4 : 201-235.

Zucca M. (2017). Evolution récente du statut du Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* en France. Ornithos 24-4 : 201-223.