


Guide de prospection pour l'Atlas des papillons d'Aveyron

Juin 2021

- Communes :



Identifiants des communes prioritaires correspondants à la carte :

<u>Identifiant Commune</u>	<u>Nom Commune</u>	<u>ID</u>	<u>Nom Commune</u>	<u>ID</u>	<u>Nom Commune</u>
1	Saint-Santin	48	Valzergues	101	Saint-Jean-d'Alcapiès
2	Montfranc	49	Vitrac-en-Viadène	102	Galgan
3	Bastide-Solages (La)	50	Bessuéjous	103	Marcillac-Vallon
4	Flagnac	51	Bournazel	104	Pierrefiche
5	Balaguier-sur-Rance	52	Cabanès	105	Selve (La)
6	Saint-Parthem	53	Camboulazet	109	Campouriez
7	Brasc	55	Moyrazès	111	Espeyrac
8	Escandolières	56	Pousthomy	113	Boisse-Penchat
9	Murols	57	Pradinas	114	Conques
10	Durenque	58	Pruines	116	Agen-d'Aveyron
11	Lugan	59	Serre (La)	117	Capelle-Balaguier (La)
12	Meljac	60	Castanet	118	Connac
13	Cransac	61	Huparlac	120	Goutrens
14	Lédergues	62	Martrin	122	Sainte-Eulalie-d'Olt
15	Montbazens	63	Noailhac	124	Sonnac
16	Vaureilles	64	Saint-Jean-Delnous	126	Baraqueville
17	Livinhac-le-Haut	66	Truel (Le)	127	Canet-de-Salars
18	Manhac	67	Costes-Gozon (Les)	129	Paulhe
19	Mur-de-Barrez	69	Gramond	130	Réquista
20	Plaisance	70	Lescure-Jaoul	131	Sainte-Croix
21	Saint-Félix-de-Lunel	72	Saint-Just-sur-Viaur	132	Bastide-l'Évêque (La)
22	Morlhon-le-Haut	73	Albres (Les)	133	Belcastel
23	Viviez	74	Arques	134	Entraygues-sur-Truyère
24	Almont-les-Junies	75	Auriac-Lagast	136	Saint-Martin-de-Lenne
25	Lanuéjous	76	Prades-Salars	141	Grand-Vabre
26	Mayran	77	Privezac	142	Ols-et-Rinhodes
27	Bouillac	78	Saint-Sever-du-Moustier	143	Peyrusse-le-Roc
29	Centrès	79	Sauveterre-de-Rouergue	144	Prévinquières
30	Comps-la-Grand-Ville	80	Asprières	146	Rullac-Saint-Cirq
31	Montclar	81	Florentin-la-Capelle		
33	Saint-Rémy	85	Salmiech		
34	Savignac	86	Boussac		
35	Toulonjac	87	Brandonnet		
36	Anglars-Saint-Félix	88	Colombiès		
37	Auzits	89	Fayet		
38	Compolibat	90	Roussennac		
39	Decazeville	91	Saint-Sernin-sur-Rance		
40	Graissac	92	Sénergues		
41	Monastère (Le)	93	Sévérac-l'Église		
42	Naussac	94	Alpuech		
43	Villecomtal	95	Broquiès		
44	Campuac	97	Causse-et-Diège		
45	Capelle-Bleys (La)	98	Cayrol (Le)		
46	Trémouilles	99	Montézic		
47	Vailhourles	100	Montpeyroux		


- Défis de prospection : (*Espèces rares*) (Cartes de répartition issues de faune-tarn-aveyron.org)

Azuré de Chapman (A. de l'esparcette) (*Polyommatus thersites*):

Les connaissances sur ce papillon volant de mai à août sont à approfondir, il est à rechercher dans la vallée de l'Aveyron entre Séverac et Gages. Pelouses sèches et prairies avec Sainfoin à proximité, en-dessous de 1000m.



Gaël Marceny




> Pour l'identification parfois délicate des Azurés, on peut se référer au document d'aide à la détermination établi par F. Bonnet et disponible sur le site internet de la base : https://www.faune-tarn-aveyron.org/index.php?m_id=20055.

Azuré de la jarosse (*Polyommatus amandus*) :

Il n'y a en Aveyron que des populations isolées de cet Azuré, qui est donc à rechercher en périphérie des secteurs connus tel que dans la vallée de la Sorgue autour de Saint-Jean et Saint-Paul et Sylvanès, sur le Lévezou sud et est ou encore dans le secteur de Saint-Rome du Tarn jusqu'à Les Costes-Gozon. L'Azuré de la jarosse se trouve de juin à juillet dans les lisières et clairières des bois et a pour plantes hôtes la Jarosse et la Gesse des prés.



Pauline Dréno




Azuré du mélilot (*Polyommatus dorylas*):

Cet Azuré ayant pour plantes hôtes les Anthyllides (vulnérables) est à rechercher autour des secteurs connus tels que le causse de Séverac, autour des communes de Saint Rome de Cernon, St-Affrique, St-Jean et St Paul et il faut également compléter nos connaissances du nord du secteur Larzac-Dourbie-Nant. Pelouses sèches et fleuries et landes sèches ouvertes de mai à début septembre.



Pascal Peyrache




Azuré du serpolet (*Phengaris arion*):

Papillon potentiellement partout dans le département mais généralement peu abondant, à chercher principalement sur le causse de Séverac et aux alentours de Gaillac et Palmas, ainsi qu'éventuellement dans le secteur de Montlaur. L'Azuré du serpolet affectionne les pelouses et prairies chaudes avec à proximité Serpolets et origan. Juin à mi-août.



Rodolphe Liozon




Cardinal (*Argynnis pandora*):

Papillon peu observé, sa répartition en Aveyron est à compléter dans le sud du département : à prospecter dans les Monts de Lacaune notamment, puis en second lieu dans le secteur de Saint-Affrique et éventuellement autour de Calmels-et-le-Viala. Pelouses sèches fleuries, friches et lisières chaudes, chenilles sur Pensées. Juin à début septembre.



Laurent Fructidor




Chiffre (*Fabriciana niobe*):

Les connaissances sur le territoire de ce papillon sont à compléter dans une grande partie du département entre autres aux alentours de Conques, sur le Ségala, le Lévezou et dans le bassin de la Rance. A prospecter plutôt dans les collines et montagnes, dans les prairies, pelouses, lisières et clairières fleuries de fin mai à début août. Chenilles sur Violettes.



Gaël Marceny




Cuivré écarlate (*Lycaena hippothoe*):

Le Cuivré écarlate est à rechercher dans les zones humides des parties ouest, nord et centrale de la « pointe » Nord du département. Plantes hôtes : Oseilles. Juin à début août.



Laurent Fructidor




Échiquier d'Esper (*Melanargia russiae*) :

Papillon du sud-est du département dont le nombre de données est à étoffer autour des secteurs connus avec le sud et l'ouest du Larzac. On peut également chercher sa présence sur le plateau du Guilhaumard où il n'a été encore jamais vu, peut être par manque d'espaces assez ouverts. Plantes hôtes : Graminées. Sur pelouses sèches étendues de juin à juillet.




Stéphane Combaud




Grand Sylvain (*Limenitis populi*) :

Grand papillon très rare, sa présence serait possible uniquement dans une petite moitié nord de l'Aveyron (cf. carte de répartition). On le trouve dans les forêts avec Tremble de fin mai à début août.



Pauline Dréno




Grande Coronide (*Satyrus ferula*):

La Grande Coronide se trouve surtout dans le sud-ouest du département. De petites populations locales sont à détecter sur le Causse comtal, le Rougier de Marcillac, dans le secteur Villefranche-Villeneuve, ou encore à l'est du Ségala... Chenilles sur Graminées (fétuques). Pentcs rocheuses et pelouses sèches caillouteuses de juin à début septembre.



Fabrice Merland




Hespérie de la malope (*Pyrgus onopordi*):

On observe pour beaucoup d'Hespéries un manque de données, celle-ci est à rechercher vers la bordure ouest du département et dans la partie sud-est d'influence méditerranéenne. Il est possible de faire un prélèvement pour analyse des genitalia si une détermination se révèle difficile, nous contacter pour la procédure. Pelouses, prairies, friches agricoles d'avril à début octobre, chenille sur Potentilles.



Fabrice Merland




> Pour l'identification souvent délicate des Hespéries, on peut se référer au document d'identification des Pyrgus établi par Cédric Jacquier que l'on peut retrouver sur le site de la base de données : https://www.faune-tarn-aveyron.org/index.php?m_id=20052

Hespérie de l'épiaire (*Carcharodus lavatherae*):

Peu de données également pour cette Hespérie, rare et probablement sous-prospectée. A chercher notamment autour de Marcillac-vallon et en second lieu sur le causse Comtal. Sa présence est également probable dans l'ouest et le secteur Séveragais. Chenilles sur Epiaire droite et Crapaudines, l'Hespérie de l'épiaire se trouve sur pelouses et lisières sèches, landes caillouteuses, éboulis végétalisés de juin à début août.



Rodolphe Liozon




Hespérie du marrube (*Carcharodus floccifera*):

Rare Hespérie, elle est à chercher dans les prairies du nord, dans et autour du Lévezou, les environs de Nant, la bordure ouest du Larzac et le secteur des Monts de Lacaune. Ses plantes hôtes sont les Epiaires et les Marrubes, on la trouve de mai à août dans les prairies.



Pierre Bonmariage




Mélitée noirâtre (*Melitaea diamina*):

Mélitée dont la présence est à découvrir dans les Monts de Lacaune ainsi que dans les zones humides du nord-ouest du département et dont la répartition est à compléter dans les zones humides du Lévezou. La Mélitée noirâtre affectionne ainsi les prairies humides, les tourbières et on peut la trouver plus rarement (en altitude) en lisières, clairières et pentes rocheuses. Chenilles sur Valérianes, vole de fin mai à août.



Laurent Fructidor




Miroir (*Heteropterus morpheus*):

La plus grande Hespérie de France est à rechercher dans le Lévezou, à l'extrême sud de l'Aveyron dans les vallées de la Rance et du Dourdou ainsi que sur les contreforts de l'Aubrac. Son observation est également possible en Aubrac mais le Miroir privilégie les altitudes inférieures à 1000m. Plantes hôtes : grandes Graminées. Milieux humides et/ou frais de juin à juillet.



Sylvie Desvignes-Michelin




Moyen Argus (Azuré du genêt) (*Plebejus idas*) :

Attention à la confusion avec le Petit Argus (*Plebejus argus*) ! On peut les différencier entre autres par la série de points noirs sur le dessous de l'aile antérieure qui est peu courbée chez le Moyen, alors que presque en forme de point d'interrogation chez le Petit. Chez les mâles, la bordure noire est également plus épaisse sur le dessus des ailes du Petit Argus. La répartition du Moyen Argus est à compléter au nord de l'Aveyron, sur le Lévezou et dans les Monts de Lacaune. Vol de fin mai à début septembre.



Stéphane Combaud




Nacré de la filipendule (*Brenthis hecate*) :

On observe ces dernières années une fragmentation des populations de ce Nacré. Il est à rechercher dans les secteurs de St Geniez-St Laurent d'Olt (zone calcaire marneuse), de Saint-Santin (présence d'une population voisine sur la partie Cantalienne de la commune), et sur le Causse de Lanhac à proximité de Muret-le-Château. Milieux de prédilection : pelouses sèches et prairies à Filipendule, vol de fin mai à début juillet.



Pauline Dréno




Nacré de la sanguisorbe (*Brenthis ino*):

La présence de ce Nacré est à chercher dans la partie basse du bassin du Viaur depuis St André de Najac jusqu'à Centrès, et les données sont à compléter en Viadène et sur le Lézou. Chenilles sur reine des prés, Sanguisorbe et Pimprenelle. Ce papillon affectionne les prairies humides, les tourbières, les clairières et les lisières, de juin à mi-août.



Francis Bonnet




Petit Collier argenté (*Boloria selene*):

Papillon à prospecter dans l'ouest du département comme la vallée de l'Aveyron par exemple, et dans le sud-ouest tel que dans le bassin du Viaur. Il a pour plantes hôtes les Violettes et vole dans les landes, tourbières, prairies humides et clairières des bois de fin mai à septembre.



Stéphane Combaud




Piéride de l'ibéride (*Pieris manni*) :

Papillon à rechercher partout. Attention car la Piéride de l'ibéride se confond facilement avec la Piéride de la rave, il faut donc contrôler attentivement et systématiquement les critères (entre autre : tâche noire à l'apex du dessus de l'aile antérieure qui descend le long du bord de l'aile et écailles grises des deux côtés de la cellule sur le dessous de l'aile postérieure chez la P. de l'ibéride, tâche noire qui ne descend pas et écailles grises uniquement en dessous de la cellule pour la P. de la rave). Chenilles sur Crucifères, vole en pelouses sèches, pentes rocheuses, friches et jardins d'avril à octobre.



Pauline Dréno




Plain-chant (*Pyrgus alveus*) :

Comme les autres Hespéries, peu de données pour le Plain-Chant qui est à chercher dans le Lévezou, le nord et tout le sud de l'Aveyron. A pour plantes hôtes les Hélianthèmes, se trouve en pelouses et prairies de juin à août.



Fabrice Merland




Semi-Apollon (*Parnassius mnemosyne*) :

A ne pas confondre avec le Gazé, ce papillon est à chercher autour de la seule population d'Aveyron isolée en Aubrac. Il a pour plantes hôtes les Corydales, et vole en clairières et lisières des bois au-dessus de 800m de mai à juillet.



Pauline Dréno




Soufré (*Colias hyale*) :

Espèce sporadique en Aveyron. La morphologie du Soufré est extrêmement semblable à celle du Fluoré mais leur biologie est bien différente. Il faut ainsi avoir systématiquement un regard attentif sur les Fluorés/Soufrés observés et chercher à analyser le milieu afin d'arriver à une éventuelle détermination. Le Fluoré se trouve typiquement en pelouses sèches sur sols calcaires et a pour plantes hôtes les Hippocrépis à toupet et les Coronilles bigarrées, tandis que le Soufré préfère les milieux plus frais tels que les prairies et champs de Luzerne et Trèfles sur lesquels il pond. Vol de mai à octobre.



Stéphane Combaud




Attention : Ci-contre carte de répartition du Fluoré/Soufré, non représentative.

Thècle (Thécla) de l'orme (*Satyrium w-album*) :

Potentiellement présent partout en Aveyron, peu de données pour le Thècle de l'Orme qui est une espèce difficile à détecter car vole la plupart du temps au sommet des Ormes, il faut donc être attentif si présence de cet arbre ! Juin juillet.



Gaël Marceny




Grand Mars changeant (*Apatura iris*) :

Grand et beau papillon peu abondant aux reflets bleu-violet chez le mâle, à ne pas confondre avec le Petit Mars changeant beaucoup plus courant et qui ne présente pas une bande blanche sur le dessous de l'aile postérieure aussi marquée que chez le grand Mars changeant. A chercher sur le Lévezou, dans la vallée de l'Aveyron entre Rodez et Villefranche-de-Rouergue, ainsi que dans le bassin du Viaur. Chenilles sur Saules, vole en forêts et vallées boisées de mi-juin à fin août.



Laurent Fructidor




Fadet de la mélisque (*Coenonympha glycerion*) :

Une seule véritable petite population isolée de ce papillon serait connue dans le département. Il est donc à rechercher sur le Causse Noir et un contrôle attentif de tous les papillons observés du genre *Coenonympha* doit être effectué de fin juin à juillet sur les secteurs présentant des graminées afin de ne pas manquer ce papillon facilement confondable avec ses cousins. Plantes hôtes parmi les Graminées, vole en pelouses sèches et clairières de fin juin à début juillet.



Laurent Fructidor



- Espèces visibles (imago ou chenilles) en juin en Aveyron :

(Dans l'ordre décroissant du nombre d'observations sur faune-tarn-aveyron.org en juin)

- Demi-deuil** (*Melanargia galathea*)
- Myrtil** (*Maniola jurtina*)
- Procris (Fadet commun)** (*Coenonympha pamphilus*)
- Gazé** (*Aporia crataegi*)
- Céphale** (*Coenonympha arcania*)
- Silène** (*Brintesia circe*)
- Azuré commun** (*Polyommatus icarus*)
- Paon du jour** (*Aglais io*)
- Piéride du chou** (*Pieris brassicae*)
- Belle Dame** (*Vanessa cardui*)
- Tristan** (*Aphantopus hyperantus*)
- Mélitée orangée** (*Melitaea didyma*)
- Nacré de la ronce** (*Brenthis daphne*)
- Piéride de la rave** (*Pieris rapae*)
- Argus (Azuré) bleu céleste** (*Lysandra bellargus*)
- Argus frêle** (*Cupido minimus*)
- Hespérie du dactyle** (*Thymelicus lineola*)

Tircis (*Pararge aegeria*)
Vulcain (*Vanessa atalanta*)
Citron (*Gonepteryx rhamni*)
Moiré des fétuques (*Erebia meolans*)
Souci (*Colias crocea*)
Petite Tortue (*Aglais urticae*)
Piéride du navet (*Pieris napi*)
Mélitée des mélampyres (*Melitaea athalia*)
Mégère (Satyre) (*Lasiommata megera*)
Hespérie de la houque (*Thymelicus sylvestris*)
Petit Argus (Azuré de l'ajonc) (*Plebejus argus*)
Flambé (*Iphiclides podalirius*)
Sylvain azuré (*Limenitis reducta*)
Tabac d'Espagne (*Argynnis paphia*)
Citron de Provence (*Gonepteryx cleopatra*)
Petit Nacré (*Issoria lathonia*)
Machaon (*Papilio machaon*)
Piéride de la moutarde (*Leptidea sinapis*)
Robert-le-diable (C-blanc) (*Polygonia c-album*)
Thècle (Thécla) de l'yeuse (*Satyrium ilicis*)
Mélitée des scabieuses (*Melitaea parthenoides*)
Mélitée des centaurées (*Melitaea phoebe*)
Sylvaine (*Ochlodes sylvanus*)
Mélitée du plantain (*Melitaea cinxia*)
Cuivré commun (*Lycaena phlaeas*)
Mélitée du mélampyre / de Fruhstorfer (*Melitaea athalia / celadussa*)
Tityre (Ocellé rubané) (*Pyronia bathseba*)
Némusien (Ariane) (*Lasiommata maera*)
Petit Sylvain (*Limenitis camilla*)
Damier de la succise (*Euphydryas aurinia*)
Thècle (Thécla) des nerpruns (*Satyrium spini*)
Grand Collier argenté (*Boloria euphrosyne*)
Agreste (*Hipparchia semele*)
Petit Collier argenté (*Boloria selene*)
Mélitée noirâtre (*Melitaea diamina*)
Collier de corail (*Aricia agestis*)
Demi-Argus (*Cyaniris semiargus*)
Petite Violette (*Boloria dia*)
Fluoré (*Colias alfacariensis*)
Azuré des nerpruns (*Celastrina argiolus*)
Nacré de la filipendule (*Brenthis hecate*)
Azuré d'Escher (A. du plantain) (*Polyommatus escheri*)
Cuivré mauvin (C. flamboyant) (*Lycaena alciphron*)
Chiffre (*Fabriciana niobe*)
Aurore (*Anthocharis cardamines*)
Mélitée de Fruhstorfer (*Melitaea celadussa*)
Fadet des garrigues (*Coenonympha dorus*)
Grand Nacré (*Speyeria aglaja*)
Moiré des luzules (*Erebia oeme*)
Azuré Osiris (A. de la chevrette) (*Cupido osiris*)
Petit Mars changeant (*Apatura ilia*)
Thècle (Thécla) de l'amarel (*Satyrium acaciae*)
Sylvandre (*Hipparchia fagi*)
Azuré du serpolet (*Phengaris arion*)
Miroir (*Heteropterus morpheus*)

Hespérie du carthame (*Pyrgus carthami*)
 Azuré des cytises (*Glaucopsyche alexis*)
 Hespérie du chiendent (*Thymelicus acteon*)
Nacré de la sanguisorbe (*Brenthis ino*)
 Argus vert (*Callophrys rubi*)
 Azuré du thym (A. de la sarriette) (*Pseudophilotes baton*)
Semi-Apollon (*Parnassius mnemosyne*)
Azuré de la jarosse (*Polyommatus amandus*)
 Grande Tortue (*Nymphalis polychloros*)
 Azuré de la faucille (*Cupido alcetas*)
 Point-de-Hongrie (*Erynnis tages*)
 Hespérie des sanguisorbes (*Spialia sertorius*)
Proserpine (*Zerynthia rumina*)
 Moyen Nacré (*Fabriciana adippe*)
Grande Coronide (*Satyrus ferula*)
 Carte géographique (*Araschnia levana*)
 Lucine (*Hamearis lucina*)
Moyen Argus (Azuré du genêt) (*Plebejus idas*)
Azuré des orpins (*Scolitantides orion*)
 Marbré-de-vert (*Pontia daplidice*)
 Hespérie faux-tacheté (H. de l'aigremoine) (*Pyrgus malvoides*)
 Hespérie de l'alcée (Grisette) (*Carcharodus alceae*)
 Cuivré fuligineux (*Lycaena tityrus*)
Azuré de Chapman (A. de l'esparcette) (*Polyommatus thersites*)
Cuivré écarlate (*Lycaena hippothoe*)
 Piéride de la moutarde / de Réal (*Leptidea sinapis / reali*)
Échiquier d'Esper (*Melanargia russiae*)
Grand Mars changeant (*Apatura iris*)
 Marbré de Cramer (*Euchloe crameri*)
Hespérie de l'épiaire (*Carcharodus lavatherae*)
 Mélitée des linaires (*Melitaea deione*)
Azuré de la badasse (*Glaucopsyche melanops*)
Hespérie des potentilles (*Pyrgus armoricanus*)
 Azuré porte-queue (*Lampides boeticus*)
Azuré de l'orobe (*Polyommatus daphnis*)
Bleu-nacré espagnol (*Lysandra hispana*)
 Amaryllis (*Pyronia tithonus*)
 Thècle (Thécla) du chêne (*Quercusia quercus*)
Plain-chant (*Pyrgus alveus*)
Hespérie de la mauve / faux-tacheté (*Pyrgus malvae / malvoides*)
Grand Sylvain (*Limenitis populi*)
 Fluoré / Soufré (*Colias alfacariensis / hyale*)
Cardinal (*Argynnis pandora*)
Azuré du mélilot (*Polyommatus dorylas*)
 Thècle (Thécla) du frêne (*Laeosopis roboris*)
Argus de la sanguinaire (*Eumedonia eumedon*)
Bleu-nacré (Argus bleu-nacré) (*Lysandra coridon*)
Piéride de l'ibéride (*Pieris manni*)
Nacré porphyrin (*Boloria titania*)
 Thècle (Thécla) du prunier (*Satyrium pruni*)
 Thècle (Thécla) de l'orme (*Satyrium w-album*)
Hespérie de l'alchémille (*Pyrgus serratulae*)
 Echancré (*Libythea celtis*)
Hespérie du marrube (*Carcharodus floccifera*)
Sylvandre helvétique (*Hipparchia genava*)

Azuré du trèfle (*Cupido argiades*)
Fadet de la mélisse (*Coenonympha glycerion*)
Comma (*Hesperia comma*)
Petit Sylvandre (*Hipparchia alcyone*)
Piéride de la rave / de l'ibéride (*Pieris rapae / manni*)
Hespérie de la mauve (*Pyrgus malvae*)
Soufré (probable) (*Colias cf. hyale*)
Échiquier d'Occitanie (*Melanargia occitanica*)
Louvet (*Hyponphele lupina*)
Thècle (Thécla) du kermès (*Satyrium esculi*)
Morio (*Nymphalis antiopa*)
Brun des pèlargoniums (*Cacyreus marshalli*)
Hespérie des hélianthèmes (*Pyrgus foulquieri*)
Diane (*Zerynthia polyxena*)
Hespérie de Rambur (H. des cirses) (*Pyrgus cirsii*)
Azuré de Lang (A. de la luzerne) (*Leptotes pirithous*)
Soufré (*Colias hyale*)
Hespérie de la malope (*Pyrgus onopordi*)
Cuivré de la verge d'or (*Lycaena virgaureae*)
Piéride de Duponchel (*Leptidea duponcheli*)
Grand Nègre des bois (*Minois dryas*)
Moiré blanc-fascié (*Erebia ligea*)
Azuré des mouillères / de la croissette (*Phengaris alcon ecotype alcon ou rebeli*)