



Les oiseaux rares en 2006 en Région Centre



Bécasseau de Temminck, le Louroux, septembre 2006 (David Greyo)

2^{ème} rapport du Comité d'Homologation Régional Centre



Les oiseaux rares en Région Centre en 2006

2^{ème} rapport du Comité d'Homologation Régional Centre

NIDAL ISSA & le CHR Centre

Le Comité d'Homologation Régional a pour objet de récolter des données circonstanciées d'espèces rares et occasionnelles en Région Centre, afin de préciser leur statut à l'échelle régionale. Ces observations donnent lieu à la rédaction et la publication d'un rapport, mis à disposition de l'ensemble de la communauté ornithologique tant régionale que nationale. Le CHR Centre collecte, centralise et transmet également les observations régionales, d'espèces rares au plan national, au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR). Cela se matérialise chaque année par la publication d'un rapport annuel du CMR dans la revue d'ornithologie française *Ornithos*.

Suite au déclassement par le Comité d'Homologation National (C.H.N.) de 9 espèces, ces dernières ont été intégrées à la liste des migrateurs rares en France suivis par le C.M.R. (ZUCCA & le CMR, 2007). Parmi elles, 7 ont déjà été observées en région Centre et sont désormais soumis à homologation régionale. Ces nouvelles espèces sont : Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, Marouette poussin *Porzana parva*, Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*, Pipit de Richard *Anthus richardi*, Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*, Gobemouche nain *Ficedula parva*.

Ce second rapport du Comité d'Homologation Régional pour la région Centre (CHR Centre) couvre l'année 2006. Le nombre de fiches examinées par le CHR pour l'année 2006 est de 203 auquel s'ajoute 11 concernant l'année 2005. Le taux d'acceptation atteint 97,3%.

En 2007, le CHR Centre était composé des 9 membres suivants : Renaud Baeta, Jean-Yves Barnagaud, Pierre Cabard, Jean-Michel Chartendault, Nidal Issa (secrétaire), Alexandre Liger, Julien Présent, Julien Thurel et Tony Williams.

Les fiches et la liste des espèces CHR Centre sont disponibles sur :

<http://biodiversite.naturecentre.org/homechr/accueil.htm> Ou
<http://cahiersnaturalistes.free.fr/oiseaux/CHRC/CHRCentre.htm>

Les fiches d'homologation, une fois remplies, sont à retourner à :

Nidal ISSA / Secrétaire du CHR Centre

16, rue Azay-le-Rideau

37300 Joué-lès-Tours

nidalissa2002@yahoo.fr

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, pour les espèces anciennement soumises à homologation nationale, le nombre de données et d'individus homologués depuis la création du CHN en 1981.
3. Entre parenthèse, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondant homologués depuis 2005 (date de création du CHR Centre), 2006 exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondant homologués pour 2006.
3. La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique.
4. Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
5. Commune, lieu-dit, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus.
6. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
7. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
8. Date(s) d'observation.
9. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique.
10. La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique occidental (CAF/LPO 2003).
11. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Tichodrome échelette - un adulte à Bourges, Cher, du 12 décembre au 26 février 2006 (P. d'Orléans, F. Besson, P. Derrien, A. Liger & al., in Issa & al. 2006).

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* (2/2 – 1/1)

Niche dans les fjords, les lacs et étangs des zones boréales et subarctiques jusqu'au 83° Nord. En Europe, la zone de reproduction s'étend de la Scandinavie à la Sibérie, l'Islande et l'Ecosse. Hivernent le long des côtes et estuaires de l'Europe occidentale et du sud, à l'est jusqu'à la Mer Noire.

Cher - Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, ad./E1, phot., 15 avril (M. Mabillean).

Les observations printanières d'individus revêtant leur plumage nuptial sont assez rares, les plongeurs étant plutôt d'apparition automnale ou hivernale.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (1/1 – 4/4)

Zone de répartition néarctique. Dans le Paléarctique, niche uniquement en Islande et sur l'île de Bear. Hivernent le long des côtes du nord de la Scandinavie, de Grande-Bretagne, la Mer du Nord, au sud jusqu'au Portugal.

Indre-et-Loire - Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Les Ténières, 1^{er} hiver, phot., 01 au 24 décembre (R. Baeta, J. Présent & al.) ; Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Les Ténières, ad., 05 au 17 décembre (L. Sallé & al.) ; La Riche/La Potetterie, H1, 08 décembre (R. Baeta).

Loir-et-Cher - Noyers-sur-Cher/Lac des trois provinces, 1^{er} hiver, phot./vidéo, 09 décembre au 11 janvier 2007 (F. Pelsy, A. Pollet).

Très bonne année avec une arrivée quasi simultanée de plusieurs oiseaux début décembre. La Touraine n'avait plus accueilli l'espèce depuis l'observation d'un juvénile en janvier 1999 aux Ténières.



Fig. 1 : Plongeon imbrin *Gavia immer*, Noyers-sur-Cher (41) - décembre 2006 (A. Pollet).

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (1/1 – 4/4)

Dans le Paléarctique occidental, la population reproductrice s'étend de la Russie à l'Allemagne à l'ouest et à la Turquie au sud. Hivernent principalement le long des côtes du nord de l'Europe, de la Mer Noire et de l'Adriatique.

Cher - Avord, 1^{er} hiver, phot., 22 janvier (J.-M. Chartendault) ; Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, ad., phot., 22 janvier au 14 avril (D. Chavigny, B. Delahaie, P. Derland, M. Mabillean & al.) ; Bourges/bassin A 71, ad., 26 février (N. Issa).

Loiret - Pithiviers-le-Vieil/Bassins de décantation, ad., phot., 21 avril (B. Delahaie, S. Verneau).

Nombre de données supérieur à la moyenne annuelle. L'oiseau d'Argent-sur-Sauldre a hiverné durant 3 mois sur le site. Le Cher tire son épingle du jeu avec 3 des 4 observations enregistrées cette année.



Fig. 2 : Grèbe jougris *Podiceps grisegena*, Argent-sur-Sauldre (18) - avril 2006 (M. Mabillean).



Fig. 3 : Grèbe jougris *Podiceps grisegena*, Pithiviers-le-Vieil (45) - 21 avril 2006 (B. Delahaie).

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (1/1 – 4/4)

Distribution holarctique. Niche en Islande, Ecosse, Fennoscandie, dans les Pays Baltes et en Russie. Hiverné le long des côtes françaises de l'Atlantique, les Mers du Nord, Baltique et Adriatique, à l'est jusqu'à la Mer Noire.

Cher - Belleville sur Loire/Loire, ad., phot., 04 et 05 février (P. Derrien) ; Sancoins/Etang de Javoulet, 22 au 26 mars (J.-M. Chartendault, P. Derrien).

Indre - Rosnay/Etang de la Mer Rouge, ad., phot., 30 janvier (C. Gayout) ; Rosnay/Etang de la Mer Rouge, ad., phot., 01 mars (A. Rougeron, T. Chatton).

Année supérieure à la moyenne avec 4 oiseaux, mais les stationnements ont toutefois été relativement brefs.



Fig. 4 : Grèbe esclavon *Podiceps auritus*, Rosnay (36) - 30 janvier 2006 (C. Gayout).

OCEANITE CULBLANC *Oceanodroma leucorhoa* (0/0 – 2/2)

La sous-espèce nominale niche de la Norvège à l'est du Canada, en passant par la Grande-Bretagne. Hiverné en mer, principalement dans les eaux tropicales de l'Atlantique.

Indre - Vendoeuvre, phot., capt., 08 décembre (J. Vêque, N. Grenouilloux).

Loiret - Ouzouer-sur-Trézée/Etang de la Grand' Rue, 08 décembre (T. Joubert).



Fig. 5 : Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa*, Vendoeuvre (36) - 08 décembre 2006 (J. Vêque).



Fig. 6 : Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa*, Vendoeuvre (36) - 08 décembre 2006 (J. Vêque).

Suite à l'afflux massif ayant touché la façade ouest Atlantique le 08 décembre, deux individus ont été découverts en région Centre. L'oiseau de Brenne est mort le jour même après avoir atterri sur un terrain de foot et des plumes du second ont été retrouvées aux abords de l'Etang de la Grand' Rue quelques jours après l'observation.

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris* (3/3 – 5/8)

Espèce paléarctique nichant en roselière dans l'ensemble de l'Europe, où les bastions se situent essentiellement à l'Est, en Pologne, Ukraine et Russie. Les populations d'Europe Occidentale sont partiellement migratrices, celles d'Europe Orientale et de Russie hivernent au Moyen-Orient, sur le Bassin Méditerranéen et en Afrique.

Homologable en dehors de l'Indre.

Cher - Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, 13 janvier (V. De Wilde) ; Sancoins/Etang de Javoulet, ad., 19 mars (J.-M. Chartendault, P. Derrien).

Loiret - Vitry-aux-Loges/Etang de la Vallée, 3 ad., phot., 11 février (G. & G. Monchaux).

Loir-et-Cher - Marcilly-en-Gault, 2 ad., phot, 11 février (M. Mabileau) ; Onzain/Loire, phot., 23 janvier au 25 janvier (A. Pollet, A. Pardessus).

Bien que légèrement supérieur à celui de 2003, le nombre de données paraît cette année encore en deçà des potentialités d'accueil dans les différents départements.



Fig. 7 : Butor étoilé *Botaurus stellaris*, Onzain (41) - janvier 2006 (A. Pollet).



Fig. 8 : Butor étoilé *Botaurus stellaris*, Onzain (41) - janvier 2006 (A. Pollet).

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* (2/2 – 1/3)

Niche en Europe continentale au sud de 59° de latitude nord, à l'est jusqu'en Irak, en Iran, au Pakistan et au Bhoutan. Les populations européennes hivernent principalement en Afrique de l'Est, au Soudan et en Ethiopie, à l'ouest jusqu'à la République Démocratique du Congo.

Homologable en dehors de l'Indre.

Loiret - Localité tenue secrète, un couple donnant 2 jeunes volants, phot., 12 juin au 08 août (J. Thurel).

Après l'apparition en juin 2005 d'un mâle, l'installation d'un couple a aboutit cette année à la reproduction de l'espèce, prouvée grâce au suivi régulier du site. Les adultes sont observés accompagnés de deux jeunes volants à la fin de l'été.

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (2/2 – 1/1)

Niche dans le Bassin Méditerranéen, sur le pourtour de la Mer Noire et de la Mer Caspienne, et en petit nombre en Afrique du Nord.

Indre - Rosnay, ad., 28 juillet (M. & B. Mabileau).

Une nouvelle donnée en provenance de Brenne, où un à deux couples nicheurs sont répertoriés chaque année.

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (5/10 – 11/15)

Dans le Paléarctique, niche au nord du 55° N, en France, Espagne, Pays-Bas, en Europe orientale, à l'est jusqu'à la Mer Caspienne. Les populations européennes hivernent sur le pourtour méditerranéen et au nord de l'Afrique tropicale.

Indre - Mézières-en-Brenne/Etang des Vigneaux, ad., 18 au 23 février (Indre Nature, M. Prévost, V. Marsaudon) ; Mézières-en-Brenne/Etang de Piégu, ad., phot., 21 avril (A. Trompat, D. Auclair) ; Mézières-en-Brenne/Etang de Piégu, ad., phot., 29 et 30 avril (V. Nivet-Mazerolles) ; Lingé/Etang de Monplaisir, 3 ad., 05 juin (M. Prévost).

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, ad., 24 septembre (B. Griard, A. Muzard, S. Reverdiau) ; Rillé/Lac, 2 ad., 26 septembre (L. & D. Sallé) ; Rillé/Lac, juv., 07 octobre (J.-Y. Barnagaud, D. & L. Sallé) ; Sonzay/Baugé, juvénile, phot., 08 novembre (J. Présent, C. Lelaure).

Loiret - Sandillon/ La Haute Ile, 1^{er} hiver, 15 janvier au 19 février (S. Branchereau, J. Thurel, L. Sallé).

Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang d'Omblin, 2 ind., 15 janvier (B. Bayle) ; Vernou en Sologne, adulte, phot., 19 avril (M. Mabileau).

Nombre d'individus conforme à la moyenne annuelle. Pour la seconde année consécutive, un oiseau immature a hiverné partiellement dans le département du Loiret.

OIE RIEUSE *Anser albifrons* (8/17 – 1/1)

Niche dans la toundra arctique du nord de la Sibérie, à proximité de plans d'eau. En Europe, une partie de la population hiverne dans la zone de la Mer Baltique, comprenant la Hollande, la Belgique, la Grande-Bretagne et la France ; la seconde hiverne dans la partie orientale : ex-Yougoslavie, Albanie, Grèce.

Indre - Rosnay/Etang de la Mer Rouge, ad., 22 janvier (M. Prévost).

Nombre de données minimal comparé aux 17 oiseaux ayant fait leur apparition dans la région en 2005.

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (1/1 – 1/1)

Niche à l'est du Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble. Il existe également des populations férales en forte augmentation sur quelques îles de la Baltique et aux Pays-Bas. L'aire d'hivernage s'étend de l'Irlande à l'Ecosse et de la Belgique au Danemark.

Indre-et-Loire - Vouvray/La Frillière, 11 au 15 décembre (R. Baeta, C. Lelaure, J. Présent).

A l'instar de 2005, un seul oiseau a été noté en 2006. Pour la seconde année consécutive, aucun oiseau n'a fait halte à Avord (Cher), où l'espèce est pourtant régulière en hivernage et en migration.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (2/3 – 1/1)

Se reproduit dans l'Arctique circumpolaire et hiverne le long des côtes maritimes des zones tempérées d'Eurasie et d'Amérique du Nord. Bernicla niche en Sibérie occidentale jusqu'à la Péninsule de Taïmyr, hrota au Groenland, au Spitzberg et dans l'Arctique canadien, nigricans de l'île Victoria au Canada jusqu'au nord-est de la Sibérie.

Indre - Rosnay/ Etang de Montiacre puis Saint-Michel-en-Brenne/Etang du Tran, ad., sous-espèce *bernicla*, phot., 10 au 12 février (T. Williams, C. Mercier, M. Prévost & al.).

Petite année pour cette espèce d'apparition occasionnelle à l'intérieur des terres.

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (2/4 – 21/45)

Niche en Espagne, en France, en Europe Centrale, en Anatolie, à l'est de la Mer Noire et la Mer Caspienne jusqu'en Asie centrale. Migrateur à migrateur partiel, hiverne essentiellement dans les régions du Bassin Méditerranéen.

Homologable en dehors de l'Indre.

Cher - Belleville sur Loire/Etang des Grèves, 3 ad., (1 mâle, 2 fem.), phot., 22 février (P. Derrien) ; Avord, 2 ad. (mâle, fem.), 01 novembre (F. Besson, J.-M. Chartendault) ; Bessay le Fromental/Etang des Barres, 11 ind. (couple avec 9 pulli), phot., 07 au 26 juillet (A. Trompat, D. Auclair, J. Fombonnat).

Indre-et-Loire - Ambillou/Etang des 3 Frères, fem. ad., 17 février (J. Présent) ; Saint-Pierre-des-Corps/L'Ouche du Rochin, 4 ad. (2 mâles, 2 fem.), 22 mars (D. Sallé) ; Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Les Ténrières, juv., 30 juillet (L. Le Gal, J. Présent) ; Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Les Ténrières, juv., 22 septembre (R. Baeta, J. Présent) ; La Riche/La Potetterie, mâle et fem. imm., phot., 09 octobre (J. Présent) ; Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Les Ténrières, fem. ad., phot., 29 octobre (D. Sallé, J. Présent, C. Rigoux).

Loiret - Bonnée/La plaine aux lièvres, mâle et fem. ad., 30 avril (T. Joubert) ; Bonnée/La plaine aux lièvres-La Grande Visure, mâle ad., phot., 13 au 24 mai (C. Lartigau, G. & G. Monchaux, J. Thurel) ; Sully-sur-Loire/Le Chêne «Etang», mâle ad., phot., 26 mai (C. Lartigau) ; Ruan/Bassins, 3 juv., phot., 02 septembre (B. & F. Delahaie) ; Dry/La Grand-Maison, mâle ad., 03 au 05 septembre (G. & P. Chevrier, S. Branchereau) ; Ruan/Bassins de décantation, fem. ad., 09 au 16 septembre (B. & P. Delahaie) ; Guilly/Bouteille, mâle ad., phot., 18 novembre (J. Thurel, A. Larousse, V. De Wilde) ; Bonnée/La Grande Visure, mâle ad., 24 décembre (C. Lartigau).

Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang de Marcilly, mâle et fem. ad., phot., 17 avril (M. Mabileau) ; Chémery/Etang de l'Arche, 3 ad. (mâle, 2 fem.), phot., 15 mai au 28 juin (F. Pelsy, A. Perthuis, A. Pollet) ; Chémery/Etang de



Fig. 10 et 11 : Harelde boréale *Clangula hyemalis*, Saint-Viâtre (41) - mai-juin 2006 (J.-M. Chartendrault).

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (1/2 – 2/2)

Niche dans les régions boréales et arctique du nord de l'Europe, Ecosse, Irlande, Scandinavie et du nord de la Russie, à l'est jusqu'au fleuve Olenek. Hiverné le long des côtes atlantiques du nord de la Scandinavie à la Mauritanie.

Indre-et-Loire - Saint-Avertin/Lac des Peupleraies, fem. imm., phot., 11 décembre (T. Bousserau).

Loir-et-Cher - Lassay-sur-Croisne/Etang Bézard, fem. ad., vidéo, 29 novembre (F. Pelsy).

Nombre d'oiseaux similaire à celui de 2005. Ce canard marin a tendance à apparaître plutôt dans la moitié ouest de la région.



Fig. 12 : Macreuse noire *Melanitta nigra*, Saint-Avertin (37) - 11 décembre 2006 (T. Bousserau).

HARLE HUPPE *Mergus serrator* (1/1 – 3/7)

Niche dans les zones boréales et océaniques d'Europe du Nord, d'Islande, de Grande-Bretagne, de Scandinavie, à l'est jusqu'au nord de la Sibérie. Hiverné le long des côtes d'Europe atlantique, de Méditerranée Orientale, de la Mer Noire jusqu'à la Mer Caspienne.

Indre-et-Loire – Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Les Ténières, 2 fem. ad., 17 au 26 mars (R. Baeta, J. Présent) ; Montlouis-sur-Loire/Ile Courtemanche, 4 fem., 30 mars (J. Présent) ; La Riche/La Potetterie, fem./juv., 01 décembre au 02 janvier 2007 (B. Griard & al.).

La totalité des observations provient cette année encore de Touraine, fournissant au passage un nombre de données record pour le département.

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (1/1 – 3/3)

Répartition néarctique. Introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement. En France, niche notamment sur le Lac de Grand-Lieu en Loire-Atlantique et en Mayenne.

Indre - Lingé/Etang du Gabriau, fem. ad., 20 avril (M. Prévost).

Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang de la Grande Corbois, fem. ad., 13 septembre (F. Pelsy) ; Neung-sur-Beuvron/Etang de Panama, fem. ad., 27 octobre (M. & B. Mabilieu).

Année relativement bonne avec trois oiseaux notés à des dates habituelles.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (4/5 – 2/1)

Niche du Groenland au Japon, depuis la Méditerranée et les zones tempérées jusqu'aux régions boréales et à la toundra. Toujours lié à la proximité des milieux aquatiques.

Indre - Niherne/Etang des Loges, ad., 11 et 12 février (M. Prévost, F. Desage) ; Mézière-en-Brenne/D 14b, ad., 27 février (E. & M. Holthof).

2005 - Lingé/Etang de la Gabrière, 2 ind. de 2^{ème} année, 09 février (A. Rougeron). *Mêmes que ceux de Rosnay/Etang du Sault le 20 février (Cf. Premier rapport du CHR Centre).*

Année moyenne avec seulement deux oiseaux dans la région de la Brenne, dont l'individu revenant de l'étang des Loges.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (0/0 – 1/1)

La sous-espèce nominale niche en Europe entre 35° et 45°N, dans l'extrême nord de l'Afrique, au Moyen-Orient et dans l'Ouest de l'Asie. Espèce erratique, occasionnelle en France en dehors des zones de réintroduction.

Cher - Bourges/Aérodrome, juv., 03 juillet (M. Roux, B. Poisson).

Cette observation s'inscrit dans un contexte d'afflux de plusieurs dizaines d'oiseaux erratiques remontant vers le nord dans la moitié Est de la France. L'oiseau est contacté à 1200 m d'altitude lors d'un vol en planeur au dessus de Bourges. Suivi jusqu'à Saint-Florent-sur-Cher, le vautour se dirigera vers Issoudun.

MARQUETTE PONCTUEE *Porzana porzana* (1/1 – 1/2)

Niche dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes d'Eurasie. Hiverné en Afrique sub-saharienne.

Loir-et-Cher - Neung sur Beuvron/Etang de Beaumont, ad. et juv., phot., 05 au 15 août (A. & J.-M. Pruvost & al.).

Le nombre d'individus et leur âge a pu être déterminé grâce aux photographies réalisées par plusieurs observateurs sur le site.



Fig. 13 : Marouette ponctuée *Porzana porzana*, Neung sur Beuvron (41) - août 2006 ().

MARQUETTE POUSSIN *Porzana parva* (3/3) (0/0 – 1/1)

Niche de façon dispersée en Europe de l'Ouest, puis de façon plus continue jusqu'à l'Asie centrale et au nord-ouest de la Chine. Les populations européennes hivernent en Afrique subsaharienne. Migrateur rare et nicheur occasionnel en France.

Indre - Mézières-en-Brenne/Etang Piégu, mâle ad., 03 avril (A. Liger).

Belle découverte printanière d'un oiseau à l'Etang Piégu, le long de la route en bordure de roselière. Cette donnée intervient un an jour pour jour après celle d'une femelle observée du 03 au 15 avril 2005 à l'Etang du Louroux en Indre-et-Loire (LIGER, 2006). Il s'agit de la 4^{ème} mention régionale depuis la création du CHN en 1981. Les 2 autres mentions concernaient l'Indre en 1981.

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus* (4/4 – 4/11)

Niche le long des côtes d'Europe Occidentale et du Nord, en Russie à l'est jusqu'en Sibérie. Migrateur partiel, hiverne sur le littoral d'Europe de l'Ouest, en Afrique du Nord, au sud jusqu'au Golfe de Guinée.

Cher - Sancoins/Etang de Javoulet, 6 ad., phot., 02 avril (J.-M. Chartendault).

Indre-et-Loire - Tours/Ile aux Vaches, 24 juillet (L. Le Gal) ; Rillé/Lac, 2 ad. et 1 E1, phot., 29 août (R. Baeta, J. Présent) ; Saint Genouph/La Gaudinière, phot., 29 août (R. Baeta, J. Présent).

Bonne année pour ce limicole littoral noté lors des migrations pré- et postnuptiales.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus* (0/0 – 1/1)

Niche de l'Europe de l'Ouest et du nord-ouest de l'Afrique, à travers le Moyen-Orient et l'Asie centrale jusqu'au nord-est de la Chine et l'Extrême-Orient russe. En France, niche le long des côtes de la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Occasionnel à l'intérieur des terres.

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, fem. ad., phot., 10 avril (J.-M. Thibault).

Le « G.C.I. » demeure un limicole d'apparition très rare en région Centre. L'année 2006 fournit une mention au lac de Rillé, qui avait accueilli 2 individus en 2004.



Fig. 14 : Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*, Rillé (37) - 10 avril 2006 (J.-M. Thibault).



Fig. 15 : Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*, Rillé (37) - 10 avril 2006 (J.-M. Thibault).

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (10/56 – 3/15)

Niche en Ecosse et dans les Pyrénées, puis de la Scandinavie au sud-est de la Russie, à la Mongolie et à la Sibérie Orientale. Hiverné des contreforts de l'Atlas marocain à l'Iran en passant par tout le Maghreb. Egalement noté en petit nombre en Andalousie, en Grèce, en Sicile et dans le sud de l'Italie, en Sardaigne, en Crète et à Chypre, parfois irrégulièrement.

Eure-et-Loir - Cormainville/Moronville, 11 ad. (6 m., 5 fem.), phot., 07 et 08 mai (T. Cense, J.-Y. Barnagaud, B. & P. Delahaie, J.-M. Chartendault, P. Derrien, F. Besson).

Indre-et-Loire - Assay/Les Fontaines, 02 juin (B. Griard).

Loiret - Léouville/Le Chantier de la Mère-Dieu, 3 ad. (1 m., 2 fem.), phot., 08 mai (B. & P. Delahaie, L. Le Gal, D. Sallé).

2005 - Eure-et-Loir - Nottonville/Réclainville, 12 ind., phot., 04 et 05 mai (L. Triboulin, M. Doublet, J.-Y. Barnagaud, T. Cense, E. Guéret).

Avec les 12 individus de Nottonville, le nombre total d'oiseaux comptabilisé en 2005 s'élève à 56 individus, constituant un record annuel régional. 2006 est plus morose avec seulement 15 oiseaux recensés et aucun lors du passage postnuptial.

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (7/14 – 8/9)

Niche dans toute la zone boréale et subarctique d'Eurasie, jusqu'au Détroit de Béring à l'est de la Sibérie. La quasi-totalité des oiseaux européens rejoignent le sud du Sahara et hivernent du Sahel au Golfe de Guinée et au Kenya.

Cher - Lignéres/Etang de la Chelouze, ad., phot., 06 mai (F. Besson, J.-M. Chartendault).

Indre-et-Loire - Mosnes/La Poterie, ad., 04 mai (J. Présent) ; Saint-Pierre-des-Corps/L'Ouche du Rochin, ad., 11 mai (L. Le Gal, P. Cabard, D. Sallé) ; Montlouis-sur-Loire/Le Bas Rocher, ad., 19 mai (L. Le Gal, J. Présent) ; Le Louroux/Etang, juv., phot., 23 et 24 septembre (J.-Y. Barnagaud, J. Présent & al.) ; Rillé/Lac, juv., phot., 29 août au 02 septembre (R. Baeta, J. Présent, S. Reverdiau).

Loiret - Pithiviers-le-Vieil/Bassins de décantation, 2 ad., phot., 06 et 07 mai (B. & P. Delahaie, S. Verneau) ; Saint-Benoît-sur-Loire/L'île aux Canes, ad., phot., 29 juillet (J. Thurel).

Année conforme à la moyenne annuelle. Les dates et lieux d'observation sont également très classiques.



Fig. 16 : Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*, juv., Le Louroux (37) - 23 septembre 2006 (J.-Y. Barnagaud).

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos* (13/13) (0/0 – 1/1)

Niche dans l'Arctique nord-américain et en Sibérie, à l'ouest jusqu'à la péninsule de Yamal. Migrateur rare mais régulier en Europe, noté en petit nombre en France, essentiellement en automne.

Loiret - Ruan/Bassin de décantation, juv., 11 au 13 septembre (J. Martinez & al.).

Le suivi assidu des bassins du Ruan à l'automne par un observateur régulier s'est révélé très fructueux. Il s'agit de la 13^{ème} mention régionale (la 4^{ème} pour le Loiret) depuis la création du CHN en 1981. Les autres données concernaient l'Indre-et-Loire (5 mentions), l'Indre (3 mentions) et l'Eure-et-Loir (1 mention).

BECASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus* (5/7 – 4/5)

Niche dans les zones boréales et subarctiques de la Fennoscandie à la Sibérie orientale. Hiverné en Europe de l'Ouest et du Sud, en Afrique du Nord, au nord des zones afro tropicales, au Moyen-Orient, à l'est jusqu'au Vietnam.

Homologable en dehors de l'Indre-et-Loire.

Loiret - Sandillon/La haute île, phot., 18 mars (B. Delahaie, J. Thurel) ; Germigny-les-près/Le Foulon, 20 mars (J. Thurel) ; Saint-Père-sur-Loire/Amont du pont, 2 ind., 04 avril (J. Thurel).

Loir-et-Cher - Couffy, 27 mars (A. Pollet).

Toujours aussi peu de données pour une espèce vraisemblablement sous détectée dans la plupart des départements. Les observations sont toutes réalisées lors du passage pré-nuptial à des dates très classiques.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (0/0 – 2/2)

Niche du nord de la Scandinavie et de la Russie d'Europe jusqu'à l'Iénisseï. En France, migrateur et hivernant régulier le long du littoral atlantique et de la Manche, rare à l'intérieur des terres.

Loiret - La-Chapelle-Saint-Mesmin/Loire, juv., 13 et 14 septembre (S. Branchereau) ; Ruan/Bassin de décantation, 13 au 17 septembre (J. Martinez, B. Delahaie & al.).

Noter la concomitance de date des deux observations pour ce limicole toujours aussi rare à l'intérieur des terres.

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (6/21 – 5/6)

Niche dans les zones boréales, arctiques et subarctiques d'Islande, du nord des Iles Britanniques, de la Scandinavie à l'ouest de la Sibérie, jusqu'à la vallée de l'Iénisseï et à Taïmyr. La sous-espèce type hiverne dans les régions afro tropicales et sur les côtes de l'ouest de l'Océan Indien et occasionnellement en Europe.

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, juv., phot., 20 août (R. Baeta, C. Lelaure, L. Le Gal, A. Liger, J. Présent, C. Rigoux, D. Sallé, E. Sansault) ; Luzillé/Le Plessis, juv., 17 septembre (L. Le Gal, J. Présent).

Loiret - Pithiviers-le-Vieil/Bassins de décantation, phot., 10 avril (B. & P. Delahaie) ; Ruan/Bassin de décantation, 2 ind., 17 septembre (J. Martinez).

Loir-et-Cher - Soings en Sologne/Etang de Corbrandes, juv., 08 septembre (F. Pelsy).

2005 - Cher - Lignéres/Etang de la Chelouze, ad., 13 avril (F. Besson, P. Derrien) ; **Loiret** - Ouzouer-sur-Loire/La plaine aux Lièvres, ad., 30 avril (T. Joubert).

Tous les oiseaux sont découverts à des dates classiques de passage de l'espèce.

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (4/4 – 5/5)

Niche de la Mer Noire à l'Est du Kazakhstan et en petit nombre dans la région de Moscou en Russie, ainsi qu'en Pologne et en Allemagne. Hiverné dans le Golfe Persique, en Mer Rouge et en effectif moindre dans le centre, le nord et l'ouest de l'Europe.

Indre-et-Loire - Sonzay/C.E.T., 1^{er} hiver, 21 février (N. Issa, A. Liger, J. Présent).

Loiret - Saint-Lyé-La-Forêt/Décharge, H2, phot., 11 au 18 décembre (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/Décharge, H1, phot., 11 au 29 décembre (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/Décharge, H2, phot., 18 décembre au 31 janvier 2007 (J. Thurel, B. Delahaie, L. Sallé & al.) ; Saint-Lyé-La-Forêt/Décharge, ad., phot., 29 décembre (J. Thurel).

Belle série d'observations (réalisées par le même ornithologue !) à Saint-Lyé-La-Forêt durant le mois de décembre, fournissant au Loiret ses premières mentions de pontique. A l'inverse, année très moyenne en Touraine avec un seul oiseau noté à une date habituelle (ISSA, 2005).



Fig. 17 : Goéland pontique *Larus cachinnans*, 1^{er} hiver, en compagnie de Goélans leucophées *Larus michaellis*, Saint-Lyé-La-Forêt (45) - décembre 2006 (J. Thurel).



Fig. 18 : Goéland pontique *Larus cachinnans* (3^{ème} en partant de la gauche, même que celui de la Fig. 17), 1^{er} hiver, en compagnie de Goélans leucophées *Larus michaellis* (2 2^{ème} hiver à gauche, un 3^{ème} hiver derrière et un adulte à droite), Saint-Lyé-La-Forêt (45) - décembre 2006 (J. Thurel). Noter la tête blanche immaculée contrastant fortement avec la nuque formant un châte gris nettement délimité, l'absence de tache sombre autour de l'œil, la petitesse de ce dernier proportionnellement à la tête, la forme de la tête « en poire » avec un front très fuyant, le bec plus fin et plus long que chez le leucophée, avec un angle gonyal très peu marqué. Les couvertures sont uniformément brunes avec la présence d'une fine barre alaire pâle formée par l'extrémité des moyennes couvertures, les tertiaires sont entièrement sombres à l'exception de l'extrémité blanche, les ailes sont longues. Noter enfin le dessin en ancre fine des plumes du manteau et la structure de l'oiseau, haut sur patte.



Fig. 19 : Goéland pontique *Larus cachinnans* (même que celui de la Fig. 18), 1^{er} hiver, en compagnie de Goélands leucophées *Larus michaellis*, Saint-Lyé-La-Forêt (45) - décembre 2006 (J. Thurel). Noter l'état d'avancement de la mue des plumes du manteau.



Fig. 20 : Goéland pontique *Larus cachinnans*, ad., en compagnie d'un Goéland brun *Larus fuscus*, Saint-Lyé-La-Forêt (45) - 29 décembre 2006 (J. Thurel).



Fig. 21 : Goéland pontique *Larus cachinnans*, 2^{ème} hiver, avec des Goélands leucophées *Larus michaellis*, Saint-Lyé-La-Forêt (45) - décembre 2006 (J. Thurel).

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus* (1/1 – 8/8)

Espèce polytypique nichant dans le nord-ouest de l'Europe, de l'Islande à la Mer Blanche, au sud jusqu'à l'ouest de la France et au Pays Basque espagnol. Argentatus se reproduit dans la partie nord, en Scandinavie et au sud de la Baltique et argenteus de l'Europe occidentale à l'Islande.

Homologable en dehors de l'Indre-et-Loire.

Indre - Rosnay/Etang du Blizon, ad., 22 janvier (R. Bussière, J. Tillet).

Loiret - Orléans/Pont Thinat, ad./H4, ssp *argenteus*, 07 et 08 janvier (J.-Y. Barnagaud, J. Thurel) ; Sully-sur-Loire/La Brosse, ad., (C. Lartigau) ; Orléans/Pont Thinat, ad., ssp *argenteus*, 15 janvier (J.-Y. Barnagaud) ; Châteauneuf-sur-Loire/Aval du pont, H2, ssp *argenteus*, 27 février (J. Thurel, V. De Wilde, G. Monchaux) ; Saint-Lyé-La-Forêt/Décharge, H3, ssp *argenteus*, phot., 07 décembre au 31 janvier 2007 (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/Décharge, H1, phot., 13 décembre (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/Décharge, H1, phot., 22 décembre (J. Thurel).

La pression régulière exercée à partir de l'hiver 2006-2007 sur la décharge de Saint-Lyé-La-Forêt tempère l'apparente rareté de l'espèce dans le département du Loiret.

STERNE CASPIENNE *Sterna caspia* (0/0 – 5/8)

Dans le Paléarctique, niche en mer Baltique, mer Noire jusqu'en Asie centrale. Hiverné en Afrique subsaharienne. Migrateur peu commun à rare en France, essentiellement le long des côtes atlantiques et méditerranéennes.

Cher - Belleville sur Loire/Loire, ad., phot., 07 mai (P. Derrien).

Indre-et-Loire - Montlouis-sur-Loire/Pont SNCF, 2 ad., bagués métal, phot., 26 et 27 mars (J. Présent, R. Baeta, P. Cabard, L. Le Gal, A. Liger & al.); Saint-Genouph/La Gaudinière, ad., 06 mai (J. Présent); Saint-Genouph/La Gaudinière, ad. et juv., 16 septembre (B. Griard).

Loiret - Sandillon/Ile aux Oiseaux, 2 ad., 02 mai (T. Blanchard).

Remarquable année avec 8 individus au total ayant fait leur apparition dans la moitié des départements de la région, aussi bien au printemps qu'à l'automne.



Fig. 22 : Sterne caspienne *Sterna caspia*, Belleville sur Loire (18) - 07 mai 2006 (P. Derrien).



Fig. 23 : Sterne caspienne *Sterna caspia*, Belleville sur Loire (18) - 07 mai 2006 (P. Derrien).



Fig. 24 : Sternes caspiennes *Sterna caspia*, Montlouis-sur-Loire (37) - 26 mars 2006 (P. Cabard).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* (0/0 – 2/14)

Niche de l'Europe de l'Ouest à la mer Caspienne. Migre et hiverné le long des côtes d'Europe et d'Afrique. Occasionnelle à l'intérieure des terres.

Indre-et-Loire - Montlouis-sur-Loire/Camping, 13 ad., 16 juin (J. Présent); Montlouis-sur-Loire/Pont SNCF, ad., 20 juin (J. Présent).

Très rare à l'intérieure des terres, l'observation d'un groupe record de 13 individus mérite d'être souligné !

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus* (1/6 – 3/3)

Niche de l'Europe de l'Est à la Sibérie Orientale (région de l'Amour). Hiverné principalement en Afrique tropicale.

Indre-et-Loire - La-Chapelle-aux-Naux/Loire, ad., phot., 09 juillet (P. Cabard, L. Le Gal, J. Présent).

Loiret - Saint Denis en Val/La Haute île, ad., 30 avril (G. Monchaux).

Loir-et-Cher - Vernou en Sologne, ad., 26 avril (F. Pelsy).

Occasionnelle mais régulière au printemps. La donnée d'un oiseau en juillet est toutefois assez inhabituelle.

COUCOU GEAI *Clamator glandarius* (0/0 – 2/2)

La sous-espèce nominale niche dans quelques régions d'Europe méridionale du Moyen-Orient et d'Afrique, au nord de l'équateur. En France, son aire de répartition se limite aux départements méditerranéens. Occasionnel ailleurs en France, surtout au printemps.

Indre - Saint-Michel-en-Brenne/Etang Beauregard, 1^{er} été, phot., 10 mai (A. Ansel).

Loiret - Meung-sur-Loire/A10, 14 mai (D. Bouchet).

Découverte exceptionnelle de deux oiseaux en mai à des dates très proches. L'espèce est coutumière des overshooting de printemps dans la moitié nord de la France et jusqu'en Grande-Bretagne.



Fig. 25 : Coucou geai *Clamator glandarius*, 1^{er} été, Saint-Michel-en-Brenne (36) - 10 mai 2006 (A. Ansel).

PETIT-DUC SCOPS *Otus scops* (0/0 – 1/7)

La sous-espèce nominale se reproduit de la France (au sud de la Loire) à la Volga, au nord des Pyrénées, de la Grèce et de la Turquie.

Loir-et-Cher - Sassay/Le Clouseau, 4 ad. et 3 poussins, phot., vidéo., 04 juillet au 01 août (D. Hémerly, F. Pelsy, A. Perthuis, P. & D. Bouineau).

Riches en bonnes surprises, l'année 2006 est marquée par la redécouverte de nicheurs, comme cette micro population de petits-ducs dans le Loir-et-Cher.

GRAND-DUC D'EUROPE *Bubo bubo* (0/0 – 1/1)

La sous-espèce nominale se reproduit des Pyrénées jusqu'à 45° de longitude Est.

Indre - Fonterland/Vallée du Suin, chanteur, 07 et 13 janvier (D. Vandromme).

Noté chanteur à deux reprises dans la Vallée du Suin en plein cœur de l'hiver mais la poursuite des recherches s'avéra infructueuse.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (4/4 – 5/5)

En Europe, niche dans les régions de moyennes et hautes latitudes des zones tempérées, boréales et arctiques. Migrateur à migrateur partiel, les populations du nord de l'Europe et de Russie hivernent en Europe Occidentale et Orientale, au sud jusqu'en Afrique du Nord et au Proche-Orient.

Cher - Couargues/Les Vallées, 23 juillet (J. Pitois).

Eure-et-Loir - Allaines-Mervilliers/Villermont, phot., 17 avril (B. & P. Delahaie, P. Derland); Ecrosnes/Hameau de Giroudet, 08 octobre (L. & S. Chevallier); Janville/Bois Clergeon, 01 décembre (C. Lartigau).

Loiret - Pithiviers-le-Vieil/Bassins de décantation, ad., phot., 05 et 06 mai (P. & B. Delahaie).

Les observations se situent dans la façade est de la région. La donnée de juillet dans le Cher est intéressante, l'espèce ayant niché dans ce département par le passé (J.-M. Chartendraul comm. pers.).

PIC CENDRE *Picus canus* (5/5 – 3/3)

Sédentaire. Niche en moyennes latitudes, dans les forêts des zones tempérées et boréales d'Europe et de Russie, à l'est jusqu'aux monts de l'Altai et au fleuve Baïkal.

Indre-et-Loire - Souvigny-de-Touraine/La Bizellerie, mâle ad., phot., 23 au 26 mars (L. Le Gal, J.-M. Thibault, P. Cabard, L. & D. Sallé).

Loiret - Saint-Denis-de-l'Hôtel/Les chenailles, mâle ad., phot., 01 avril (J. Thurel, G. Monchaux); Montereau/Romeux, mâle ad., 13 mai (C. Lartigau).

Toujours très peu de données, cette espèce ne semble pas motiver les observateurs...

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla* (3/4 – 1/1)

Niche en milieu sec, dans les basses et moyennes latitudes des zones tempérées, steppiques et méditerranéennes du sud de l'Europe, d'Afrique du Nord, du Proche-Orient et de la Russie au nord de la Mer Noire. Hiverné en Afrique au sud du Sahara.

Loiret - Villeneuve sur Conie/Molaville, 08 mai (S. Branchereau).

Cette observation se rapporte à un chanteur cantonné. Affaire à suivre...

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris* (2/3 – 2/2)

Niche dans le Paléarctique Occidental, au niveau des basses et moyennes latitudes, dans les zones tempérées, steppiques et méditerranéennes. La sous-espèce nominale hiverné dans les zones du Sahel au sud du Sahara.

Loiret - Laas/Le Parc, 16 avril (J. Thurel, V. De Wilde, A. de la Faye de Guerre) ; Ruan/Bassin de décantation, ad., 13 septembre (J. Martinez).

Seulement deux données traduisant sa relative rareté en migration.

JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus* (9/204 – 0/0)

La sous-espèce nominale niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Lors de migrations partielles ou d'afflux liés à la fructification des arbres à baies dans le nord de l'Europe, l'espèce atteint le sud de la Scandinavie, le Benelux et l'ensemble de l'Europe Centrale.

2005 - Eure-et-Loir - Dreux, mâle, ad., phot., 04 mai (J. Gardon, J.-C. Bertrand).

L'afflux de 2005 aura donc au total concerné 204 individus pour la région Centre.

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (3/3 – 13/20)

Niche sur une large zone du Paléarctique d'étendant de l'Ouest de l'Europe à la Sibérie orientale et de l'Asie Centrale à la Turquie pour sa limite Sud. Hiverné en Afrique sub-saharienne, en Afrique du Nord, dans la Péninsule ibérique et au Moyen-Orient.

Indre - Lys Saint Georges/Font Punais, mâle ad., phot., 19 mars (A. & F. Gillens).

Indre-et-Loire - Saint-Pierre-des-Corps/L'Ouche du Rochin, 4 ind. (3 m., 1 fem.), phot., 19 au 23 mars (J.-M. Thibault, L. Le Gal) ; Le Louroux/Etang, 3 mâles, 20 mars (P. Cabard, J. Présent) ; Saint-Genouph/Bourg, 2 ind., 22 mars (J. Présent) ; Thizay/La Prée, 2 ind. (m. + fem.), 22 mars (J. Présent) ; Le Louroux/Etang, mâle ad., phot., 21 juillet (J.-Y. Barnagaud) ; Le Louroux/Etang, mâle ad., phot., capt., 12 août (B. Delahaie, J.-P. Pereira, J. Thurel & al.) ; Le Louroux/Etang, juv., phot., capt., 07 septembre (J.-P. Pereira, J. Présent & al.) ; Le Louroux/Etang, juv., capt., 11 septembre (J.-P. Pereira & al.) ; Saint-Genouph/Bourg, m. ad., 14 septembre (J. Présent) ; Rillé/Lac, mâle, 18 septembre (P. Cabard, J.-M. Thibault) ; Saint-Pierre-des-Corps/Z.I. des Grands Mortiers, mâle, 27 septembre (J. Présent).

Loir-et-Cher - Montrouveau/Etang Communal, mâle ad., 26 mars (E. Brèche).

2006 est marqué par un fort afflux. Comme en 2005, la majorité des données proviennent de Touraine, département marqué par une recherche spécifique de l'espèce aux périodes opportunes (ISSA, 2006).



Fig. 26 : Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*, Lys Saint Georges (36) - 19 mars 2006 (A. Gillens).



Fig. 27 : Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*, Lys Saint Georges (36) - 19 mars 2006 (A. Gillens).



Fig. 28 : Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*, mâle ad., Le Louroux (37) - 12 août 2006 (B. Delahaie).



Fig. 29 : Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*, H1, Le Louroux (37) - 07 septembre 2006 (J. Présent).

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus* (5/5 – 8/11)

La sous-espèce nominale niche en Scandinavie, en Grande-Bretagne et en Irlande et la sous-espèce alpestris dans les montagnes du centre et du sud de l'Europe. Hivernent le long du Bassin Méditerranéen, dans la Péninsule Ibérique et en Afrique du Nord, à l'est jusqu'au Moyen-Orient.

Cher - Avord, 2 mâles ad., 28 octobre (F. Besson, J.-M. Chartendault).

Indre-et-Loire - Saint-Pierre-des-Corps/L'Ouche du Rochin, fem. ad., 05 octobre (L. Le Gal) ; Monnaie/La Gavotte, mâle ad., 13 octobre (J. Présent).

Loiret - Nogent-sur-Vernisson/Lycée des Barres, mâle ad., 06 avril (T. Joubert) ; Nogent-sur-Vernisson/Lycée des Barres, mâle ad., 10 avril (T. Joubert) ; Nogent-sur-Vernisson/Lycée des Barres, 2 mâles, 11 octobre (T. Joubert, S. Siblet & al.) ; Nogent-sur-Vernisson/Les Godeaux, 2 ind., 16 octobre (T. Joubert) ; Nogent-sur-Vernisson/Lycée des Barres, mâle, 20 au 24 octobre (T. Joubert).

Noter la belle série d'observations réalisées à Nogent-sur-Vernisson.

ROUSSEROLLE TURDOÏDE *Acrocephalus arundinaceus* (2/2 – 3/3)

Niche depuis les rives de la Mer Méditerranée (Afrique du Nord et l'Europe méridionale) jusqu'aux Mers du Nord et Baltique, atteint le sud de la Scandinavie, et s'étend à l'est jusqu'à l'énisseï en Russie.

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 29 au 31 mai (P. Cabard, L. Le Gal, R. Baeta) ; Rillé/Lac, 09 au 16 juillet (J. Thurel).

Loir-et-Cher - Villeny/Etang des Thouards, 07 juin (F. Pelsy, F. Vallejjo).

2005 - Cher - Sancoins/Etang de Javoulet, 04 mai (A. Trompat).

Les deux données printanières sont à attribuer vraisemblablement à un phénomène d'overshooting. Aucun indice de nidification n'a été relevé pour ces deux chanteurs. L'observation de juillet concerne la dispersion postnuptiale.

MESANGE BOREALE *Parus montanus* (11/16 – 5/11)

Large distribution s'étendant de la moitié est de la France, comprenant une grande partie de l'Europe Centrale et du Nord, l'Angleterre, la Fennoscandie, à l'est jusqu'à la Sibérie.

Cher - Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, ad., 04 avril (J. Thurel, V. De Wilde).

Indre - Lys Saint Georges/Etang, 2 ad., 18 avril (A. Rougeron).

Loiret - Saint-Brisson-sur-Loire/La Patte d'oie, 29 juillet (J. Thurel) ; Guilly/Ile aux canes, 3 ind., 10 novembre (J. Thurel) ; Guilly/Bel air, 4 ind., 10 novembre (J. Thurel).

2005 - Loiret - Châtillon-sur-Loire, 3 ind., 12 mars (T. Joubert).

Peu de données, mais elles concernent 3 départements dont le Cher et l'Indre où l'espèce est rare.

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* (0/0 – 2/5)

La sous-espèce type se reproduit à travers l'Europe, de la péninsule Ibérique à la Russie. En France, niche en Alsace, Lorraine et Languedoc-Roussillon. Migrateur et hivernant rare ailleurs.

Indre - Lys Saint Georges/Etang, 4 ad. (2 mâles, 2 fem.), 27 mars (A. Rougeron).

Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, mâle ad. bague métal, phot., 14 avril (C. Gayout).

Bonne année avec 5 oiseaux, contactés lors du passage pré-nuptial alors que l'espèce est non annuelle.

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor* (6/6 – 5/5)

Espèce polytypique dont la sous-espèce nominale niche sur un large front du centre de la France, au nord de la Russie, à l'est jusqu'au fleuve Léniassi.

Indre - Pruniers/Brandes des Bouleaux, ad., 13 février (M. Prévost).

Loiret - Sully-La-Chapelle/Forêt Domaniale d'Orléans, ad., 27 novembre au 26 décembre (J. Thurel) ; Ingrannes/La Gaillardière, ad., phot., 06 décembre au 27 mars 2007 (J. Thurel, V. De Wilde, G. Monchaux) ; Vitry-aux-Loges/Morches, ad., phot., 29 décembre (B. Delahaie)

Loir-et-Cher - Courmemin/Les Loges, ad., 04 au 06 décembre (F. Pelsy, A. Callet).

2005 - Indre - Vendœuvres, ad., 12 mars (F. Besson, P. Derrien).

Année comparable à 2005 en terme de localisation, de phénologie et du nombre de donnée. A signaler l'hivernage complet de l'oiseau d'Ingrannes.

MOINEAU SOULCIE *Petronia petronia* (0/0 – 1/1)

La race type niche des îles Canaries à l'Asie Mineure à travers l'Europe et les îles méditerranéennes. En France, se reproduit au sud de la Loire.

Indre-et-Loire - Chinon/Le Grand Ballet, juv., 30 juin (L. Le Gal, J. Présent).

Un couple nicheur avait été découvert en 2004 à quelques kilomètres de Chinon, au hameau du Grand Ballet, dans une ferme abandonnée. Cette donnée laisse présager de son implantation sur le site. Rappelons qu'une petite colonie est installée en Anjou à la frontière avec la Touraine, dans l'Abbaye de Fontevault.

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea* (6/51 – 15/153)

En Europe, niche depuis les zones boréales et de la toundra arctique jusqu'aux zones tempérées. Cabaret se reproduit au sud de la Suède, en Grande-Bretagne, en Suisse et dans les Alpes françaises, flammea niche dans le reste de la Scandinavie et dans le nord de la Russie. Hivernent sur l'ensemble du territoire européen excepté la Péninsule Ibérique.

Eure-et-Loir - Chartres/Gare routière, 43 ind. (1/3 de mâles), 04 mars (J.-Y. Barnagaud) ; Mainvilliers/rue de l'ancien vignoble, fem. ad., sous-espèce *flammea*, 18 mars (G & J.Y. Barnagaud).

Indre-et-Loire - Sonzay/C.E.T., 4 ind., 03 janvier (N. Issa) ; Tours/ Rue d'Anvers, 02 février (J. Présent) ; Tours/Rue de Brabant, 7 ind. , 05 février (J. Présent) ; Pernay/Andrigny, 3 ind. (2 mâles), sous-espèce *cabaret*, 11 février (N. Issa) ; Tours/Avenue Marc Chagall, 2 ind. (mâle, fem.), fem. sous-espèce *flammea*, phot., 09 mars (J. Présent).

Loiret - Châteauneuf-sur-Loire/Loire, 10 ind., 11 janvier (S. Branchereau) ; Saint Jean de la Ruelle/Petite Espère, 7 ind., 25 janvier (S. Branchereau) ; Cercottes/Forêt Domaniale d'Orléans, fem./1^{er} hiver, 11 février (B. & P. Delahaie, S. Branchereau, P. Derland) ; Châteauneuf-sur-Loire/Pont, 4 ind. (2 mâles, 2 fem.), 16 février (P. & B. Delahaie) ; Combreaux/Etang de la Vallée, 51 ind. (46 *flammea*, 5 *cabaret*), phot., 26 février (J. Thurel, V. De Wilde, G. Monchaux) ; Combreaux/Etang de la Vallée, 16 ind., 06 mars (A. Larousse, J. Thurel) ; Chanteau/Forêt Domaniale d'Orléans, mâle ad., sous-espèce *flammea*, 14 mars (J.-Y. Barnagaud).

Loir-et-Cher - Saint-Aignan-sur-Cher/Les Charbonniers, 2 mâles ad., 30 janvier (P. & D. Bouineau).

L'afflux entamé à l'automne 2005 se poursuit durant tout l'hiver et le début du printemps et concerne au moins 153 individus pour 2006. Contrairement à 2005, nombre d'individus concernaient la race *flammea*.



Fig. 30 : Sizerin flammé *Carduelis flammea*, race *flammea*, fem., Combreaux (45) - 26 février 2006 (J. Thurel).



Fig. 31 : Sizerin flammé *Carduelis flammea*, race *flammea*, fem., Combreaux (45) - 26 février 2006 (J. Thurel).



Fig. 32 : Sizerin flammé *Carduelis flammaea*, race *flammaea* à gauche et *cabaret* à droite, Combreux (45) - 26 février 2006 (J. Thurel).

BRUANT FOU *Emberiza cia* (0/0 – 1/4)

La forme nominale se reproduit dans le Maghreb, le sud et le centre de l'Europe, et de l'ouest de la Turquie à la Palestine. Nicheur d'altitude, hiverne en plaine dans la moitié sud de la France.

Cher - Vierzon, 4 mâles ad., phot., 12 janvier (C. Bouilly).

Belle découverte de 4 individus dans un jardin privé à Vierzon. L'espèce est connue pour hiverner occasionnellement dans le sud du département mais jamais autant au nord.



Fig. 33 : Bruant fou *Emberiza cia*, Vierzon (18) - 12 janvier 2006 (C. Bouilly).

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (1/1 – 3/2)

Niche des zones boréales aux zones tempérées, du Bassin Méditerranéen aux milieux steppiques et montagneux jusqu'à 2500 mètres d'altitude dans le sud de l'aire de répartition. Hiverne en Afrique sub-saharienne.

Loiret - Sandillon/La Haute Ile, mâle ad., 01 mai (J.-Y. Barnagaud) ; Nogent sur Vernisson/Le Lycée des Barres, mâle ad., 01 mai (T. Joubert, J. Hatton) ; Baule/embouchure de la Mauve, mâle ad., phot., du 08 juillet (S. Branchereau).

Notez la concomitance des deux dates d'observations printanières. L'oiseau de Baule concerne un mâle chanteur cantonné revenant sur le site pour la seconde année consécutive.




Fig. 34 : Bruant ortolan *Emberiza hortulana*, mâle ad., Sandillon (45) - 01 mai 2006 (J.-Y. Barnagaud).

ANNEXE 1 – LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

2006

Butor étoilé *Botaurus stellaris* - Loiret - Vitry aux Loges, 19 janvier (description insuffisante ne permettant pas d'exclure un Bihoreau gris de 1^{er} hiver).

Macreuse noire *Melanitta nigra* - Indre-et-Loire - Rillé/Lac, mâle, 04 février (absence complète de description).

Merle à plastron *Turdus torquatus* - Indre - Saint Benoit du Sault, 19 mars (description insuffisante ne permettant pas d'exclure un Merle noir partiellement leucique. Aucun élément sur la structure, les ailes, le bec, l'œil ou le cri n'est mentionné).

Sizerin flammé *Carduelis flammula* - Loiret - Amilly/Les Hautes Varennes, 3 mâles ad., phot., 27 mars (photo montrant sans équivoque un mâle adulte de Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*).

2005

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* - Lys Saint Georges/Etang, 08 septembre (description insuffisante ne permettant pas d'exclure un hybride *Fuligule nyroca* x *Fuligule* sp. Aucun élément sur la taille par rapport aux *Fuligule* milouin, la couleur de l'iris, la forme de la tête n'est mentionné).

Faucon kobez *Falco vespertinus* - (Identification par élimination, peu de critères de plumages relevés, conditions d'observation limites et imprécises, ne permettant pas d'apprécier les éléments énoncés).

REMERCIEMENTS

Le CHR Centre tient à remercier chaleureusement ceux qui au cours de l'année 2005, ont contribué à son bon fonctionnement :

- Nature Centre pour le soutien logistique et de communication qu'elle apporte au secrétariat du Comité.
- Les Organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : SEPANT, LPO Brenne, LPO Touraine, LPO 45, SNE, Perche Nature, SAMNEL, Nature 18, Naturalistes Orléanais, Loir-et-Cher Nature, Indre Nature, Eure-et-Loir Nature, CPIE Touraine Val de Loire, APSL.
- Michel Prévost, qui nous a apporté son aide en matière de diffusion et/ou des informations complémentaires.
- l'ensemble des ornithologues, naturalistes, dessinateurs et photographes sans qui le CHR Centre ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2000 - *Inventaire des oiseaux de France métropolitaine*. Nathan, Paris.

ISSA N., 2005 - Occurrence du Goéland pontique *Larus cachinnans* en Touraine. *Le P'tit Grav'*, 3 : 62 - 65.

ISSA N., 2006 - La Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* en Touraine : statut, migration, biotope. *Le P'tit Grav'*, 4. A paraître.

LIGER A., 2006 - Première observation d'une Marouette poussin *Porzana parva* en Indre-et-Loire (Etang du Louroux, commune du Louroux). *Le P'tit Grav'* 4 : 74-75.

PAUL J.-P. & OLIOSO G., 2006 - Afflux mémorable de Jaseurs boréaux *Bombycilla garrulus* en France dans l'hiver 2004-2005. *Ornithos* 13 (1) : 2 - 11.

ZUCCA & le C.M.R., 2007 - Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 3^{ème} rapport du CMR (janv. 2003 - déc. 2004). *Ornithos* 14 (1) : 2-33



Fig. 35 : Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*, Le Louroux (37) - 23 septembre 2006 (J.-Y. Barnagaud).



Fig. 36 : Sizerin flammé *Carduelis flammea*, race *flammea*, mâle adulte, Combroux (45) - 26 février 2006 (J. Thurel).