

La Gorgebleue 2.0

Les articles et notes de
www.faune-vendee.org

Référence : 009-FV2015

LES OISEAUX RARES EN LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE EN 2011

Deuxième rapport du comité d'homologation interdépartemental
de Loire-Atlantique et Vendée

Frédéric LE GALLO, Willy RAITIÈRE et le CH44-85

Citation : LE GALLO F., RAITIÈRE W. et le CH44-85, 2015. Les oiseaux rares en Loire-Atlantique et en Vendée en 2011. *La Gorgebleue 2.0*, 009-FV2015, 16 p., www.faune-vendee.org.

Voici le deuxième rapport des données homologuées en 2011 par le comité interdépartemental de Loire-Atlantique et Vendée. Ce comité, né de la fusion du CHD44 et du CHD85, a pris ses fonctions le 1^{er} janvier 2010 et rassemble des ornithologues de Loire-Atlantique et de Vendée, chargés d'examiner les fiches issues des deux départements.

Trois associations sont partenaires et soutiennent le CH44-85 : les LPO Loire-Atlantique et Vendée ainsi que le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique (GNLA).

En 2011, ce comité était composé des membres suivants : Bertrand Isaac, Willy Maillard, Julien Mérot, Frédéric Le Gallo, Frédéric Portier et Willy Raitière (secrétaires respectivement pour la Vendée et secrétaire pour la Loire-Atlantique). Ils ont examiné 139 fiches, dont 128 ont été validées et 11 rejetées, soit un taux d'acceptation de 92,1 %.

Nous rappelons que seules les données homologuées sont présentées dans les rapports du CH44-85, du CMR et toutes autres publications. Nous invitons les observateurs qui

ne l'auraient pas encore fait à transmettre leurs fiches à l'adresse suivante : ch44_85@yahoo.fr, même si les données sont antérieures à 2011.

FAITS MARQUANTS

L'année 2011 a été placée sous le signe des limicoles rares. En effet, le Bécasseau à longs doigts est mentionné pour la 1^{ère} fois en Loire-Atlantique mais aussi en France. Le Bécasseau à queue pointue fait son apparition dans la liste des espèces observées en Loire-Atlantique et un afflux de limicoles néarctiques est noté dans les deux départements (Bécasseaux tacheté, semipalmé, de Baird et rousset). La sous-espèce orientale *phoenicuroides* du Rougequeue noir est notée pour la première fois en Vendée, ce qui constitue aussi une première française.

Notons aussi 2 observations d'Accenteur alpin en Vendée (premières mentions pour ce département), dans le cadre d'un afflux ayant touché le quart nord-ouest de la France.

Une nouvelle espèce nicheuse est notée en Loire-Atlantique en 2011 : l'Ibis falcinelle.



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
VENDEE

La LPO Vendée fait partie du réseau VisioNature.

Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune.



L'Hypolaïs icterine fournit sa deuxième mention en Loire-Atlantique alors que la Corneille mantelée est notée dans ce même département après plusieurs dizaines d'années d'absence.

La Rousserolle isabelle est observée pour la première fois sur l'île d'Yeu, ce qui constitue la deuxième mention vendéenne.

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre total de données homologuées depuis la création du CH44-85 (soit 0/0 pour cette première année) et celui des individus correspondant, à l'exception de l'année 2011. Les deux suivants représentent, par département et pour l'année 2011, le nombre de données homologuées et le nombre d'individus correspondant.
3. Présentation des données par ordre chronologique d'observation (département, effectif, localité et date). Concernant le(s) nom(s) de (ou des) l'observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique), la mention et al. indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x) en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné au rapport du CH est celui de la personne ayant découvert l'oiseau et rédigé une fiche et/ou fourni une photo.
4. Distribution générale de l'espèce (entre parenthèses) et statut dans les départements, puis commentaire.

La séquence taxonomique est celle de la liste du Comité de l'Avifaune Française (CAF, 2007).

Les données concernant les races sont mentionnées comme "présentant les caractéristiques" de la sous-espèce concernée.

Les données présentées sont la propriété entière de (ou des) l'observateur(s). Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : **Cygne de Bewick** - 1 individu le 26/02/2010, Saint-Joachim, Loire-Atlantique (J.L. Dourin *et al.*, in Portier *et al.* 2015).

* Espèce soumise au CH44-85 hors de certaines zones géographiques.

** Espèce soumise au CH44-85 pour une/des date(s) d'observation exceptionnelle(s).

CYGNE DE BEWICK *Cygnus columbianus*

(1/1) (44 : 2/3 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ad. du 15 au 16/01 à la Louisiane / Dréfféac (Didier Montfort) et 2 ad. du 13 au 27/03 sur le plat de Rozé / Saint-Joachim (Jean-Luc Dourin & Alain Troffigué).

(Se reproduit en Sibérie arctique à l'est de la péninsule de Kola ; hiverne dans les îles Britanniques, du nord de la France au nord-est de l'Allemagne et ponctuellement plus au sud). Données classiques en Loire-Atlantique pour cet hivernant rare dans ce département. Rappelons qu'en Vendée l'espèce est très rare et irrégulière.

CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ad. les 15 et 16/01 à la Louisiane / Dréfféac (Didier Montfort).

(Se reproduit de l'Islande et la Scandinavie jusqu'au nord-est de la Sibérie, également en Mongolie). Cet oiseau était accompagné d'un cygne de Bewick, association inhabituelle de ces deux espèces.



Cygne chanteur *Cygnus cygnus* et
de Bewick *Cygnus columbianus*,

Dréfféac, janvier 2011

Photo © D. Montfort

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis*

(4/6) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ind. le 06/02 sur l'île de Pierre Rouge / Lavau-sur-Loire (François Roche).

(Scandinavie, Sibérie). Migratrice et hivernante rare, surtout en Vendée. À rechercher l'hiver dans le sud de ce département. La description fournie n'a pas permis de déterminer la sous-espèce de cet individu.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce *hrota*, appelée Bernache à ventre pâle.

(5/5) (44 : 3/4 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 ind. le 12/02 à la Pointe de la Pierre / La Plaine-sur-Mer (Steve Gantier & Didier Dehais) ; 1 ad. du 30/10 au 12/11 dans la baie de Pen Bé / Assérac (David Hamon & Anne-Cécile Jouaud) et 2 ind. de 1^{er} hiver du 11 au 27/11 dans le Traict de Rostu / Mesquer et le Petit Traict de Guérande (François & Benoît Duchenne).

Vendée : 1 ad. du 07 au 18/11 sur la vasière du Luzan / Noirmoutier-en-l'Île (Didier Desmots).

2010 Vendée : 1 ad. le 28/11 à la maison de Clémenceau / Saint-Vincent-sur-Jard (Luc Chaillot) ; 1 ind. le 01/01 à la Phelippière/ Saint-Vincent-sur-Jard (Maxime & Michel Pirio *et al.*).

(Canada arctique, Groenland, Spitzberg, Terre François-Joseph). Ce taxon est très régulièrement observé dans les deux départements. La donnée de la Plaine-sur-Mer est inhabituelle, cette espèce étant le plus souvent observée dans le secteur des marais salants de Guérande et du Mès.



Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans*,
Guérande, décembre 2011
Photo © H. Touzé

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce *nigricans*, appelée Bernache du Pacifique.

(3/3) (44 : 3/0 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 mâle probable ad. du 10/11 au 25/12 dans les Traicts du Croisic / Guérande (Arnaud Le Nevé, Antoine Reboul & Willy Maillard).

2009 Vendée : 1 ad. du 12/12 au 29/01/10 au Goulet et à la Phelippière / Saint-Vincent-sur-Jard (Maxime Pirio *et al.*).

(Amérique arctique, Sibérie orientale). Hivernant rare mais très régulier dans les deux départements. L'oiseau des Traicts du Croisic est probablement le mâle qui hiverne chaque année dans le secteur. Par conséquent, il n'a pas été comptabilisé comme un nouvel oiseau.

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris*

(3/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. de 1^{er} hiver du 1 au 19/11 aux Métairies et sur la station de lagunage de Givrand (Luc Chaillot & Gérard Besseau).

2006 Vendée : 1 mâle ad. du 20 au 29/05 sur la carrière de Luzay / Noirmoutier-en-l'Île et non du 20 au 25/05 (Emmanuel Gas, Didier Desmots, Matthieu Vaslin & Luc Chaillot).

(Amérique du Nord. S'égare régulièrement en Europe de l'Ouest, principalement dans les îles Britanniques). Hivernant rare et irrégulier dans les deux départements.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

(5/5) (44 : 2/2 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 mâle le 05/02 au Grand Pâtis / Saint-Mars-du-Désert (Françoise Le Gal) et 1 mâle ad. le 19/03 à la Ville / Haute-Goulaine (Laurent Bauza & Patrice Ouvrard).

(Niche des Balkans et de l'Europe centrale jusqu'à l'Asie centrale, occasionnellement plus à l'ouest). Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée ; sans doute plus régulier en Loire-Atlantique, notamment sur le lac de Grand-Lieu.

ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* *

(12/42) (44 : 4/6 ; 85 : 3/6)

Loire-Atlantique : en dehors du lac de Grand-Lieu, 1 mâle le 09/03 aux Brosses / Haute-Goulaine (Jacques Lemoire) ; 1 mâle et 2 de type fem. le 12/08 à la station de lagunage du Salineau / Les Moutiers-en-Retz (Willy Maillard) puis 1 mâle du 14/09 au 12/10 sur ce même site

(Laurence Gourdel *et al.*).

Vendée : 2 ind. de type fem. le 19/08 à la Braconnière / La Barre-de-Monts (Perrine Dulac) ; 3 ind. du 05 au 13/11 sur la station de lagunage de la Salaisière / Noirmoutier-en-l'Île (Dominique Robard *et al.*) puis 1 mâle ad. le 22/11 sur ce même site (Frédéric Portier).

2006 Loire-Atlantique : 1 fem. ad. le 15/04 sur la station de lagunage du Salineau / Les Moutiers-en-Retz (Jean-Luc Ferrière).

2007 Loire-Atlantique : 1 ind. de type fem. le 11/11 sur la station de lagunage du Salineau / Les Moutiers-en-Retz (Willy Maillard).

(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne depuis 1960). Espèce notée de la fin d'été à l'hiver dans les deux départements, sur les plans d'eau et lagunes de l'intérieur des terres. Plus rare sur le littoral. L'année 2011 est plus classique en ce qui concerne le nombre d'oiseaux observés.

Note du comité : la qualité des fiches reçues étant régulièrement insuffisante pour exclure l'Érismature à tête blanche *Oxyura leucocephala*, le CH44-85 diffusera prochainement un document d'aide à l'identification, à destination des observateurs.



Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*,
Les Moutiers-en-Retz, septembre 2011
Photo © F. Halligon

GRÈBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

(7/9) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 ad. du 28/04 au 03/05 au lac de Grand-Lieu (Sébastien Reeber).

Vendée : 1 ind. le 07/03 pointe de Gilberge / L'Île-d'Yeu (Xavier, Marie-Paule & Alix Hindermeier).

(Dans le Paléarctique occidental, la population reproductrice s'étend de la Russie à l'Allemagne à l'Ouest

et à la Turquie au Sud. Hivernent principalement le long des côtes du nord de l'Europe, de la mer Noire et de l'Adriatique). Migrateur et hivernant rare et irrégulier dans les deux départements. Les données de 2011 concernent des sites et des dates classiques.

PUFFIN MAJEUR *Puffinus gravis*

(1/1) (44 : 2/2 ; 85 : 3/7)

Loire-Atlantique : 1 ind. le 14/07 depuis la pointe du Croisic / Le Croisic (Gabriel Couroussé *et al.*) et 1 ind. le 15/09 depuis le même site d'observation (Gabriel Couroussé *et al.*).

Vendée : 4 ind. le 23/08 depuis le Phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne (Frédéric Le Gallo) ; 2 ind. le 26/08 depuis la pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu (Xavier & Marie-Paule Hindermeier) et 1 cadavre le 08/09 au Goulet / Saint-Vincent-sur-Jard (Jean-Do Vrignault & Luc Chaillot).

(Niche dans quelques îles de l'Atlantique Sud : Inaccessible, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough). Migrateur très rare et très irrégulier, observé le plus souvent au large de nos côtes. Cette espèce croise régulièrement au large des côtes vendéennes, notamment au niveau de l'île d'Yeu ou du phare de l'Armandèche. Les données de Loire-Atlantique sont plus inhabituelles : elles sont issues d'observations régulières réalisées en 2011 depuis la pointe du Croisic dans le cadre du programme FAME (Futur de l'Environnement Marin Atlantique). Un afflux particulier a été noté en 2011.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* *

(14/21) (44 : 4/9 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 4 ad. du 28/03 au 07/06 donnant 3 jeunes à l'envol sur le lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Sébastien Reeber & André Robert) ; 1 ad. le 14/09 à la Prée des Barons / Saint-Mars-de-Coutais (André Robert) et 1 ind. le 22/11 sur le lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Sébastien Reeber).

(Se reproduit, en Europe, essentiellement dans l'Est et le Sud du continent. La plupart des oiseaux européens hivernent en Afrique tropicale ou à l'est de la Méditerranée. En France, l'espèce niche depuis 2006 en Camargue). L'espèce devient de plus en plus régulière en Loire-Atlantique notamment, où elle s'est reproduite sur le lac de Grand-Lieu en 2011 (Reeber, 2011). Demeure rare et irrégulière en Vendée.

Note du comité : la qualité des fiches reçues étant régulièrement insuffisante pour exclure les autres espèces d'ibis de type falcinelle Ibis de la Puna *Plegadis ridgwayi* et Ibis à face blanche *Plegadis chihi*, pouvant être échappées de captivité, le CH44-85 rappelle qu'un document reprenant les critères d'identification a été diffusé à destination des observateurs. Il est disponible ici :

http://files.biolovision.net/www.faune-vendee.org/pdf/files/news/ID_ibis_falcinelle-2667.pdf

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus*

(2/5) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. le 13/11 au Brethomé / Brétignolles-sur-Mer (Ronan Arhuro).

2006 Vendée : 1 imm. le 14/06 au Boupère (Luc Chaillot, Stéphane & Johan Rapin).

(Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Ouest de l'Asie). Migrateur très rare, mais de plus en plus régulier ces dernières années en juin dans nos départements. La donnée de novembre 2011 est quant à elle encore plus inhabituelle.



Vautour fauve *Gyps fulvus* et Buse variable *Buteo buteo*,
Brétignolles-sur-Mer, novembre 2011

Photo © R. Arhuro

AIGLE BOTTÉ *Aquila pennata*

(5/6) (44 : 0/0 ; 85 : 4/4)

Vendée : 1 ind. du 17 au 24/04 puis 1 couple du 29/05 au 10/09 dans le bocage vendéen (localité tenue secrète ; Michel Bibard) ; 1 ad. le 29/08 aux Violettes / L'Île-d'Yeu (Arnaud Sournia) et 1 ind. le 31/08 dans le bourg de Noirmoutier-en-l'Île (Dominique Robard).

2010 Vendée : 1 ind. le 28/08 à la Taillée / Saint-Hilaire-des-Loges (Gérard Besseau).

(Europe, Afrique du Nord, Asie centrale). Migrateur rare dans les deux départements mais nettement plus régulier en Vendée. La nidification n'y a toujours pas été prouvée mais elle semble probable compte tenu de la régularité des observations dans certains secteurs en période de reproduction.

FAUCON D'ÉLÉONORE *Falco eleonora*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 ad. le 27/04 au-dessus de la dune de la Fosse / Barbâtre (Jean-Charles Delattre) et 1 ind. de 2^e année le 03/07 au phare des Corbeaux / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier).

(Se reproduit essentiellement de la Hongrie jusqu'au fleuve Léna en Russie. Hiverné en Afrique australe). Migrateur occasionnel très rare dans les deux départements, plus régulier en Vendée. L'augmentation du nombre de données est à confirmer, notamment pour la Vendée.

OUTARDE CANEPETIÈRE *Tetrax tetrax*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. le 17/04 sur la dune de la Gachère / Brétignolles-sur-Mer (Frédéric Portier).

(Se reproduit du Maroc et de l'Europe de l'Ouest à travers l'Asie centrale jusqu'au nord-ouest de la Chine). Espèce anciennement nicheuse en Vendée, disparue de Loire-Atlantique. Cette donnée concerne un individu en halte migratoire.

GLARÉOLE À COLLIER *Glareola pratincola*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ad. le 17/04 dans le marais de la Guittière / Talmont-Saint-Hilaire (Maxime Piriou).

(Niche sporadiquement du sud de l'Europe et du Maghreb jusqu'au Kazakhstan, Iran et Pakistan, ainsi qu'à travers l'Afrique, au sud du Sahara). Migrateur rare et irrégulier dans les deux départements lors des deux passages. À rechercher au printemps dans les zones humides.

BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos*

(9/9) (44 : 6/9 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 juv. du 31/08 au 02/09 sur la saline Donne / Guérande (Dominique Tavenon & Philippe Archambeau) ; 2 juv. le 05/09 sur la vasière à Montloup au lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Sébastien Reeber) ; 2 juv. le 26/09 sur la vasière à Montloup au lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Sébastien Reeber) ; 1 juv. du 26 au 30/09 sur la vasière à Montloup au lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Sébastien Reeber) ; 1 juv. le 04/10 au nord de Ruby au lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Sébastien Reeber) et 2 ind. le 29/10 à la Gautière / Bourgneuf-en-Retz (Raymond Clavier).

Vendée : 1 juv. les 01 et 02/10 sur le lac de Maché-Apremont / Maché (Frédéric Portier).

(Niche dans l'Arctique nord-américain, de l'Ouest de la baie d'Hudson à l'Alaska et en Sibérie, à l'Ouest jusqu'à la péninsule de Yamal. Hiverné en Amérique du Sud, dans le sud-est de l'Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande). Rare et irrégulier lors des deux passages, particulièrement au printemps ; plus régulier en automne. Avec 9 oiseaux en Loire-Atlantique et 1 en Vendée, 2011 est de nouveau une bonne année pour l'espèce. Le lac de Grand-Lieu et celui de Maché-Apremont sont des sites classiques pour voir ce bécasseau néarctique en août et septembre.



*Bécasseau tacheté Calidris melanotos,
Lac de Maché - Apremont, septembre 2011*

Photo © F. Portier

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 juv. du 29/07 au 01/08 dans le marais de la Guittière / Talmont-Saint-Hilaire (Luc Chaillot).

(Se reproduit dans le centre de l'Eurasie, de l'est de la Biélorussie à l'est du lac Baïkal). Migrateur rare dans les

deux départements mais plus régulier en Vendée, notamment en fin d'été.

PHALAROPE À BEC ÉTROIT *Phalaropus lobatus*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 juv. le 18/09 plage des Bossilles / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeyer).

2007 Loire-Atlantique : 1 fem. ad. le 26/05 à Sissable / Guérande (David Grandière).

(Se reproduit tout autour du Grand Nord, y compris en Islande et dans le nord de l'Europe, surtout au-delà de 60°N, au sud jusqu'en Écosse). Espèce rare dans les deux départements. Observé principalement en fin d'été. A noter la première donnée confirmée pour l'île d'Yeu.

PHALAROPE À BEC LARGE *Phalaropus fulicarius*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)

2008 Loire-Atlantique : 1 ind. le 10/09 sur la station de lagunage du Salineau / Les Moutiers-en-Retz (Julien Mérot & Willy Maillard).

Cette espèce n'est plus soumise à homologation depuis le 1^{er} janvier 2010.

LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 juv. les 11 et 12/10 sur le lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Sébastien Reeber & Willy Maillard).

(La sous-espèce nominale se reproduit de la Scandinavie et Russie arctiques et subarctiques jusqu'au delta de la Léna, en Sibérie). Espèce très rare dans les deux départements. Cette donnée constitue la deuxième observation de l'espèce sur le lac de Grand-Lieu après la capture d'un oiseau en 1954.



*Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus,
1^{re} année, lac de Grand-Lieu, octobre 2011*

Photo © S. Reeber

GOÉLAND RAILLEUR *Chroicocephalus genei*

(1/1) (44 : 0/0 ; 85 : 2/0)

Vendée : 1 mâle ad. sur divers sites de l'île de Noirmoutier tout au long de l'année (Dominique Robard, Didier Desmots *et al.*).

2010 Vendée : 1 mâle ad. sur divers sites de l'île de Noirmoutier tout au long de l'année (Dominique Robard *et al.*).

(Se reproduit du Sénégal à la mer Méditerranée et jusqu'au Moyen-Orient, Kazakhstan et Pakistan). Il s'agit toujours du même individu, découvert en 2003, et qui ne quitte désormais plus l'île de Noirmoutier.

GOÉLAND À BEC CERCLÉ *Larus delawarensis*

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 5/5)

Vendée : 1 ad. le 26/02 sur la station de lagunage de Jard-sur-Mer (Frédéric Portier) ; 1 ad. du 12 au 27/03 sur la station de lagunage de Bourgenay / Talmont-Saint-Hilaire (Jean-Claude Croisé & Luc Chaillot) ; 1 ad. du 22 au 27/03 sur la station de lagunage de la Salaisière puis le 28/03 sur le marais Doridon / Noirmoutier-en-l'Île (Patrick & Marie-Claude Derrien et Dominique Robard) ; 1 ad. du 17/07 au 11/08 sur le polder de Sébastopol / Barbâtre (Dominique Robard & Jean-Charles Delattre) ; 1 ad. du 22/11 au 06/03/12 sur la RNN des Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île (Didier Desmots & Jean-Max Porteau).

(Niche dans le centre, le sud-ouest et l'est de l'Amérique du Nord. Hivernant et migrateur néarctique rare fréquentant surtout les zones côtières. Très occasionnel dans les terres). Hivernant et migrateur rare et irrégulier



Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, adulte,
Barbâtre, juillet 2011
Photo © D. Robard

dans les deux départements. Certains secteurs vendéens comme l'île de Noirmoutier accueillent tout de même l'espèce annuellement. Les sites d'observation en 2011 sont classiques.

GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans*

(2/2) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ind. de 1^{re} année le 01/11 à Port-Val / Le Croisic (Willy Raitière).

(Niche de la mer Noire jusqu'au Kazakhstan. S'est installé récemment près de Moscou ainsi qu'en Pologne et en Allemagne. Hivérne dans le golfe Persique, en mer Rouge et en effectif moindre dans le centre, le nord et l'ouest de l'Europe). Très rare dans les deux départements, bien que probablement sous-défecté. A rechercher en automne et en hiver dans les bandes de laridés sur le littoral ou dans les décharges.

Note du comité : les connaissances croissantes sur l'identification de cette espèce laissent espérer des observations plus nombreuses dans le futur. Attention cependant, certains plumages sont assez difficiles à identifier et la présence d'oiseaux hybrides n'est pas à sous-estimer, même si les oiseaux sont bagués. Aussi, des photos sont nécessaires pour aider à l'homologation de cette espèce délicate.

GOÉLAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*

(3/3) (44 : 2/2 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 ind. de 2^e année le 24/01 au centre d'enfouissement technique de la Coutume / Mésanger (Yann Brilland) ; 1 ind. de 1^{re} année le 16/12 au Closio / Piriac-sur-Mer (Gérard Bertiau).



Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*, 1^{re} année,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, décembre 2011
Photo © J. Pelloquin

Vendée : 1 ind. de 1^{re} année du 26/12 au 01/01/12 dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Gérard Besseau, James Pelloquin & Nathalie Barré).

2007 Loire-Atlantique : 1 ind. de 2^e année du 18 au 28/03 dans le marais de Grée / Saint-Herblon (Willy Maillard, Yves Trévoux et Fabien Branger).

(Niche au Groenland et en Islande puis de l'île Jan Mayern et du Spitzberg jusqu'en Sibérie. Hiverné surtout dans le nord de l'Atlantique jusqu'en Grande-Bretagne ; effectifs réduits plus au sud, présence occasionnelle en Suisse, en mer Caspienne et en Méditerranée). Hivernant rare et irrégulier en Loire-Atlantique, assez régulier en Vendée. Le suivi plus assidu des centres d'enfouissement de Loire-Atlantique laisse espérer des observations plus fréquentes de goélands néarctiques. La donnée vendéenne est classique.

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica*

(1/2) (44 : 2/2 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 ad. le 29/08 en Grande Brière / Saint-Joachim (Alain & Jacques Troffigué) et 1 ad. le 03/09 sur la vasière de Méan / Saint-Nazaire (Didier Montfort).

Vendée : 1 ad. le 25/07 sur le polder de Saint-Cérans / Bouin (Hugo Touzé & Jean-Yves Frémont).

(Du sud de l'Europe au Kazakhstan, au sous-continent indien et au nord-est de la Chine, également en petit nombre en Allemagne et au Danemark). Migratrice rare et irrégulière dans les deux départements. Avec 3 oiseaux différents dans les deux départements, 2011 est une bonne année pour cette espèce.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii*

(3/5) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ad. le 22/08 à la pointe Saint-Gildas / Préfailles (Hugo Touzé).

2010 Loire-Atlantique : 1 ad. le 04/09 sur l'étier de Lavau / Lavau-sur-Loire (Willy Maillard).

(Des côtes est de l'Amérique du Nord et des Antilles au nord du Venezuela, aux Açores et dans le nord-ouest de l'Europe). Migrateur occasionnel dans les deux départements. La pointe de Saint-Gildas à Préfailles semble être le meilleur site pour contacter l'espèce en Loire-Atlantique. La donnée de Lavau-sur-Loire est plus inhabituelle pour cette espèce plutôt observée sur le littoral.



Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus, adulte, lac de Grand-Lieu, juin 2011

Photo © S. Reeber

GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias leucopterus*

(12/24) (44 : 9/9 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : toutes les données proviennent du lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Sébastien Reeber) : 1 ind. du 20 au 27/04 ; 1 ad. du 16 au 24/05 puis 1 couple sur son nid avec 3 œufs du 24/05 au 28/07 (nichée détruite par le vent le 04/07) ; 1 juv. du 20 au 23/08 ; 1 juv. du 23 au 25/08 (en compagnie du précédent le 23/08) ; 2 juv. du 12 au 14/09 ; 1 juv. les 21 et 22/09 ; 1 juv. le 7/10.

Vendée : 1 ad. le 29/05 sur la station de lagunage de Notre-Dame-de-Riez (Gérard Besseau).

(Niche de l'Europe de l'Est à la Sibérie orientale (région de l'Amour). Hiverné principalement en Afrique tropicale). En Loire-Atlantique, l'espèce a de nouveau tenté de se reproduire, après sa première reproduction réussie en Brière en 2009 (Dourin *et al.* 2008). En revanche l'espèce reste rare et irrégulière en Vendée lors des deux passages.

MERGULE NAIN *Alle alle*

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 du 09/01 au 23/04 devant diverses plages de l'île d'Yeu : pointe de Gilberge, plage des Sapins, plage de Ker Châlon, plage de la Tourette (Frédéric Portier, Xavier & Marie-Paule Hindermeyer).

2004 Vendée : 1 le 14/11 devant la plage du Pont Jaunay / Brétignolles-sur-Mer (Gérard, Lysiane, Julie et Rémi Besseau).

(Niche depuis le Haut Arctique canadien et le nord du

Groenland jusqu'au Spitzberg et à la Nouvelle-Zemble). Occasionnel en hiver dans les deux départements. La durée de stationnement de l'oiseau de l'île d'Yeu est remarquable.

MACAREUX MOINE *Fratercula arctica*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)

2008 Vendée : 1 cadavre le 23/01 sur la plage au niveau du Havre du Payré / Talmont-Saint-Hilaire (Luc Chaillot).

(La sous-espèce nominale niche en Grande-Bretagne, Irlande, îles Féroé, sud de la Norvège, îles Anglo-Normandes et Bretagne). Malheureusement, la plupart des données de ce petit alcidé concerne des individus retrouvés morts sur les plages.

COUCOU GEAI *Clamator glandarius*

(5/5) (44 : 2/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 ad. du 09/01 au 23/04 du 26/03 au 03/04 dans le secteur de Drézeux / Guérande (Catherine Gentric, Pascal Coignard, Philippe Della Valle).

Vendée : 1 ad. du 09/01 au 23/04 le 17/04 aux Roussières / Brem-sur-Mer (Frédéric Portier).

2009 Loire-Atlantique : 1 ind. le 14/04 au-dessus du canal de Rozé / Saint-Joachim (Antoine Lanrivain).

(Europe méridionale, Moyen-Orient, Afrique du Nord). Migrateur rare mais de plus en plus régulier au printemps. Observation de l'espèce de plus en plus fréquente en Vendée, y a niché avec succès en 2009.

PETIT-DUC SCOPS *Otus scops* *

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 chanteur le 30/04 dans le bourg de Thiré (Bruno Buggia) et 1 chanteur du 10 au 12/05 à La Sénardière / Boufféré (Sébastien Batard).

2008 Loire-Atlantique : 1 mâle ad. chanteur du 21/05 au 14/06 dans le bourg de Frossay (Franck Latraube).

2005 Vendée : 1 mâle ad. chanteur le 21/04 au Moulin de Xanton / Xanton-Chassenon (Etienne Ouvrard).

(La sous-espèce nominale se reproduit de la France à la Volga, au nord des Pyrénées, de la Grèce et de la Turquie). Hormis la population noirmoutrine, aucune population établie n'est connue dans les deux départements. Les données concernent le plus souvent des chanteurs isolés, probablement de passage. La

donnée de Frossay concerne un oiseau de retour sur ce site pour la troisième année consécutive.

MARTINET À VENTRE BLANC *Apus melba*

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1/2)

Vendée : 2 ind. le 19 et 1 le 30/07 à la Cité des Oiseaux / Les Landes-Génusson (Amandine Diot & Florent Fressard).

(Sud de l'Europe, Asie mineure et Afrique du nord). Migrateur rare dans les deux départements. L'observation de 2 individus ensemble est exceptionnelle.

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla* **

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ind. le 12/11 au chemin du Pré Joys / Les Moutiers-en-Retz (Didier Cléva).

(Europe, Scandinavie, Sibérie, Mongolie, Chine, Japon et nord de l'Algérie et de la Tunisie). Cette donnée est très tardive, la majorité des oiseaux observés en migration postnuptiale étant notés entre fin-août et fin-septembre.

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla* *

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : espèce non soumise à homologation)

Loire-Atlantique : 1 ind. le 27/08 sur la dune de Pen Bron / La Turballe (Hugo Touzé).

(Europe centrale et du sud, Asie centrale et Maghreb). Espèce très rare en migration en Loire-Atlantique, plus régulière en Vendée qui accueille encore une petite population nicheuse dans le sud du département.



Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla*,

La Turballe, août 2011

Photo © H. Touzé

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi*

(1/6) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ad. le 25/03 à la station de lagunage de Notre-Dame-de-Riez (Gérard Besseau).

(La sous-espèce type niche de la Sibérie occidentale à la

Mongolie et hiverne principalement au Pakistan, en Inde, Chine et Asie du Sud-Est, mais aussi assez régulièrement très à l'ouest de ses quartiers habituels (Espagne, Afrique du Nord...). Migrateur et hivernant rare et irrégulier dans les deux départements. 1 seul individu contacté en 2011, voilà qui contraste avec l'hivernage complet observé en 2010 en Vendée.

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris* *

(2/3) (44 : 3/9 ; 85 : espèce non soumise à homologation)

Loire-Atlantique : 1 ind. le 21/04 sur le remblai de Donges-Est / Donges (Anthony Oates & Eugene Archer) ; 2 ad. dont un chanteur du 17 au 20/05 à la Grande Falaise / La Turballe (Catherine et Alain Gentric) ; 6 ind. dont 3 juv. le 17 et 18/09 à la Tour aux Moutons / Donges (Eugene Archer).

(De l'Europe de l'Ouest à l'Iran, la Sibérie et le nord-ouest du Kazakhstan). Encore des données recueillies sur le site désormais classique de la dune de Pen Bron à La Turballe. Le remblai sableux de Donges-Est est un site à surveiller car il est très favorable en période de reproduction.

À compter du 1^{er} janvier 2012, l'espèce n'est plus soumise à homologation en Loire-Atlantique.



Pipit rousseline Anthus campestris,
Donges, septembre 2011
Photo © E. Archer

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava*

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce *thunbergi*, appelée Bergeronnette printanière nordique.

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 mâle du 05 au 15/10 sur le lac de Maché-Apremont / Maché (Frédéric Portier,

Gérard Besseau & Bertrand Isaac).

(De la Norvège au nord de la Sibérie). Migrateur rare et irrégulier dans les deux départements. Enfin une donnée confirmée de ce taxon pour le département de la Vendée.

JASEUR BORÉAL *Bombycilla garrulus*

(1/1) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. le 05/01 rue de la Tonnelle à Olonne-sur-Mer (André Barzic).

(La sous-espèce type niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Lors de migrations partielles ou d'invasions, l'espèce atteint le sud de la Scandinavie, le Benelux ou l'ensemble de l'Europe centrale). Migrateur et hivernant très rare dans les deux départements. Les observations de Jaseur boréal dépendent de phénomènes invasifs réguliers cependant, l'ouest de la France est rarement concerné par ce type d'évènement.

ACCENTEUR ALPIN *Prunella collaris*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 ind. le 27/10 à l'abbaye de Maillezais (Martine Hergibo) et 1 ind. le 29/10 à la Dive / Saint-Michel-en-l'Herm (Christian Pacteau & Michel Terrasse).

2007 Loire-Atlantique : 1 ind. le 06/04 à la pointe du Castelli / Piriac-sur-Mer (Jean-Paul Tilly).

(La sous-espèce type niche des montagnes de l'Afrique du Nord aux Carpates et à l'Italie, en passant par l'Espagne et la France). Un afflux particulier a été noté en 2011 alors que cette espèce est habituellement cantonnée aux régions montagneuses (Issa & Rebeyrat, 2012). Il s'agit des deux premières mentions vendéennes homologuées.



Accenteur alpin Prunella collaris,
Maillezais, octobre 2011
Photo © M. Hergibo

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 mâle de 2^e année de la sous-espèce *hispanica* le 25/04 sur la dune de la Parée Préneau / Saint-Hilaire-de-Riez (Denis Matthey) ; 1 mâle ad. le 31/08 sur la station de lagunage / La Tranche-sur-Mer (Frédéric Portier).

(Europe méditerranéenne, Maghreb, Israël, Iran). Migrateur très rare dans les deux départements. L'année 2011 apporte les deuxième et troisième mentions de cette espèce pour le département de la Vendée, ce qui est exceptionnel.

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*

(3/3) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Rappel : espèce soumise à homologation uniquement en dehors des opérations de baguage.

Loire-Atlantique : 1 ind. de 1^{re} année le 13/08 sur le remblai de Donges-Est / Donges (Clément Giacomo & Etienne Giraudot).

Vendée : 1 ind. de 1^{re} année le 28/08 sur la dune de la Grande Conche / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeier).

(Niche dans les États Baltes, en Biélorussie et en Russie, ainsi qu'en Pologne, en Hongrie et en Allemagne. Hiverner en Afrique de l'Ouest, au moins dans le delta du Sénégal). Seules les données d'oiseaux non capturés sont traitées dans ce rapport. Les opérations de baguage menées dans les deux départements montrent que l'espèce est de passage très fréquent durant le mois d'août dans les principales zones humides. En 2011, le nombre de captures est exceptionnellement élevé avec 464 individus capturés en Loire-Atlantique et 84 en Vendée sur les différents camps de baguage (Le Nevé com. pers.). À noter la première mention de l'espèce pour l'île d'Yeu.

HYPOLAÏS ICTÉRINE *Hippolais icterina*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 ad. le 28/08 sur la dune de la Grande Conche / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeier) ; 1 ind. de 1^{re} année le 02/09 dans le vallon des Broches / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier).

2009 Loire-Atlantique : 1 ind de 1^{re} année capturé et bagué le 27/08 sur la réserve du Massereau / Frossay (Franck Latraube, Guillaume Cochard & Benoit Fontaine).



Hypolaïs icterine Hippolais icterina,
Frossay, août 2009
Photo © G. Cochard

(Nord-Ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et l'est de l'Oural). Très rare dans les deux départements. La donnée de Loire-Atlantique constitue la deuxième mention de l'espèce pour ce département, après la capture d'un individu en août 1982 dans l'estuaire de la Loire (Recorbet, 1992). À noter les deuxième et troisième mentions de cette espèce pour l'île d'Yeu.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus*

(5/5) (44 : 3/3 ; 85 : 11/11)

Loire-Atlantique : 1 ind. du 25 au 29/10 à Lyarne / Les Moutiers-en-Retz (Olivier Penard & Hugo Touzé) ; 1 ind. probablement de 1^{re} année le 31/10 au lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Sébastien Reeber) ; 1 ind. le 31/12 à Port Launay / Couëron (Denis Turmel).

Vendée : 1 ind. le 02/10 à la Cheinaie / Givrand (Gérard Besseau) ; 1 ind. le 08/10 à la Mine / Talmont-Saint-Hilaire (Luc Chaillot & Johan Gardon) ; 1 ind. le 14/10 sur la RNN des marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île (Didier Desmots) ; 1 ind. le 16/10 au marais de la Guerche / L'Île-d'Yeu (Valérie Auriaux & Xavier Hindermeier) ; 1 ind. le 16/10 à la Citadelle / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeier) ; 1 ind. le

17/10 à Ker Pierre Borny / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeyer & le Groupe Ouigre) ; 1 ind. le 18/10 à Ker Châlon (jardin) / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeyer) ; 1 ind. du 18 au 22/10 dans la saulaie de Ker Châlon / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeyer & le Groupe Ouigre) ; 1 ind. le 19/10 à la station de lagunage / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeyer & le Groupe Ouigre) ; 1 ind. le 26/10 dans la saulaie de Ker Châlon / L'Île-d'Yeu (Xavier & Marie-Paule Hindermeyer) ; 1 ind. le 10/11 sur la RNN des marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île (Didier Desmots).

2010 Vendée : 1 ind. le 09/10 à la station de lagunage de Givrand (Gérard Besseau).

2008 Loire-Atlantique : 1 ind. le 28/09 au Mont Lénigo / Le Croisic (Olivier Vannucci, Marek Banasiak & Emeline Langlet †).

(Niche dans le nord de la Russie, de la Petchora et de l'Oural à l'ouest, jusqu'à l'Anadyr et la mer d'Orkhotsk à l'est et au sud jusqu'à la Mongolie et au nord-est de la Chine. Hiverné dans le sud-est de l'Asie). Espèce emblématique rare mais régulière chaque automne en Vendée, curieusement plus exceptionnelle en Loire-Atlantique (manque de prospection ?). L'année 2011 est une très bonne année pour cette espèce. Comme souvent, le département de la Vendée rassemble la majorité des données mais notons tout de même cette observation inhabituelle d'un oiseau à Couëron (44) le 31/12.

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*

(4/5) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 mâle le 15/04 à la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer (Mickaël Faucher).

(Nord-ouest de l'Afrique, nord et centre de l'Europe). Migrateur rare au printemps. Les données concernent principalement des oiseaux en migration pré-nuptiale.

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*

Individus présentant les caractéristiques du groupe *abietinus* / *fluvescens* / *tristis*, appelé Pouillot véloce de type sibérien

(1/1) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ind. du 09 au 12/02 dans les marais salants du Mès / Mesquer (Denis Chavigny).

(Scandinavie, Sibérie). Migrateur et hivernant rare bien que régulier dans les deux départements.

À compter du 1^{er} janvier 2012, les oiseaux de ce

type ne sont plus pris en compte par le comité. En effet, le plus souvent, les connaissances liées à ces taxons ne permettent pas de trancher en faveur de l'un ou l'autre.

TICHODROME ÉCHELETTE *Tichodroma muraria*

(0/0) (44 : 2/2 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ind. le 18/11 sur le château de Pornic (Isabelle Levy) et 1 ind. du 19 au 21/11 sur la cathédrale Saint-Pierre de Nantes (Olivier Poisson, Marie-Paule Hindermeyer & Eugène Archer).

2009 Loire-Atlantique : 1 mâle du 29/12 au 31/03/10 sur l'église de Pornic (Mathieu Denis *et al.*).

(La sous-espèce nominale se reproduit dans les montagnes du sud de l'Europe, du nord de l'Espagne à la Bulgarie, ainsi que dans le nord et l'ouest de l'Iran). L'espèce semble plus rare en Vendée qu'en Loire-Atlantique. Notons que Pornic accueille l'espèce pour la deuxième fois après le séjour d'un oiseau durant l'hiver 2009-2010.

PIE-GRIÈCHE GRISE *Lanius excubitor*

(1/1) (44 : 1/1 ; 85 : 2/2)

Loire-Atlantique : 1 ind. du 07 au 17/01 dans le secteur de l'étier de la Musse / Couëron (Willy Raitière & Julien Mérot).

Vendée : 1 ind. le 15/10 sur la dune de la Grande Conche / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeyer, Jean-Claude Croisé, Maxime Pirio & Aurélien Pineau) ; 1 ind. du 02 au 29/12 aux Ringerdières / Rosnay (Luc Chaillot & Gérard Besseau).

(Europe de l'ouest à l'ouest de la Sibérie). Migrateur rare et hivernant occasionnel dans les deux départements. À noter la première mention de l'espèce pour l'île d'Yeu.

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE *Lanius senator*

(7/8) (44 : 1/1 ; 85 : 7/8)

Loire-Atlantique : 1 ind. de 1^{re} année de la sous-espèce nominale du 17 au 27/08 à Lancastria / Les Moutiers-en-Retz (Hugo Touzé *et al.*).

Vendée : 1 fem. ad. de la sous-espèce nominale le 13/04 entre la Croix et les Tchinettes / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier) ; 1 mâle ad. aux Petits Fradets / L'Île-d'Yeu (Clément Braud) ; 1 mâle et



Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator senator*,
Île d'Yeu, avril 2011
Photo © F. Portier

1 fem. ad. de la sous-espèce nominale le 15 et 16/05 à Perdrette / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeyer & Sandrine Desmarest) ; 1 ind. de 1^{re} année les 14 et 15/08 à la Bosse / Barbâtre (Dominique Robard & Emmanuel Gas) ; 1 ind. de 1^{re} année du 16 au 20/08 à la Gatelière / L'Aiguillon-sur-Vie (Gérard Besseau & Clément Caiveau) ; 1 ind. de 1^{re} année le 30/08 dans le marais du Jaunay / Givrand (Gérard Besseau) ; 1 ind. de 1^{re} année le 03/09 à la Casie / Barbâtre (Dominique Robard).

2002 Loire-Atlantique : 1 ad. de la sous-espèce *badius* le 05/05 à la pointe Saint-Gildas / Préfaïlles (Willy Maillard & Benjamin Mème-Lafond).

2005 Vendée : 1 ind. de 1^{re} année de la sous-espèce nominale le 19/08 aux Doités / L'Aiguillon-sur-Vie (Gérard Besseau).

2008 Vendée : 1 ad. de la sous-espèce nominale le 02/05 sur la dune du Jaunay / Brétignolles-sur-Mer (Gérard Besseau).

2009 Vendée : 1 ind. de 1^{re} année de la sous-espèce nominale le 02/10 dans le marais du Jaunay / Givrand (Gérard Besseau).

(Europe de l'Ouest et îles de la Méditerranée). Migrateur rare lors des deux passages, mais régulier en Vendée. Les îles d'Yeu et de Noirmoutier demeurent les sites vendéens les plus intéressants pour contacter cette espèce. L'observation d'un individu de la sous-espèce *badius* en 2004 en Loire-Atlantique constitue la première mention circonstanciée de ce taxon dans ce département.

CORNEILLE MANTELÉE *Corvus cornix*
(0/0) (44 : 2/2 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ind. le 30/10 dans le bourg



Corneille mantelée *Corvus cornix*,
Pornic, octobre 2011
Photo © F. Marais

de Pornic (Françoise Marais) et 1 ind. le 30/10 à la Cherpraie / Couffé (Vincent Tanqueray).

(Europe du nord et centrale jusqu'au Kazakstan et au sud jusqu'en Sardaigne, Turquie, Irak, Iran et Egypte). Migrateur très rare dans les deux départements. Cette arrivée simultanée de deux oiseaux en deux points assez distants de la Loire-Atlantique est remarquable. Difficile de se prononcer sur l'origine de ces oiseaux mais une arrivée sur un bateau est possible.

ÉTOURNEAU UNICOLORE *Sturnus unicolor*
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 3/3)

Vendée : 1 ind. du 25/09 au 25/01/12 en divers points de l'île de Noirmoutier (Dominique Robard *et al.*) ; 1 ind. du 12/12 au 27/01/12 dans le port du Morin / L'Épine (Frédéric Portier, Luc Chaillot & Gérard Besseau) ; 1 ind. du 18 au 26/10 à Port-Joinville / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeyer & le Groupe Ougre).

(Niche dans le Maghreb, en Espagne, Sicile, Sardaigne, Corse et dans le sud de la France). L'espèce semble de plus en plus régulière en Vendée, notamment sur l'île de Noirmoutier. Demeure rarissime en Loire-Atlantique.



Étourneau unicolore *Sturnus unicolor*,
port du Morin / L'Épine, décembre 2011
Photo © F. Portier

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

(16/16) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ind. le 30/09 à Portmain / Pornic (Françoise Marais & Aymeric Mousseau).

(La sous-espèce nominale niche de la Scandinavie à la Sibérie, jusqu'à la Kolyma, et hiverne en Europe de l'Ouest et en Asie centrale. La sous-espèce *subcalcaratus*, qui niche au Groenland et au Canada, est d'apparition possible en France). Migrateur automnal rare et irrégulier sur le littoral et les îles. 1 seule donnée en 2011 (aucune en Vendée), ce qui contraste avec l'afflux noté en 2010.

BRUANT FOU *Emberiza cia*

(1/1) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ind. le 19/11 sur les côtes de Mauves / Mauves-sur-Loire (Julien Mérot).

(Maghreb, sud et centre de l'Europe). Migrateur et hivernant occasionnel dans les deux départements, plus particulièrement en Vendée. Localisation et date classiques pour cette donnée.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*

(7/7) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind. de 1^{re} année le 16/09 aux îles Mathurin / Barbâtre (Frédéric Portier).

(Europe de l'ouest à la Turquie). Migrateur peu commun dans les deux départements. Localisation et date classiques.

LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES**Érismature rousse *Oxyura jamaicensis***

Loire-Atlantique : 1 ind. le 17/01 à Clégreuc / Vay (l'absence de description du bec ne permet pas d'exclure l'Érismature à tête blanche ou un éventuel hybride entre les deux Érismatures).

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*

Loire-Atlantique : 1 ind. du 09/01 au 26/02 à Lyarne / Les Moutiers-en-Retz (description trop sommaire, ne permettant pas d'exclure une espèce d'ibis exotique).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* (donnée soumise à homologation car atypique en termes de localisation et de date)

Loire-Atlantique : 1 ind. le 10/10 au-dessus du

pont de Cheviré / Nantes (description peu convaincante et conditions d'observations difficiles).

Faucon kobez *Falco vespertinus*

Loire-Atlantique : 1 ind. le 24/05 à l'île Jacqueline / Trignac (description incomplète).

Goéland pontique *Larus cachinnans*

Vendée : 1 ad. les 15 et 16/01 plage de la Tourette / L'Île-d'Yeu (il s'agit probablement de cette espèce mais en l'absence d'éléments photographiques, il est impossible d'exclure un éventuel hybride) ; 1 ad. le 09/11 au Tanchet / Les Sables-d'Olonne (il s'agit probablement de cette espèce mais en l'absence d'éléments photographiques, il est impossible d'exclure un éventuel hybride).

Cochevis huppé *Galerida cristata*

(donnée soumise à homologation car atypique en terme de localisation)

Loire-Atlantique : 1 ind. le 03/04 à la Pageaudière / Oudon (aucun élément discriminant ne permet d'orienter l'identification vers l'espèce proposée. L'Alouette des champs notamment ne peut être exclue).

Pipit rousseline *Anthus campestris*

Loire-Atlantique : 1 ad. le 25/06 à la Grande Falaise / La Turballe (site classique sur lequel l'espèce s'est déjà reproduite mais sans description, impossible de trancher)

Hypolaïs icterine *Hippolais icterina*

Vendée : 1 ind. le 07/09 à la Casse de la Belle-Henriette / La Tranche-sur-Mer (description trop sommaire, observation trop brève).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator*

Loire-Atlantique : 1 ind. de 1^{re} année le 22/08 dans le marais des Tiers Desséchés / Saint-Etienne-de-Montluc (description trop sommaire).

LISTE DES DONNÉES HOMOLOGUÉES PAR LE COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL EN 2011

Les données ci-dessous sont issues du rapport

2011 du comité d'homologation national (Reeber & CHN, 2012) et concernent les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée.

OIE DE TAÏGA *Anser fabalis fabalis*

Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, ad., phot., du 22 au 30 novembre (P. Trotignon, J.-C. Croisé).

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus*

Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, 28 et 29 novembre (P. Trotignon).

MACREUSE À FRONT BLANC *Melanitta perspicillata*

Vendée : La Tranche-sur-Mer : plage de la Terrière, mâle 1^{er} hiver, 9 avril (P. Trotignon *et al.*), mâle ad., du 24 au 29 décembre (P. Trotignon *et al.*), fem., du 24 décembre au 8 janvier 2012 (P. Trotignon *et al.*) ; L'Épine : pointe du Devin et Noirmoutier-en-l'Île : pointe de l'Herbaudière, fem. juv./1^{er} hiver, phot., 9 novembre (P. Trotignon *et al.*).

ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE *Oxyura leucocephala*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, mâle ad., phot., 15 septembre, 12 octobre puis du 22 décembre au 20 février (S. Reeber *et al.*).

VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius*

Vendée : Noirmoutier-en-l'Île : la Salaisière, phot., 26 et 27 mars (J.-C. Croisé *et al.*).

BÉCASSEAU SEMIPLAMÉ *Calidris pusilla*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, juv., phot., du 20 au 30 septembre (S. Reeber *et al.*), juv., du 28 au 30 septembre (S. Reeber *et al.*).

BÉCASSEAU À LONGS DOIGTS *Calidris subminuta*

Loire-Atlantique : La Turballe : saline Gau, juv., phot., du 1^{er} novembre au 26 janvier 2012 (O. Vanucci, W. Raitière, J. Mérot, A. Mousseau, A. Joris *et al.*).

BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii*

Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, ad., 22 et 23 août (P. Trotignon).

BÉCASSEAU À QUEUE POINTUE *Calidris acuminata*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, ad., phot., du 22 au 27 septembre (S. Reeber *et al.*).

BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola facinellus*

Vendée : Bouin : lagune du Dain, ad., 17 mai (J.-C. Delattre).

BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis*

Loire-Atlantique : Saint-Joachim : Grande Brière, phot., 22 mai (J.-L. Durin, A. Troffigué).

Vendée : L'Île d'Yeu : plage de la Grande Conche, phot., 5 septembre (S. Desmarest) ; Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, 14 et 15 septembre (J. Gonin *et al.*).

BÉCASSINE DOUBLE *Gallinago media*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, 28 avril (S. Reeber).

BÉCASSIN À LONG BEC *Limnodromus scolopaceus*

Vendée : Noirmoutier-en-l'Île : Île de Noirmoutier, phot., 1^{er} mai (D. Robard).

GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoides*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, 1^{er} hiver, phot., 22 décembre (S. Reeber).

STERNE ÉLÉGANTE *Sterna elegans*

Individus présentant les caractéristiques de la Sterne élégante.

Vendée : Barbâtre : polder de Sébastopol, ad., phot., du 11 avril au 25 mai. (photos sur www.ornitho.fr)

BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola*

Vendée : L'Île d'Yeu : pointe de la Gournaise, 1^{er} hiver, 28 août (X. et M.-P. Hindermeier).

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce phoenicuroïdes.

Vendée : L'Île d'Yeu : la Bergerie, mâle, phot., 12 novembre (B. Isaac, O. Penard, J.-M. Guilpain).

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola*

Vendée : L'Île d'Yeu : dune de la Grande Conche, 1^{er} hiver, 16 et 17 octobre (X. Hindermeier, C. Rideau *et al.*).

ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus*

Vendée : L'Île d'Yeu : plage des Bossilles et de la Borgne, juv./1^{er} hiver, 25 août (X. et M.-P. Hindermeier), plage du Cours du Moulin et impasse de la Borgne, 2 juv./1^{er} hiver, phot., du 30 septembre au 2 octobre (F. Portier *et al.*), plages de la Tourette et Cours du Moulin, 2 juv./1^{er} hiver, phot., du 18 au 21 octobre (X. Hindermeier *et al.*), considérés comme les mêmes que les précédents ; Barbâtre : la Borderie, juv./1^{er} hiver, 16 septembre (F. Portier) ; Noirmoutier-en-l'Île : réserve naturelle des marais de Müllembourg, juv./1^{er} hiver, 19 septembre (D. Desmots) ; Sainte-Hilaire-de-Riez : pointe de la Grosse Terre, juv./1^{er} hiver, phot., du 28 au 30 octobre (G. Besseau *et al.*).

BIBLIOGRAPHIE

CAF., 2007. Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos*, 14(4) : 234-246.

Dourin J.-L., Montfort D., Reeber S. & Troffigué, A., 2008. Premier cas de nidification de la Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* en France. *Ornithos*, 15(6) : 394-399.

Issa N. & Rebeyrat X., 2012. Afflux d'Accenteurs alpins *Prunella collaris* dans l'ouest de la France à l'automne 2011. *Ornithos*, 19(5) : 326-332.

Recorbet B., (coord.). 1992. *Les oiseaux de Loire-Atlantique du XIX^e siècle à nos jours*. Groupe Ornithologique de Loire-Atlantique, Nantes, 285 pages.

Reeber, S. , 2011. Premier cas de reproduction de l'Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* au lac de Grand-Lieu. *Ornithos*, 18(6) : 390-392.

Reeber S. & le CHN, 2012. Les oiseaux rares en France en 2011. *Ornithos*, 19(6) : 353-395.

Frédéric LE GALLO
106 La Porcelière
85250 SAINT-ANDRÉ GOULE D'OIE
(flegallo@gmail.com)

Willy RAITIERE
Rougerand
44590 SAINT-VINCENT-DES-LANDES
(wild_wild_will_2000@yahoo.fr)

Merci à Frédéric Portier et André Barzic pour la relecture de ce rapport.

– Avril 2013 –