

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES

de juillet 1994 à juin 1995


Christian GONIN et Lucien GRILLET

6199 données sont parvenues au fichier, pour un total de 281 espèces observées. Cela dit, la répartition des données est très inégale, l'effort de prospection diminuant traditionnellement des côtes vers l'intérieur, avec quelques exceptions comme l'étang des Boucheries (carte 1325).

Certaines espèces présentes, voire nicheuses comme le Petit-duc scops, le Moineau soulcie ou le Grosbec casse-noyaux n'ont pas été mentionnées cette année, faute d'une "pression" d'observation suffisante en période de nidification sur leurs sites traditionnels (île

de Noirmoutier pour le premier, villages de la plaine pour le second ou forêt de Mervent pour le Grosbec).

Les actualités ornithologiques qui suivent ne prétendent donc pas donner une image exhaustive des ressources de la Vendée en matière d'avifaune. Cependant, pour remédier en partie aux lacunes avérées, nous avons fait figurer des espèces pour lesquelles le fichier est muet mais dont nous pensons qu'elles sont susceptibles d'avoir été présentes au cours de la période considérée.



Nombre d'espèces parvenues au fichier, par carte IGN au 1/25.000

N.B : entre parenthèses et à la suite du nom de chaque espèce, le nombre de données reçues au fichier pour la période considérée. Quand le nom de l'espèce est suivi d'une étoile *, cela signifie qu'il s'agit d'une espèce soumise à homologation (CHN = Comité d'Homologation Nationale).

PLONGEON CATMARIN, *Gavia stellata* (16)

Hivernant commun du littoral, il a été noté de la mi-décembre à la fin janvier. Une observation tardive d'un ind. à la pointe de St-Pierre (Ile de Noirmoutier) le 02/05/95 (LPO Noirmoutier).

Toutes les données concernent généralement 1 à 2 oiseaux à l'exception de deux données de la corniche de Sion-sur-l'Océan de plus de 10 ind. le 25/12/94 et 7 le 15/01/95 (G.B).

PLONGEON ARCTIQUE, *Gavia arctica* (9)

Oiseau hivernant aux îles d'Yeu et de Noirmoutier du 21/10/94 au 13/02/95. Chaque donnée concerne un seul oiseau.

Un individu a été observé à la corniche de Sion-sur-l'Océan le 23/12/94 et un jeune au lac du Jaunay le 16/01/95 (G.B).

PLONGEON IMBRIN, *Gavia immer* (12)

Observé au phare de l'Armandèche le 27/11/94 (C.B), à l'île d'Yeu avec 9 données du 27/12/94 au 01/01/95 (X.H et M-P.V) et à Saint-Vincent-sur-Jard le 31/12/94 (S.V). Chaque donnée ne concerne qu'un ou deux individus.

GREBE CASTAGNEUX, *Tachybaptus ruficollis* (63)

Observé dans tout le département; la majorité des données provient des étangs du bocage et de la Belle Henriette avec quelques indices de reproduction.

Quelques observations de fin d'été : 115 à l'étang des Boucheries le 07/08/94 (L.G) et 30 à la lagune de la Belle Henriette le 24/09/94 (C.B).

GREBE HUPPE, *Podiceps cristatus* (82)

Régulièrement observé sur les étangs du bocage, et hivernant commun sur les lacs et tout le littoral du département. Les données de reproduction de cet oiseau proviennent surtout des étangs du bocage.

Des concentrations de 15 à 25 ind. en fin d'été sont signalées au lac de Château-Guibert le 03/08/94 (S.V), à l'étang des Boucheries le 07/08/94 et au lac d'Albert le 01/10/94 (G.B).

L'hivernage de 16 à plus de 24 ind. a été noté à l'île d'Yeu (X.H et M-P.V).

GREBE JOUGRIS, *Podiceps griseigena* (2)

Un juvénile 1^{ère} année, aux Sables d'Olonne le 27/11/94 (C.B) et deux autres à la station d'épuration de Talmont, le 17/01/95 (ONC).

GREBE ESCLAVON, *Podiceps auritus* (14)

Observé du 12/11/94 au 09/04/95 à l'île de Noirmoutier, sur les côtes des Sables et de Jard-sur-Mer.

4 ind. le 13/11/94 à la station d'épuration de Noirmoutier (sortie du G.O.Vendéen) et 2 autres le 17/01/95 à celle de Talmont (ONC).

Un ind. du 22/01/95 au 14/03/95 a été noté au marais de la Vie (G.B) et le dernier a été vu le 19/05/95 à la station d'épuration de Noirmoutier (LPO Noirmoutier).

GREBE A COU NOIR, *Podiceps nigricollis* (72)

Observé toute l'année. Il a été noté régulièrement dans le marais de la Vie, à l'étang des Boucheries, à la station d'épuration de la Tranche-sur-Mer, à l'île de Noirmoutier, sur les plans d'eau des Mattes, de Maché, de la Tranche, de Château-Guibert, des marais d'Olonne et à la station d'épuration de Luçon, mais de façon sporadique.

Les maximums souvent notés en septembre et en octobre : 25 ind. à la Belle Henriette le 13/09/94 (?), 9 à la station d'épuration de la Tranche le 24/09/94 (C.B), 12 au marais de la Vie le 28/09/94 (M.T) et 7 à la station d'épuration de Noirmoutier le 11/12/94 (A.B).

FULMAR BOREAL, *Fulmarus glacialis* (1)

L'espèce reste rare dans le département. Le cadavre d'un adulte mazouté a été découvert sur la plage de la Parée Preneau (Saint-Hilaire-de-Riez) le 18/03/95 (J.V).

PUFFIN CENDRE, *Calonectris diomedea* (0)

Pas de donnée en 94-95.

PUFFIN MAJEUR, *Puffinus gravis* (0)

Pas de donnée en 94-95.

PUFFIN FULIGINEUX, *Puffinus griseus* (1)

Une seule donnée d'un ind. au large des Sables (sortie Kifanlo) le 18/08/94 (F.P).

PUFFIN DES ANGLAIS, *Puffinus puffinus* (3)

3 ind. le 21/08/94 (ADEV) et 1 ind. le 28/08/94 (S.V et A.T) à la pointe du Payré et un autre à la plage de la Terrière le 25/09/94 (ADEV).

PUFFIN DES BALEARES, *Puffinus mauretanicus* (14)

Essentiellement observé de la côte de Sion-sur-l'Océan aux Sables d'Olonne d'août à la fin octobre 94.

Quelques maxima sont notés : plus de 100 à la corniche de Sion le 01/08/94 (G.B), plus de 500 au large des Sables (sortie Kifanlo) le 18/08/94 (F.P), plus de 200 à la Chaume le 27/08/94 (X.H et M-P.V) et plus de 300 au phare de l'Armandèche le 17/09/94 (C.B).

Puis du 13 au 29/06/95, 200 à 1500 ont été signalés sur la corniche de Sion-sur-l'Océan (G.B).

PUFFIN DE MEDITERRANEE, *Puffinus yelkouan yelkouan* (5)

Plus rare que le précédent, 3 ind. à la Terrière le 15/10/94 (ADEV sud Vendée) et 4 données concernant 1 à 3 ind. du 17 au 21/10/94 à l'île d'Yeu (X.H et M-P.V).

OCEANITE DE WILSON, * *Oceanites oceanites* (1)

1 ind. le 18/08/94 au large des Sables-d'Olonne (D.D), donnée acceptée par le CHN.

OCEANITE TEMPETE, *Hydrobates pelagicus* (13)

Observé sur la côte de Sion-sur-l'Océan, de l'île de Noirmoutier et au large des Sables, du 01/08/94 au 18/09/94.

Quelques maximums notés : env. 20 au large de St-Gilles le 12/08/94 (F.S), plus de 70 au large des Sables (sortie Kifanlo) le 18/08/94 (F.P) et env. 100 à la corniche de Sion-sur-l'Océan le 18/09/94 (G.B).

8 données concernant 3 à 25 ind. du 28/12/94 au 01/01/95 à l'île d'Yeu (X.H et M-P.V)

OCEANITE CULBLANC, *Oceanodroma leucorhoa* (1)

Une seule donnée de 3 ind. au phare de l'Armandèche le 25/09/94 (C.B).

FOU DE BASSAN, *Sula bassana* (32)

Présent en toute saison dans les îles et sur le littoral du département, plus particulièrement de Sion-sur-l'Océan aux Sables.

Quelques maximums notés : plus de 450 le 01/09/94 au phare des Barges (la Chaume) (F.P), plus de 80 le 18/09/94 à la corniche de Sion-sur-l'Océan (G.B), plusieurs centaines le 29/12/94, 50 le 18/04/95 à l'île d'Yeu (X.H et M-P.V) et plus de 50 le 16/05/95 à Sion-sur-l'Océan (G.B).

GRAND CORMORAN, *Phalacrocorax carbo* (136)

Nous ne pouvons pas savoir si la population des hivernants est stable ou en hausse, faute d'informations reçues au fichier. Dans l'avenir, il serait souhaitable de noter les vols et rassemblements à la tombée de la nuit surtout en décembre et en janvier à fin de les comparer aux dortoirs connus.

Quelques maxima notés aux dortoirs : 217 le 09/11/94 au marais d'Olonne (ONC), plus de 100 le 31/12/94 à l'île d'Yeu (X.H et M-P.V), 260 le 16/01/95 à l'étang des Boucheries (L.G).

CORMORAN HUPPE, *Phalacrocorax aristotelis* (9)

Observé localement aux îles d'Yeu et de Noirmoutier de mi-octobre au début de janvier. Les données concernent de un à quatre oiseaux. Un ind. à la Paracou le 06/11/94 (X.H et M-P.V).

BLONGIOS NAIN, *Ixobrychus minutus* (2)

2 données en mai et en juin d'un mâle et d'une femelle dans le marais d'Orouet (depuis 6 ans dans le même site) (G.B).

BIHOREAU GRIS, *Nycticorax nycticorax* (14)

Observé régulièrement sur les bords du communal du Poiré-s-Velluire, de la rivière « la Vendée » de Fontenay-le-Comte à Velluire et aux environs de Chaillé-les-Marais de mai à juillet 95 (C.G, J.G et S.V).

Baisse d'effectifs des reproducteurs (- 45 depuis 1993) : 72 cples nicheurs en 1995 (85 en 94, 117 en 93) à Chaillé-les-Marais.



HERON GARDEBOEUFS, *Bubulcus ibis* (57)

Présent toute l'année, souvent en bandes de plus de 10 dans le Marais Poitevin (33 données) et le Marais Breton (10 données) et aussi ailleurs mais de façon sporadique (marais de la Vie, d'Olonne, de la Guittière).

Reproduction : une remarquable hausse d'effectifs nicheurs de 2 cples (1994) à 55 cples à Chaillé-les-Marais et 3 cples à Saint-Denis-du-Payré.

AIGRETTE GARZETTE, *Egretta garzetta* (83)

Deux données de dortoirs : plus 300 ind. au marais de la Vie le 04/09/94 (G.B) et 815 à Luzérondé le 22/03/95 (F.Si). Il serait souhaitable de faire un recensement des dortoirs de cet oiseau surtout en Marais Breton et sur l'île de Noirmoutier ainsi qu'en Marais Poitevin.

Commune	Nombre de nids
Marais Poitevin	
Nalliers 1	P
Chaillé-les-Marais	94
Ste Gemme-la-Plaine	22
Triaise	4
St Denis-du-Payré	21
la Faute-sur-Mer	1
Total	142

Marais Breton	
Notre-Dame-de-Monts	381
Notre-Dame-de-Riez	37
Saint-Hilaire-de-Riez	44
Total	462
Autres	
Olonne-sur-Mer	6
Total	6
Total général	610

P : nidification probable

(ACEDEM, ADEV, FDCV 85, FPPMAV, CN de Nalliers, PNR et GOV).

GRANDE AIGRETTE, *Egretta alba* (24)

10 données d'un à deux ind. de fin septembre à fin novembre aux lacs de Maché/Apremont, des Vallées, du Jaunay, à l'étang du Petit Marais et à Talmont, puis 14 données d'un à deux ind. de mi-janvier à mi-avril aux marais de Lairoux, de Grues, de Champagné-les-Marais, de Jard-sur-Mer, de Saint-Benoist-sur-Mer et à la baie de l'Aiguillon.

HERON CENDRE, *Ardea cinerea* (130)

Très commun en toute saison.

Commune	Nombre de nids
Marais Poitevin	
Maillé	23
Saint-Pierre-le-Vieux	40
Fontaines	1
Vix	56
l'Île-d'Elle	3
Nalliers 1	49
Nalliers 2	2
Nalliers 3	2
Chaillé-les-Marais	140
Ste Gemme-la-Plaine	179
Triaze	42
St Denis-du-Payré	140
St Benoist-s-Mer	2
Chasnais	5
la Fautte-sur-Mer	10
la Tranche-sur-Mer	103
Longeville-sur-Mer	11
Total	808
Marais Breton	
Notre-Dame-des-Monts	519
Notre-Dame-de-Riez	63
Saint-Hilaire-de-Riez	130
Brétignolles	9
Total	721
Autres	
Olonne-sur-Mer	180
Talmont	46
Etang du Châteller (bocage)	1
Etang de la Rairie	non compté
Total	227
Total en Vendée	1756

(ACEDEM, ADEV, FDCV 85, FPPMAV, CN de Nalliers, PNR et GOV).

HERON POURPRE, *Ardea purpurea* (26)

Observé de juillet jusqu'au début de septembre puis à partir de mi-avril concernant le plus souvent un seul individu, dans certains cas de 2 à 4.

Commune	Nombre de nids
Marais Poitevin	
Vix	1
Nalliers 1	P
Nalliers 2	18
le Langon	17
Chaillé-les-Marais	51
Total	87

P : nidification probable

(ACEDEM, ADEV, FDCV 85, FPPMAV, CN de Nalliers, PNR et GOV).

CIGOGNE NOIRE, *Ciconia nigra* (14)

14 données au passage postnuptial du 02/07/94 au 09/10/94. 10 données proviennent du Marais Poitevin (4 ind. le 02/07/94 (C.P), 4 le 31/08/94 et 5 le 04/09/94 (ADEV) à St-Denis-du-Payré) et 4 autres : 1 le 30/08/94 au bois de Soullans (L.B), 1 les 07 et 11/09/94 à l'étang des Boucheries (H.B) et 1 le 25/09/94 au Girouard (C.B).

CIGOGNE BLANCHE, *Ciconia ciconia* (29)

Nicheur en Marais Poitevin et en Marais Breton (effectif de couples non communiqué au fichier). 25 données de juillet à mi-octobre, puis de mi-janvier à fin juin proviennent du Marais Poitevin.

IBIS SACRE, *Treskiornis aethiopicus* (10)

1 ind. le 13/08/94 dans le marais Montportreau (les Sables d'Olonne) (F.P) et 9 données d'un ind. du 18/12/94 au 20/02/95 au Poiré-sur-Velluire (C.G, J.G et D.C).

SPATULE BLANCHE, *Platalea leucorodia* (54)

Quelques maxima lors du passage postnuptial notés : 47 ind. en vol, le 14/09/94 à la plage de Sauveterre (ONC), 18 en vol, le 22/09/94 à la corniche de Sion-sur-l'Océan et encore 18 le 03/10/94 dans les marais de la Vie (G.B).

La dernière a été notée en baie de l'Aiguillon les 24 et 26/12/94 (ADEV et P.G), probablement passe-t-elle l'hiver ?

Quelques maxima lors du passage prénuptial : 1 à 17 du 07/02/95 au 19/05/95 dans les marais d'Olonne (ONC), 11 à 15 du 04 au 08/04/95 à Beauvoir (P.Re); 10 le 21/04/95 à la Guittière (B.T, J-P.P et G.Bu).

CYGNE TUBERCULE, *Cygnus olor* (89)

La majorité des données (78) provient du Marais Poitevin. Seulement 5 données de rassemblement supérieur à 50 au communal de

Lairoux en janvier et en mars et à la réserve de Saint-Denis-du-Payré en mai.

Absence de données de reproduction de cette espèce, cela est dû probablement à un désintérêt des observateurs qui ne notent pas toujours ces oiseaux semi-domestiques ?

CYGNE NOIR, *Cygnus atratus* (5)

1 ind. du 08/08/94 au 24/09/94 à Chassenon-le-Bourg (G.B) et 1 du 23/05/95 au 20/06/95 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré (ADEV).

OIE DES MOISSONS, *Anser fabalis* (1)

Une seule donnée de 3 ind. le 19/10/94 en baie de l'Aiguillon (ONC).

OIE A BEC COURT,* *Anser brachyrhynchus* (18)

Pour la 2^{ème} année consécutive, 1 individu a séjourné du 16/11/94 au 17/02/95 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV), sans doute un des deux oiseaux de l'an passé.

Donnée acceptée par le CHN.

OIE RIEUSE, *Anser albifrons* (20)

L'hivernage de 2 à 15 ind. a été noté du 17/10/94 au 07/03/95 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré et à la baie de l'Aiguillon.

2 ind. le 10/12/94 au communal du Poiré-sur-Velluire (P.R).

OIE CENDREE, *Anser anser* (118)

En passage postnuptial, les premières ont été notées le 10/10/94, puis 525 en plusieurs vols le 17/10/94 à la pointe de l'Aiguillon. D'autres passages ont été signalés : 80 en vol le 17/10/94 à Sainte-Flaive-des-Loups (M.C), 60 le 18/10/94 à l'étang des Boucheries (H.B), 150 le 05/11/94 à la corniche de Sion (G.B), 60 le 05/11/94 à Mouchamps (T.Y), 180 le 26/11/94 au lac de Château-Guibert et 70 le 27/11/94 à l'étang des Tourettes à Mareuil-sur-le Lay (S.V) et les dernières le 27/11/94 à Mouchamps (T.Y).

Quelques maximums notés en baie de l'Aiguillon : 2968 le 19/10/94, 1273 le 17/11/94 et 1521 le 19/12/94 (ONC).

1200 ind. à la mi-janvier lors de l'enquête BIROE : 812 en baie de l'Aiguillon, 312 à la réserve de Saint-Denis, 22 au Poiré-sur-Velluire, 16 en baie de Bourgneuf et 5 à la côte de Brétignolles.

Des poses ont été notées surtout en Marais Poitevin : de 275 à 546 du 11/02/95 au 06/03/95 au communal du Poiré (C.G, J.G et D.C), et aussi sur les quelques étangs du bocage.

Le fichier manque de données sur leurs remontées de février et de mars. Reproductrice présente toute l'année à la réserve naturelle de

St-Denis : 6 couples pour 30 oisons à l'envol en 1995 (ADEV).

OIE A TETE BARREE, *Anser indicus* (8)

1 individu a séjourné du 10/04/95 au 26/05/95 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré (ADEV).

BERNACHE DU CANADA, *Branta canadensis* (2)

1 individu a été noté dans les marais du Plumet (Jard-sur-Mer) du 09 au 11/03/95 (F.S).

BERNACHE NONNETTE, *Branta leucopsis* (1)

Une seule donnée d'un ind. le 19/10/94 en baie de l'Aiguillon (ONC)

BERNACHE CRAVANT, *Branta bernicla* (49)

Présente de fin septembre à mi-juin sur tout le littoral.

Bilan des comptages de la baie de Bourgneuf (BB) et celle de l'Aiguillon (BA) avec un total estimé en France (FR) :

	oct	nov	déc	jan	fév	mar
BB	2202	10343	7230	4947	1892	1079
BA	160	128	916	1272	3164	396
FR	24 000	125000	106000	101000	73000	37000

Le pic d'abondance en France se situe en novembre (~125 000), mois qui correspond au maximum des effectifs comptés dans le golfe du Morbihan (~34 500), le complexe RN Moëze-Ile d'Oléron (~26 000) et l'Île de Ré (~20 370) (MAHEO, 1995).

Les dernières notées : 12 le 23/05/95 à la corniche de Sion-sur-l'Océan (G.B) et 1 le 03/06/95 au port des Brochets (J.R).

TADORNE CASARCA, *Tadorna ferruginea* (6)

2 ind. à la pointe d'Arçay et en baie de l'Aiguillon du 11/12/94 au 14/02/95 (ONC, M.C, C.G, J.G et M.G-C).

TADORNE DE BELON, *Tadorna tadorna* (107)

Observé en toutes saisons dans les marais salés.

Comptage BIROE à la mi-janvier 95 :

Bourgneuf/Noirmoutier	4 095 (R*)
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	2 705 (R)
Reste	778
Total Vendée	7 578
Total France	40 235

L'effectif national recensé en 1995 est inférieur à celui de 1994 (46 188) malgré une progression régulière de cette espèce observée depuis les 20 dernières années en Europe.

Reproduction en 1995

Marais de Noirmoutier	80 à 100 cples
Marais Breton	40 à 70 cples**
Saint-Gilles	2 à 3
Marais Poitevin	10 à 15**

* La lettre R indique que le site a atteint en janvier 1995 le niveau d'importance international défini par la convention de Ramsar (1% de l'effectif d'une espèce).

** Effectif probable

AIX CAROLIN, *Aix sponsa* (1)

Espèce introduite ou échappée de captivité. 1 mâle le 15/10/94 au lac du Jaunay (G.B).

AIX MANDARIN, *Aix galericulata* (1)

Espèce introduite ou échappée de captivité. 1 femelle le 19/11/94 aux abords du communal du Poiré-sur-Velluire (C.G et J.G).

CANARD SIFFLEUR, *Anas penelope* (96)

Hivernant régulier. Les premiers notés : 39 le 25/09/94 à la plage des Granges (Brem) (C.B) et le dernier : le 06/06/95 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré (ADEV). Il a surtout été signalé en Marais Breton, Marais Poitevin, et à l'étang des Boucheries, ainsi que sur quelques plans d'eau, mais de façon sporadique.

Comptage BIROE mi-janvier 1995 : la baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay occupe la 3^{ème} position et la réserve de Saint-Denis du Payré la 7^{ème} de l'effectif national.

Bourgneuf/Noirmoutier	187
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	1 995
Réserve de Saint-Denis-du-Payré	1 260
Reste	348
Total Vendée	3 790
Total France	38 150

Les données du passage prénuptial proviennent le plus souvent du Marais Poitevin et également des Boucheries. Les pics de ce passage sont : 537 le 28/01/95 au communal du Poiré (C.G), 1376 le 07/02/95 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré (ADEV).

CANARD CHIPEAU, *Anas strepera* (55)

Les deux seuls sites où la présence de l'espèce est assez régulière sont l'étang des Boucheries et la réserve de Saint-Denis-du-Payré. Une bonne fréquentation de ce canard avec 11 à 45 ind. a été notée de fin novembre 94 à la fin mars 95 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré.

Comptage BIROE : seulement six sites pour un total de 94 ind. Effectif national : 15 964.

1 couple signalé les 22/04/95 et 29/05/95 dans les marais du Ligneron (G.B), sans suite pour la

reproduction et 3 couples cantonnés dans les marais de Noirmoutier en 1995 (P.R et al.)

SARCELLE D'HIVER, *Anas crecca* (122)

Présente toute l'année à la réserve de Saint-Denis-du-Payré. Ailleurs hivernante et de passage.

Hivernage remarquable à Saint-Denis-du-Payré avec un maximum de 2 330 ind. le 19/12/94 (ADEV).

Comptage BIROE en janvier 95 : la réserve de Saint-Denis-du-Payré occupe la 5^{ème} position de l'effectif national.

Bourgneuf/Noirmoutier	241
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	1 657
Réserve de Saint-Denis-du-Payré	3 181
Reste	187
Total Vendée	5 266
Total France	88 270

Encore 3 180 le 07/02/95 à Saint-Denis-du-Payré (ADEV), 594 le 01/03/95 et 928 le 04/03/95 dans les terrains inondés de l'île d'Elle suite au débordement de la Sèvre niortaise (C.G et J.G).

Aucun indice de reproduction reçu au fichier I...

CANARD COLVERT, *Anas platyrhynchos* (165)

Rassemblements importants à l'étang des Boucheries : 1100 à 2100 ind. du 04/09/94 au 03/11/94 (H.B et L.G).

Comptage BIROE en janvier 95 :

Bourgneuf/Noirmoutier	4 373
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	2 875
Reste	1886
Total Vendée	9 134
Total France	159 506

En reproduction, les premiers oeufs sont notés le 21/03/95 à Saint-Denis-du-Payré, les données de reproduction sont souvent situées début mai.

CANARD PILET, *Anas acuta* (84)

Il a été signalé de fin septembre au début de mai. Deux isolés ont été notés le 11/07/94 dans les marais d'Olonne (D.B) et le 02/08/94 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré (ADEV).

Environ 200 canards ont été vus en vol à la pointe des Corbeaux (Ile d'Yeu), le 17/10/94 (X.H et M.P.V).

Comptage BIROE en janvier 95

Bourgneuf/Noirmoutier	46
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	2 275 (R)
Marais d'Olonne	973
Reste	233
Total Vendée	3 527
Total France	13 320

La baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay (R), 2^{ème} site français et les marais d'Olonne, 4^{ème} site de l'effectif national.

Les maximums lors du passage prénuptial sont souvent notés dans le Marais Poitevin : 640 le 23/02/95 et 1112 le 07/03/95 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV), 1124 le 01/03/95 et 1444 le 04/03/95 dans les terrains inondés de l'île d'Elle suite au débordement de la Sèvre niortaise (C.G et J.G) et 700 le 05/03/95 au communal de Lairoux (G.B et P.R).

Pas de reproduction signalée malgré la présence d'oiseaux dans quelques sites en mai et en juin.

SARCELLE D'ETE, *Anas querquedula* (46)

Les dernières Sarcelles d'été sont notées le 19/09/94 dans les marais d'Olonne (ONC) et le 1^{er} couple dans les marais de Champagné-les-Marais. 2 mâles et 1 femelle au communal du Poiré-sur-Velluire le 25/02/95 (C.G).

En période de migration prénuptiale, un maximum a été noté : 25 ind. le 28/03/95 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré (ADEV).

Reproduction en 1995

Marais de Noirmoutier	1 cple
Marais Breton	15 à 30 cples*
Saint-Gilles	5 à 6 cples
Marais Poitevin	5 à 10 cples

CANARD SOUCHET, *Anas clypeata* (133)

Présent toute l'année à l'étang des Boucheries, et à la réserve de St-Denis-du-Payré sauf en juillet pour cette dernière.

Comptage BIROE en janvier 95

Bourgneuf/Noirmoutier	303
Marais d'Olonne	784 (R)
Réserve de Saint-Denis-du-Payré	375
Reste	120
Total Vendée	1 582
Total France	27 600

Dès la fin février, les mouvements migratoires ont donné lieu à des rassemblements de plus de 100 ind. surtout sur les communaux du Marais Poitevin. Quelques maximums ont été notés : 153 le 26/02/95 au communal du Poiré-sur-Velluire (D.C); 692 le 06/03/95 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré (ADEV) et aussi 300 le 23/02/95 dans les marais d'Olonne (A.Go).

Reproduction en 1995

Marais de Noirmoutier	3 à 10 cples
Marais Breton	200 à 250 cples*
Saint-Gilles	11 cples
Marais Poitevin	1 cple

* Estimation de couples nicheurs en 1995

SARCELLE A COLLIER, *Callonetta leucophrys* (2)

Espèce forestière (canards percheurs) d'Amérique du Sud. Echappée de captivité.

1 mâle le 27/08/94 et puis la femelle le rejoint le 10/09/94 sur le lac du Jaunay (G.B).

NETTE ROUSSE, *Netta rufina* (0)

Pas d'observations en 94-95.

FULIGULE MILOUIN, *Aythya ferina* (51)

Présence régulière toute l'année à l'étang des Boucheries dont les maximums : 143 ind. le 28/10/94, 179 le 29/10/94 et 107 le 13/01/95.

Il a été noté aussi sur quinze autres sites : cela concernait souvent des groupes de moins de 50 ind. Deux maximums ont été relevés à l'étang des Mattes, plus de 170 le 28/01/95 (F.P) et 150 le 18/02/95 (P.Re).

Comptage BIROE en janvier 95 : seulement 153 pour 5 sites dont 107 aux Boucheries. Effectif national : ~ 85 885.

Trois couples se sont reproduits aux Boucheries : 4 canetons ont été vus le 12/06/95 mais il n'y en avait plus que 3 le 13/06/95.

FULIGULE A BEC CERCLE,* *Aythya collaris* (1)

1^{ère} mention en Vendée, un mâle le 10/04/95 à l'étang des Boucheries (H.B).

FULIGULE NYROCA, *Aythya nyroca* (2)

1 mâle les 05 et 06/03/95 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré (ADEV).

FULIGULE MORILLON, *Aythya fuligula* (41)

Présence régulière toute l'année à l'étang des Boucheries concernant 2 à 13 ind. et 2 à 4 au printemps. Une ponte de 8 oeufs a été découverte à la fin juin. Elle a été détruite le 11/07/95. Des empreintes de renard auraient été observées à proximité du nid (H.B et L.G).

17 ind. le 18/11/94 à la réserve de Saint-Denis (ADEV).

Comptage BIROE en janvier 95 : 9 ind. sur 2 sites. Effectif national : ~ 44 095.

FULIGULE MILOUINAN, *Aythya marila* (1)

1 femelle le 14/04/95 à la pointe du Parra-caud (P.Re).

EIDER A DUVET, *Somateria mollissima* (43)

5 à 8 stationnant à la pointe de l'Aiguillon du 02/07/94 au 14/09/94 dont une femelle immature tuée par un "fusillot" sous les yeux des "spotteurs" pendant le suivi de la migration.

1 à 3 du 26/09/94 au 10/04/95 à Sion-sur-l'Océan (G.B) et deux données de juin : 1 le 05 à la pointe de l'Aiguillon (ADEV) et 1 mâle immature le 25 à Sion-sur-l'Océan (G.B).

Comptage BIROE en janvier 95 : seulement 19 ind. sur le littoral vendéen (comptage aérien par l'ONC) alors qu'en 1994, il y en avait 257. Effectif national : ~ 2 946.

EIDER A TETE GRISE,* *Somateria spectabilis* (1)

1^{ère} mention en Vendée d'un mâle immature 1^{er} hiver le 11/12/94 à Sion-sur-l'Océan (G.B).

HARELDE BOREALE, *Clangula hyemalis* (1)

Une seule donnée : deux femelles le 26/12/94 à Sion-sur-l'Océan (G.B).

Espèce rare en France, lors du comptage BIROE en janvier 95, l'effectif national a atteint seulement 7 ind. alors que les effectifs hivernant en Europe ont été de 2 000 000 (Rose et Scott, 1994), restant concentrés en Scandinavie, au nord des Iles britanniques et en Islande.

MACREUSE NOIRE, *Melanitta nigra* (28)

La 1^{ère} a été notée le 29/07/94 à la pointe de l'Aiguillon (D.B) et la dernière le 09/04/95 à la pointe du Payré (S.V). De grands rassemblements sont souvent notés de la Terrière à la pointe d'Arçay : ~ 1800 le 25/12/94 (ADEV), 1730 le 14/01/95 et minimum 1200 le 18/02/95 (S.V).

1 femelle du 28/12/94 au 10/03/95 à la station d'épuration de la Tranche-sur-Mer (S.V et F.S).

Comptage BIROE en janvier 95 : 6685 ind. sur le littoral du département (2^{ème} rang de l'effectif national pour un total de 38 714).

MACREUSE NOIRE D'AMERIQUE,* *Melanitta nigra* (*ssp. americana*) (1)

1^{ère} mention en Vendée d'un mâle immature le 02/04/95 à la Tranche-sur-Mer (F.Ji) présentant les caractéristiques de la race *americana* (bec en grande partie jaune, bout noir) et également appelée Macreuse à bec jaune. Donnée acceptée par le CHN.

MACREUSE A FRONT BLANC,* *Melanitta perspicillata* (2)

2 données d'un mâle immature les 11/03/95 et 02/04/95 à la Terrière (A.T, F.J, P.-P.E et al.).

Données acceptées par le CHN.



MACREUSE BRUNE, *Melanitta fusca* (4)

6-7 le 24/09/94 (X.H et M.-P.V), 1 ind. le 18/02/95 (S.V) à la pointe du Grouin du Cou, 1 femelle le 18/02/95 à la Terrière (ADEV) et les 2 dernières le 21/04/95 à la pointe du Devin (LPO Noirmoutier).

GARROT A OEIL D'OR, *Bucephala clangula* (4)

1 femelle les 29/11/94 et 16/01/95 à l'étang du Petit Marais (Saint-Avaugourd-des-Landes) (F.P), 2 femelles le 25/12/94 à la pointe de l'Aiguillon (ADEV) et 1 femelle le 16/02/95 aux Boucheries (H.B).

HARLE PIETTE, *Mergus albellus* (1)

Une femelle le 08/02/95 à l'étang des Boucheries (H.B).

HARLE HUPPE, *Mergus serrator* (49)

Espèce protégée. Les 4 premiers le 19/10/94 en baie de l'Aiguillon (ONC), 1 femelle tuée par un "fusillot" le 09/11/94 sous les yeux des observateurs, pendant le suivi de la migration de la pointe de l'Aiguillon ! La dernière observation = le 13/05/95, une femelle sur la corniche de Sion-sur-l'Océan (G.B).

Deux données hors du domaine maritime : 3 le 03/12/94 au plan d'eau de Luçon (A.T et S.V), 2 mâles et 3 femelles le 20/02/95 à Saint-Avaugourd-des-Landes (ADEV).

Comptage BIROE en janvier 95 : 20 ind. sur 5 sites. Effectif national : 3 784.

HARLE BIEVRE, *Mergus merganser* (0)

Pas de données en 94-95.

ERISMATURE ROUSSE, *Oxyura jamaicensis* (3)

Séjour d'une femelle du 01/03/95 au 06/03/95 à l'étang des Boucheries.

BONDREE APIVORE, *Pernis apivorus* (23)

19 données de la mi-juillet au 23/09/94 concernant 1 à 2 ind. chaque fois. La première notée en migration le 25/04/95 à Mouzeuil-Saint-Martin (J.-C.L).

Absence de données de reproduction au fichier.

MILAN NOIR, *Milvus migrans* (54)

Quelques rassemblements de fin d'été : plus de 40 en vol à haute altitude vers le sud le 20/07/94 à Lairoux (S.V), 25 le 27/07/94 au communal du Poiré-sur-Velluire (D.C) et 17 le 09/08/94 dans les marais de la Vie (G.B). Le dernier noté = le 24/12/94 à la Tranche-sur-Mer (ADEV).

Au retour, les premiers ont été signalés le 28/02/95 au Langon avec 7 ind. (C.G). Nicheur

régulier dans l'ensemble du département avec une forte densité dans les zones côtières.

MILAN ROYAL, *Milvus milvus* (16)

Observation régulière d'individus isolés dans le Marais Poitevin de fin octobre 94 à la mi-janvier 95. Hivernage d'un individu au moins à St-Denis-du-Payré, aux Moutiers-sur-Lay et à Champ-Saint-Père.

Seulement 3 données pour le passage post-nuptial en mars et en avril, concernant un à deux oiseaux.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE,* *Haliaeetus albicilla* (2)

1 ind. du 23/06/95 au 08/07/95 dans les marais d'Olonne (M.F et al.).

Donnée non homologuée par le CHN : 1 imm. le 05/08/94 à Beauvoir (?).

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC, *Circaetus gallicus* (13)

Noté du 04/07/94 au 01/10/94 dans le Marais Poitevin (maximum de deux individus), 1 les 08 et 21/08/94 dans les bois de la Vergne (massif forestier de Mervent-Vouvant) (G.B) et un autre le 14/09/94 à l'étang des Mattes (M.T).

Pas d'indice de nidification signalé au fichier.

BUSARD DES ROSEAUX, *Circus aeruginosus* (98)

Peu noté lors des comptages BIROE ; seulement 17 ind. Deux petites concentrations : 10 ind. le 03/02/95 à Champagné-les-Marais et 12 le 28/02/95 au Langon (C.G).

Les premières parades le 21/03 à Noirmoutier (P.Re).

BUSARD SAINT-MARTIN, *Circus cyaneus* (42)

33 données d'octobre à la fin mars concernant 1 à 3 oiseaux à chaque fois. Pas de rassemblements ou de dortoirs d'hiver signalés au fichier. Une seule donnée de reproduction certaine au bois du Défend (S.C).

BUSARD CENDRE, *Circus pygargus* (32)

Les derniers notés le 07/09/94 en baie de l'Aiguillon (D.B) et la première femelle le 23/04/95 dans les marais de la Vie (G.B). Les données sont surtout concentrées dans le Marais Poitevin et le Marais Breton mais également noté en bocage : au Poiré-sur-Vie et à Dom-pierre-sur-Yon.

Reproduction notée dans le Marais Poitevin, le Marais Breton et dans la plaine céréalière de Luçon à Benet.

AUTOUR DES PALOMBES, *Accipiter gentilis* (9)

4 données d'un adulte et d'un jeune en juillet et en août et puis 1 en mai dans le massif forestier de Mervent-Vouvant (D.B et G.B).

Un individu chasse les pigeons à l'église de Mareuil-sur-Lay le 31/07/94 (P.R).

Le 05/10/94, à Rocheservière, un immature mâle pris dans une cage-piège avec des pies a été relâché (L.G).

EPERVIER D'EUROPE, *Accipiter nisus* (32)

Passage noté de la fin août à octobre 94 pendant le suivi de la migration de la pointe de l'Aiguillon.

Il pourchasse souvent des passereaux, mais n'hésite pas à s'attaquer à plus gros que lui comme le 08/10/94 au lac de Maché/Apremont où il attaque un héron (A.G).

Pas d'indice de reproduction reçue au fichier et très peu de données de mai à juin.

BUSE VARIABLE, *Buteo buteo* (79)

Très bien notée sur toute l'année mais peu d'indices de reproduction parvenus au fichier.

5 observations d'un individu en phase claire : le 14/01/95 à la station d'épuration de la Tranche (S.V), le 27/02/95 et 06/03 dans les marais de Champagné-les-Marais (C.G), le 09/04/95 dans l'estuaire du Payré (S.V) ainsi que du 15/12/94 au 01/01/95, au Poiré-sur-Vie (A.G).

~ 10 ensemble le 10/04/95 aux Moutiers-sur-Lay (S.V).

BUSE DE RUSSIE,* *Buteo buteo vulpinus* (2)

1 ind. du 15/11/94 au 19/03/95 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré (ADEV, J.-Y.F, F.Ji, A.L et al.). Donnée acceptée par le CHN.

A retenir l'hivernage complet deux hivers consécutifs d'un adulte en Vendée.

AIGLE CRIARD, *Aquila clanga* (1)

Donnée non homologuée par le CHN : 1 adulte le 06/03/95 à la Guittière (?).

AIGLE BOTTE, *Hieraaetus pennatus* (3)

1 le 17/07/94 dans le massif forestier de Mervent-Vouvant (PNR).

2 ind. en phase sombre notés le 28/09 et le 01/11/94 pendant le suivi de la migration de la pointe de l'Aiguillon.

Reproduction supposée en Vendée.

BALBUZARD PECHEUR, *Pandion haliaetus* (26)

Il est régulièrement observé : ainsi 11 données du 12/08/94 au 23/09/94 concernant jusqu'à 2 ind. en baie de l'Aiguillon. Il a été signalé aux passages postnuptiaux au lac d'Albert (Chassenon-le-Bourg), dans les marais d'Olonne et de la Guittière et aux Sables-d'Olonne. Le dernier noté à Talmont le 11/11/94 (J.-P.E).

Seulement deux données lors du passage pré-nuptial : un ind. le 26/03 au lac de Maché/Apremont (J.R) et un autre le 29/04/95 aux Boucheries (L.G).

FAUCON CRECERELLE, *Falco tinnunculus* (60)

Très commun et nicheur partout. Passage noté à l'occasion du suivi de la migration à la pointe de l'Aiguillon.

Reproduction constatée dès avril.

FAUCON KOBÉZ, *Falco vespertinus* (0)

Pas de données en 94-95.

FAUCON EMERILLON, *Falco columbarius* (23)

Observé chaque jour à partir du 24/09/94 en train de chasser les passereaux migrateurs à la pointe de l'Aiguillon.

Il a été aussi signalé aux îles d'Yeu et de Noirmoutier, à Saint-Hilaire-des-Loges, à Mouzeuil-Saint-Martin, aux Moutiers-sur-le-Lay, à Angles, à Grues et à Sainte-Flaive-des-Loups. Les 2 derniers ont été notés à Bretet le 25/03/95.

FAUCON HOBÉREAU, *Falco subbuteo* (57)

Bien signalé un peu partout. Des passages ont été notés à la pointe de l'Aiguillon à partir d'octobre et le dernier le 30/10/94 à la Belle Henriette (O.P).

Retour de migration : premier noté le 17/03/95 à Mouzeuil-Saint-Martin (J-C.L).

Pas d'indice de reproduction parvenu au fichier.

FAUCON PELERIN, *Falco peregrinus* (43)

Le nombre de données de cet oiseau devient plus important chaque année, c'est très bon signe quand on sait que cette espèce a failli disparaître dans les années 65. Probablement 3 à 5 individus hivernent en Vendée sur les sites traditionnels : les baies de Bourgneuf et de l'Aiguillon, les communaux du Marais Poitevin (de Saint-Denis-du-Payré, de Luçon et du Poiré-sur-Velluire).

PERDRIX ROUGE, *Alectoris rufa* (3)

Présente un peu partout mais surtout notée dans le marais de la Vie, à Mouzeuil-Saint-Martin, au Poiré-sur-Velluire et à Saint-Hilaire-des-Loges.

Reproduction signalée qu'à Noirmoutier et à Sigournais mais cet oiseau n'attire pas énormément les ornithologues !

PERDRIX GRISE, *Perdix perdix* (3)

Une seule donnée de reproduction, à Noirmoutier. Même remarque que pour la précédente...

CAILLE DES BLES, *Coturnix coturnix* (5)

Elle a été notée en juillet, puis de mars à juin 95 à Mouzeuil-Saint-Martin, au Poiré-sur-Velluire et Saint-Hilaire-des-Loges.

Un mâle chanteur à une date très tardive -le 14/12/94 à « France » (Mouzeuil-Saint-Martin) laisse penser à un hivernage possible. 1^{er} chanteur noté le 14/03/95 encore à « France » (J-C.L).

FAISAN DE COLCHIDE, *Phasianus colchicus* (2)

Relativement peu noté à cause de son statut d'espèce-gibier. De belles concentrations début septembre un peu partout en Vendée.

RALE D'EAU, *Rallus aquaticus* (20)

Noté de juillet à la fin décembre, puis d'avril à juin. Une donnée de reproduction possible dans les marais de la Vie (G.B).

3 à 6 du 16 au 21/10/94 dans les marais de la Croix, de la Gorette et de la Guerche (Ile d'Yeu) (X.H et M-P.V), 5-6 le 30/10/94 à la Belle-Henriette (O.P) et 5 le 02/04/95 dans les marais de la Guittière (C.B).

Premiers chanteurs notés le 15/04/95 dans les marais de la Vie (G.B).

MARQUETTE PONCTUÉE, *Porzana porzana* (1)

1 chanteur le 19/05/95 dans les marais des Bourbes à l'Île-d'Olonne (F.P).

RALE DES GENETS, *Crex crex* (1)

Une seule donnée de 7 ind. dont 6 chanteurs le 14/06/95 dans une vaste parcelle en friche au Mazeau (P.R).

GALLINULE POULE D'EAU, *Gallinula chloropus* (35)

Notée toute l'année avec quelques données de reproduction.

FOULQUE MACROULE, *Fulica atra* (84)

Surtout notée sur les étangs bocagers, plus particulièrement à l'étang des Boucheries avec un maximum de 1500 ind. le 26/09/94. Autre maximum : 1014 le 12/01/95 dans les marais d'Olonne. Quelques données de reproduction à partir d'avril.

GRUE CENDRÉE, *Grus grus* (72)

Les premiers passages sont notés à partir du 18/10/94 et concernent souvent 10 à 30 ind. Le maximum des données (26) a été obtenu en décembre.

Au moins une trentaine d'individus ont hiverné en baie de l'Aiguillon jusqu'à la mi-février 95. Regroupement en dortoir dans la baie de l'Aiguillon : 240 le 04/12/94 (P.R, M.C et A.G).

Plus de données à partir de la mi-février sauf les 3 individus blessés qui sont restés toute l'année à la réserve de Saint-Denis.

OUTARDE CANÉPETIÈRE, *Tetrax tetrax* (1)

1 femelle notée le 10/07/94 à la plaine de Mont (G.B). Comportement d'oiseau accompagné de poussins.

HUITRIER-PIE, *Haematopus ostralegus* (12)

Peu suivi cette année. ~ 100 le 28/08/94 en baie de l'Aiguillon (ONC) et 50-60 le 13/06/95 à la lagune du Dain (P.Re).

Comptage BIROE en janvier 95 : 2595 ind. dont 2557 en baie de Bourgneuf / Noirmoutier pour un total français de ~ 39 800 hivernants.

ECHASSE BLANCHE, *Himantopus himantopus* (57)

17 données de juillet à la mi-septembre 1994 concernent souvent des adultes accompagnés de jeunes. La 1^{ère} a été notée le 11/03/95 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré (ADEV).

Enquête sur les limicoles nicheurs en 1995 :

Marais de Noirmoutier	87 à 91 cples
Marais Breton	173 à 211 cples
Marais de la Guittière	15 cples
Marais de Jard-s-Mer	8 cples
Marais Poitevin	66 à 71 cples
Total Vendée en 1995	349 à 396 cples
Enquête 1986	125 à 130 cples

AVOCETTE ÉLEGANTE, *Recurvirostra avosetta* (38)

Notée toute l'année en baie de Bourgneuf / Noirmoutier et surtout en baie de l'Aiguillon. Une donnée intérieure de 30 ind. le 25/11/94 à l'étang des Boucheries (H.B).

Comptage BIROE de janvier 95

Bourgneuf/Noirmoutier	1 593
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	7 973
Marais d'Olonne	375
Total Vendée	9 941
Total France	21 000

Enquête sur les limicoles nicheurs en 1995 :

Marais de Noirmoutier	224 à 226 cples
Marais Breton	271 à 326 cples
Marais de la Guittière	25 à 30 cples
Marais de Jard-s-Mer	1 cple
Marais Poitevin	0 cple
Total Vendée	521 à 583 cples
Enquête 1986	431 à 496 cples

ŒDICNÈME CRIARD, *Burhinus oedichnemus* (13)

Noté de juillet à fin août et de mars à juin à Mouzeuil-Saint-Martin, au Poiré-sur-Velluire et à Saint-Hilaire-des-Loges, pour un maximum

instantané de un à 6 ind. (J-C.L, P.M, C.G, J.G, PNR et G.B).

Il a été aussi signalé en juillet à Champ-Saint-Père, en avril et en mai aux Moutiers-sur-le-Lay (S.V).

1 couple a été vu le 15/05/95 sur l'aire de repos de Ste-Hermine (A83) et s'est envolé de la plateforme de cailloux à proximité des Petits gravelots (L.G).

GLAREOLE A COLLIÈRE, *Glareola pratincola* (1)

1 ind. le 05/07/94 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré (ADEV).

PETIT GRAVELOT, *Charadrius dubius* (16)

1 couple avec 1 jeune a été noté le 05/07/94 dans les marais de la Vie (G.B). Passage post-nuptial noté dès août : 4 le 20/08/94 et 2 le 15/10/94 au lac de Maché/Apremont (A.G et A.Go).

1^{er} noté le 22/03/95 dans les marais de Beauvoir-sur-Mer (P.Re).

Espèce difficile à suivre, dépendante de milieux artificiels occasionnels peu attractifs pour l'observateur.

Enquête sur les limicoles nicheurs en 1995 :

Marais de la Vie	5 cples
Marais Breton	2 cples
Chantier d'autoroute A83	3 cples
Étang de la Rainsandière	1 cple
Marais Poitevin	2 cples
Total Vendée	13 cples
Enquête 1986	2 à 5 cples

GRAND GRAVELOT, *Charadrius hiaticula* (54)

Passage post-nuptial noté à partir de la mi-août au lac de Maché/Apremont, à Sion-sur-l'Océan, à l'île d'Yeu et en baie de l'Aiguillon. Maxima notés : 180+ le 28/08/94 à la Pointe de l'Aiguillon et 130+ le 16/10/94 à l'île d'Yeu (X.H et M-P.V).

Comptage BIROE en janvier 95 : 1 050 ind. dont 978 en baie de Bourgneuf et 72 pour le reste du département (total France : 10 700).

Passage pré-nuptial à partir de mars 1995 dans les marais salés et les marais communaux. Maxima notés : 150+ le 18/03 aux marais d'Olonne (C.B).

Encore un le 6 juin à la réserve de Saint-Denis (ADEV).

GRAVELOT A COLLIÈRE INTERROMPU, *Charadrius alexandrinus* (18)

Noté jusqu'en septembre 94 à la pointe de l'Aiguillon avec un maximum de 166 ind. le 24/08/94 (C.G). Une donnée tardive de 7 ind. le 12/11/94 au Gois (A.B).

Enquête sur les limicoles nicheurs en 1995 :

Marais de Noirmoutier	3 à 6 cples
Marais Breton	3 à 5 cples
Marais Poitevin	2 à 3 cples
Total Vendée	8 à 14 cples
Enquête 1986	15 à 17 cples

PLUVIER BRONZE*, *Pluvialis dominica* (3)

2 ind. en mue du 13/09/94 au 17/09/94 à Bouin (G et M.-N. Bal, M.T et al.). Donnée acceptée par le CHN.

PLUVIER DORE, *Pluvialis apricaria* (68)

Essentiellement observé en hiver à l'intérieur de la Vendée, dans les prés communaux du Marais Poitevin et aussi à l'île d'Yeu. Le 1er est noté le 18/07/94 dans le marais de la Vie (G.B) et le dernier le 12/03/95 à Luçon (S.V).

Deux maxima : 1850 le 24/01/95 au communal du Poiré-s-Velluire (C.G et J.G), 1600 le 07/02/95 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV).

PLUVIER ARGENTE, *Pluvialis squatarola* (22)

Observé toute l'année sur la côte et dans les marais littoraux. Noté lors du passage de printemps dans les prés communaux du Marais Poitevin.

Comptage BIROE, mi-janvier 95

Bourgneuf/Noirmoutier	3080
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	985
Reste	40
Total Vendée	4105
Total France	24 500

VANNEAU HUPPE, *Vanellus vanellus* (175)

Essentiellement noté en hivernage avec de gros effectifs dans le Marais Poitevin et des effectifs de moyenne densité un peu partout

Les maxima de l'hivernage : 8000 le 26/11/94 au communal du Poiré-sur-Velluire (C.G et J.G), 3 000 le 17/12/94 à l'étang des Boucheries (L.G), 10 500 le 19/12/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV), plus de 14 000 le 19/12/94 dans les marais de Champagné-les-Marais (C.G).

Enquête sur les limicoles nicheurs en 1995 :

Marais de Noirmoutier	29 cples
Marais Breton	1170 à 1404 cples
Marais du Jaunay	13 cples
Bocage du Givrand	8 cples
Marais de la Guittière	4 cples
Marais de Jard	4 cples
Etang du Parc Soubise	1 cple
Marais Poitevin	341 à 388 cples
Total Vendée	1570 à 1843 cples
Enquête 1986	2 020 à 2 115 cples

BECASSEAU MAUBECHE, *Calidris canutus* (9)

Peu noté pendant la saison 94-95. Un seul maximum lors de la migration pré-nuptiale de 100 le 04/04/95 à la pointe de la Casie (Ile de Noirmoutier). Observation tardive d'1 ind. le 4/6/95 à l'étang des Mattes (P.Re).

Comptage BIROE, mi-janvier 95

Bourgneuf/Noirmoutier	51
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	4 158
Total Vendée	4 209
Total France	18 100

BECASSEAU SANDERLING, *Calidris alba* (20)

Les premiers ont été notés à la pointe de l'Aiguillon le 22/08/94 (C.G et J.G). Les maxima : 230 le 29/12/94 au port de Morin (LPO Noirmoutier), 235 le 15/02/95 à St-Gilles (G.B), plus de 300 le 10/03 sur la côte nord-ouest de Noirmoutier (P.Re) et les derniers (env. 150) à Barbâtre le 24/05/95 (P.Re).

Comptage BIROE, mi-janvier 95

Bourgneuf/Noirmoutier	447
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	12
Littoral vendéen	311
Total Vendée	770
Total France	5 200

BECASSEAU MINUTE, *Calidris minuta* (19)

Seulement sur les 3 sites lors de la migration d'automne : 1 à 12 ind. du 20/07/94 au 01/10/94 à la réserve de St-Denis, 1 à 15 ind. au lac de Maché-Apremont du 20/08/94 au 15/10/94 et 1 à 5 du 03/09/94 au 28/12/94 dans les marais d'Olonne.

Les 9 derniers à Angles le 09/06/95 (ADEV sud Vendée).

BECASSEAU DE TEMMINCK, *Calidris temminckii* (25)

19 données d'un à deux ind. du 31/07/94 au 19/10/94 proviennent de la réserve de St-Denis. 1 à 2 les 15/08/94, 16/08/94 et 01/09/94 à la Belle Henriette (F.P et ADEV sud Vendée) et 2 ind. le 23/09/94 au lac de Maché (M.T).

Une seule donnée du printemps d'un individu le 19/04/95 au bord de la Vendée à Velluire (J.G).

BECASSEAU TACHETE*, *Calidris melanotos* (12)

Remarquable présence avec 12 données pour cet oiseau nord-américain et sibérien. 1 juv. du 12/09/94 et du 03/10/94 au 15/10/94 au lac de Maché-Apremont (M.T, G et M.-N. Ba et al.) et 3 juvéniles du 10/09/94 au 18/09/94 dans les marais d'Olonne (G.Bu, B.C, D.D et al.).

Données acceptées par le CHN.

BECASSEAU COCORLI, *Calidris ferruginea* (19)

Noté dès juillet et jusqu'à fin octobre en migration postnuptiale à la réserve de Saint-Denis, à la Belle Henriette et dans les marais d'Olonne. Maxima notés : 8 ind. le 12/09/94 à la réserve de St-Denis (ADEV) et env. 20 le 17/09/94 dans les marais d'Olonne (C.B). Une seule donnée d'un ind. hivernant le 28/12/94 à la réserve d'Olonne (P.G). Dernière observation : 6 individus le 06/05/95 dans les marais de la Vie (G.B).

BECASSEAU VIOLET, *Calidris maritima* (19)

Régulièrement observé du 29/10/94 au 21/05/95 sur les côtes rocheuses de Sion-s-l'Océan avec un maximum de 80 ind. le 08/01/95. Il a été aussi observé dans le port de Jard (1 ind. le 28/12/94 - F.S), à l'île d'Yeu (> 20 le 29/12/94 - X.H et M.-P.V) et sur la côte de la Chaume (35 ind. le 19/04/95 - G.Bu).

BECASSEAU VARIABLE, *Calidris alpina* (63)

Très commun en hivernage sur la côte. Présent de juillet à la mi-mai un peu partout. Il a été noté lors des passages d'automne et du printemps dans les étangs, les lacs et les marais communaux.

Comptage BIROE, mi-janvier 95

Bourgneuf/Noirmoutier	12 952
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	19 130
Reste	168
Total Vendée	32 250
Total France	290 000


BECASSEAU FALCINELLE*, *Limicola falcinellus* (1)

1 ind. le 30/04/95 au Collet à Bouin (J.-Y.F et Y.T).

Donnée homologuée par le CHN.

BECASSEAU ROUSSET*, *Tryngites subruficollis* (2)

Oiseau nord-américain. 1 juv. du 12/09/94 au 23/09/94, au lac d'Apremont-Maché (G et M.-N.Ba et M.T). Donnée acceptée par le CHN.

**COMBATTANT VARIE**, *Philomachus pugnax* (81)

Passages d'automne dès juillet sur la réserve de Saint-Denis, dans les marais d'Olonne, au lac d'Apremont-Maché et à l'étang des Boucheries. Des maxima notés : 52 le 02/08/94 à la réserve de St-Denis (ADEV) et 30 le 25/09/94 dans les marais d'Olonne (C.B).

1 à 3 ind. ont hiverné à la réserve de St-Denis (ADEV) et 1 ind. les 19 et 22/12/94 au communal du Poiré-s-Velluire (C.G et J.G)..

Passage de printemps noté dès fin février. Quelques maxima : env. 40 le 10/03 au communal de Lairoux (F.S), 95 le 02/04/95 à la Guittière (C.B), plus de 80 le 03/04/95 dans les marais de la Vie (G.B), plus de 100 le 04/04/95 à Beauvoir (P.Re) et 104 le 22/04/95 à Bouin (LPO Noirmoutier)

Pas d'indice de reproduction en 1995.

BECASSINE SOURDE, *Lymnocyptes minimus* (2)

1 ind. a été observé en vol dans un groupe de bécassines le 07/11/94 à la pointe de l'Aiguillon (Equipe de la pointe de l'Aiguillon) et un autre le 19/03/95 à la Jonchère (ADEV sud Vendée).

BECASSINE DES MARAIS, *Gallinago gallinago* (100)

Observée toute l'année dans notre département. Quelques maxima : 60 le 11/11/94 à Port la Roche (A.B), 120 le 14/01/95 au polder de Sébastopol (P.R), 200 le 18/02/95 à l'étang du Vide (Sébastienopol) (P.Re) et 80 le 05/04/95 dans le marais de la Vie (G.B).

A l'automne 1994, 374 bécassines sont passées à la pointe de l'Aiguillon avec quelques vols de plus de 30 ind.

Enquête sur les limicoles nicheurs en 1995 :

Marais Breton	9 à 21 cples
Marais Poitevin	1 cple (?)
Total Vendée	9 à 21 cples
Enquête 1986	3 à 5 cples

BECASSE DES BOIS, *Scolopax rusticola* (3)

1 ind. le 10/11/94 à France (Mouzeuil-St-Martin (J.-C.L), 1 le 17/11/94 au bois de la Fidrière (la Roche) (S.C) et 1 le 06/12/94 à la réserve de Nalliers-Mouzeuil (C.G).

BARGE A QUEUE NOIRE, *Limosa limosa* (114)

Les passages postnuptiaux de juillet à octobre ont été notés un peu partout et souvent par petits groupes. Pas de gros maxima signalés à part une concentration de 3000 le 05/09/94 à la pointe d'Arçay (D.B).

Comptage BIROE, mi-janvier 95 : la baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay abrite 85% de la population française hivernante.

Bourgneuf/Noirmoutier	83
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	4 210
Reste	2
Total Vendée	4 295
Total France	5 050

Quelques maxima lors du passage prénuptial : env. 3500 le 26/02/95 au communal du Poiré (C.G et J.G), 3655 le 28/02/95 au communal de Mouzeuil (C.G) et 10 000 le 05/03 au communal de Lairoux (P.R et G.B)

Enquête sur les limicoles nicheurs en 1995 :

Marais Breton	28 à 43 cples
Marais Poitevin	26 à 29 cples
Total Vendée	54 à 72 cples
Enquête 1986	7 à 11 cples

BARGE ROUSSE, *Limosa lapponica* (14)

Un seul maximum noté : 120 le 11/11/94 à la pointe de l'Aiguillon (C.G). Passage de printemps noté dans les marais de la Vie (16 ind. le 26/04/95 - G.B).

Comptage BIROE, mi-janvier 95 :

Bourgneuf/Noirmoutier	345
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	7
Total Vendée	352
Total France	3 850

COURLIS CORLIEU, *Numenius phaeopus* (33)

Noté lors du passage postnuptial de juillet à octobre 94 par petits groupes, surtout dans le Marais Poitevin. Un seul maximum : env. 150 à la prise du Maroc (D.B).

A noter une donnée tardive d'un ind. le 13/11/94 au polder de Sébastopol (Sortie du GOVendéen).

En avril et en mai, lors du passage prénuptial, les Courlis corlieux passent et stationnent un peu partout en Vendée, par petits groupes. Dans le Marais Poitevin, l'effectif, dispersé, a été estimé à plus de 4000 individus. Ces oiseaux passent la nuit en baie de l'Aiguillon (C.G). Pour le passage à l'intérieur du département, la migration nocturne des corlieux a été entendue le 29/04/95 à Rocheservière (L.G).

COURLIS CENDRE, *Numenius arquata* (34)

Observé presque toute l'année sur le littoral et aux passages d'automne et de printemps dans les marais et les prairies communales.

Env. 400 le 28/07/94 (D.B), 500 le 01/10/94 (A.Go) en baie de l'Aiguillon et 300 le 01/11/94 en baie de Bourgneuf (A.Go).

Comptage BIROE, mi-janvier 95 :

Bourgneuf/Noirmoutier	1 464
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	443
Reste	173
Total Vendée	2 080
Total France	14 750

CHEVALIER ARLEQUIN, *Tringa erythropus* (34)

Les premiers ont été notés le 13/07/94 avec 9 individus et un maximum d'env. 15 le 28/08/94 à la réserve de Saint-Denis (ADEV). 1 à 3 ind. ont été également observés en septembre au lac d'Apremont-Maché et dans les marais d'Olonne, puis en novembre à la jetée de Jacobsen / Noirmoutier.

Comptage BIROE, mi-janvier 95 : seulement 3 en baie de l'Aiguillon/pointe d'Arçay (ONC) pour un total français de 264 ind.

Quelques maxima lors du passage de printemps : 14 le 09/04/95 à la réserve de St-Denis (S.V), 6 le 17/04/95 à la station d'épuration de Luçon (S.V) et 20 le 27/04/95 dans le marais de la Vie (G.B). Les derniers le 27/06/95 à la réserve de St-Denis, avec 8 individus (ADEV).

CHEVALIER GAMBETTE, *Tringa totanus* (55)

Noté de juillet à mi-novembre, par exemple 120 le 28/07/94 à la prise du Maroc (D.B). A partir de la mi-janvier, quelques maxima : env. 100 le 10/03/95 au communal de Lairoux (F.S), 123 le 02/04/95 à la Guiltière (J-P.Paillet et B.T) et 150 le 03/05/95 dans le marais de la Vie (G.B).

Comptage BIROE, mi-janvier 95 :

Bourgneuf/Noirmoutier	191
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	272
Reste	3
Total Vendée	466
Total France	3 950

Enquête sur les limicoles nicheurs en 1995 :

Marais de Noirmoutier	57 à 61 cples
Marais Breton	639 à 777 cples
Marais de la Guiltière	0 à 5 cples
Marais de Jard	2 à 2 cples
Marais Poitevin	88 à 106 cples
Total Vendée	786 à 951 cples
Enquête 1986	295 à 340 cples

CHEVALIER STAGNATILE*, *Tringa stagnatilis* (2)

2 juv. le 15/08/94 à Longeville (ADEV) et un autre le 05/05/95 à l'étang des Mattes (F.P).

CHEVALIER ABOYEUR, *Tringa nebularia* (48)

Passage postnuptial de juillet à novembre surtout sur la frange littorale (baies, marais côtiers et lacs) et à l'île d'Yeu par petits groupes

de 1 à 10. Un maximum a été noté le 27/08/94 au lac d'Apremont-Maché avec 25 ind.

1 ind. le 17/01/95 à la pointe d'Arçay (ONC) et 1 autre le 20/02/95 au communal d'Angles (ADEV).

Le passage prénuptial débute à partir du 5 avril 95. Deux maxima notés : 10 le 05/04/95 à Beauvoir (P.Re) et plus de 40 le 08/05/95 dans le marais de la Vie (G.B). Dernier noté : le 29/06/95 dans le marais de la Vie (G.B).

CHEVALIER CULBLANC, *Tringa ochropus* (79)

Observé toute l'année un peu partout dans le département, le plus souvent lors des passages d'automne (juillet à octobre) et de printemps (mars à juin) par petits groupes de 5 à 15 ind.

Comptage BIROE, mi-janvier 95 :

Bourgneuf/Noirmoutier	8
Littoral vendéen	6
Reste	5
Total Vendée	19
Total France	46

CHEVALIER SYLVAIN, *Tringa glareola* (14)

Noté lors du passage d'automne, du 17/07/94 au 06/09/94 au lac d'Apremont-Maché, dans les marais de la Vie et de Grues, à l'étang des Boucheries, à la réserve de Saint-Denis et à la pointe de l'Aiguillon avec un maximum de un à deux ind. par observation.

Le passage prénuptial a débuté le 17/04/95 à la station d'épuration de Luçon (S.V) et s'est achevé le 29/06/95 dans le marais de la Vie (G.B). Il concernait un seul oiseau à chaque fois.

CHEVALIER GUINETTE, *Actitis hypoleucos* (64)

Observé toute l'année un peu partout dans le département. Les données sont nombreuses lors des passages d'automne et du printemps.

L'hivernage de cet oiseau est bien marqué avec 14 indices de présence, de novembre à janvier.

Des maxima ont été relevés : plus de 30 le 21/07/94 dans le marais de la Vie (G.B), 9 le 20/08/94 au lac d'Apremont-Maché (A.G), 10 le 12/10/94 dans le marais de la Vie (G.B), env. 5 le 15/04/95 à la station d'épuration de Luçon, 5 le 20/04/95 dans le marais d'Olonne (G.Bu) et 5 le 23/04/95 dans le marais de la Vie (G.B).

TOURNEPIERRE A COLLIER, *Arenaria interpres* (15)

Le premier a été noté à partir de fin août et le dernier dans la 2^{ème} décennie de mai 95. Seulement 3 données d'intérieur : 1 le 15/04/95 à la Guiltière (G.Bu), 5 le 25/04/95 à la station d'épuration de la Tranche et 1 le 26/04/95/95 à

la réserve de Saint-Denis (ADEV). Un maximum : 20 le 27/12/94 à la pointe de l'Herbaudière (LPO Noirmoutier).

Comptage BIROE, mi-janvier 95 :

Bourgneuf/Noirmoutier	19
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	10
Total Vendée	29
Total France	5 900

PHALAROPE A BEC ETROIT, *Phalaropus lobatus* (6)

1 à 3 ind. du 21/08/94 au 30/08/94 à la prise des Wagons (ADEV, S.V et al.) et 1 ind. le 21/09/94 dans les marais d'Olonne (ONC).

PHALAROPE A BEC LARGE, *Phalaropus fulicarius* (9)

1 ind. du 10/09/94 au 13/09/94 à la Belle Henriette (C.B et ADEV), 1 à 2 ind. du 14/09/94 au 16/09/94 dans les marais d'Olonne (G.Bu), 1 le 20/01/95 à la Nouvelle Brille (Noirmoutier) (LPO Noirmoutier) et 1 ind. le 23/01/95 à la réserve de Saint-Denis (ADEV).

LABBE POMARIN, *Stercorarius pomarinus* (3)

1 le 25/09/94 à la plage des Granges (Brem) (C.B), 1 le 21/10/94 à la plage du Marais Salé (Ile d'Yeu) (X.H et M.-P.V) et 1 le 22/10/94 à la Guiltière (C.B).

LABBE PARASITE, *Stercorarius parasiticus* (21)

Toutes les données sont obtenues de septembre à mi-novembre. Observation régulière d'un à trois ind. de septembre à octobre 94 à la corniche de Sion-sur-l'Océan, à la pointe de l'Aiguillon et à la Chaume. D'autres observations également signalées aux îles d'Yeu et de Noirmoutier. Un maximum noté : 8 ind. le 18/09/94 à la corniche de Sion (G.B).

LABBE A LONGUE QUEUE, *Stercorarius longicaudus* (0)

Pas de données en 1994-95.

GRAND LABBE, *Stercorarius skua* (32)

Essentiellement observé de juillet à décembre 94 à la pointe de l'Aiguillon, à la pointe du Grouin du Cou, à St-Gilles, aux Sables d'Olonne, à l'île d'Yeu, puis de janvier à mars 95 à l'île d'Yeu et à la pointe du Grouin du Cou. Un maximum : plus de 18 le 28/12/94 sur la côte nord de l'île d'Yeu (X.H et M.-P.V).

MOUETTE MELANOCEPHALE, *Larus melanocephalus* (34)

Observée toute l'année sur tout le littoral et les marais salés.

Quelques maxima : 111 le 21/07/94 à Barbâtre (LPO Noirmoutier), 280 (maxi du passage prénup-

tial) le 27/04/95 (ONC), 110 en vol le 30/04/95 au Petit Bois (Venansault) (F.P) et 100 le 17/06/95 à la corniche de Sion-sur-l'Océan (G.B).


Reproduction de 27 à 33 couples sur les marais d'Olonne en 1995 (P.Y et M.F - ONC).

MOUETTE PYGMEE, *Larus minutus* (68)

Notée de fin août 94 à juin 95. Les stations d'épuration du littoral ont constitué les sites les plus attractifs lors des passages d'automne 94 et du printemps 95 : 270 le 26/02/95 à la Tranche (ADEV) et env. 300 le 12/03 à Luçon (S.V). D'autres maxima : env. 240 le 16/02/95 à la Belle Henriette (C.G et J.G), 250-300 le 25/03/95 et 300 le 14/04/95 à l'étang des Mattes (P.Re).

MOUETTE DE SABINE, *Larus sabini* (6)

6 données de septembre : 2 imm. le 06/09/94 à la corniche de Sion (G.B), env. 35 le 07/09/94 à la Bosse (Noirmoutier) (O.P et L.B), 2 ad. le 17/09/94 à la pointe de Grosse Terre (F.P), 5 le 17/09/94 et 1 le 25/09/94 au phare de l'Armandèche (C.B) et 40-45 ad dont 1 juv. au large de Noirmoutier (sortie en mer) le 18/09/94 (A.B).



MOUETTE RIEUSE, *Larus ridibundus* (72)

Observée toute l'année partout avec un maximum en hiver (surtout à l'intérieur).

Quelques maxima : plus de 500 le 19/11/94 Château-Guibert (S.V), plus de 1500 le 20/12/94 au communal du Poiré (C.G et J.G) et 9000 le 19/01/95 dans les marais d'Olonne (ONC).

Reproduction en 1995 :

Marais de Noirmoutier	54 cples
Marais Breton	20 cples
Marais d'Olonne	env 275 cples
Total Vendée	env 350 cples

GOELAND CENDRE, *Larus canus* (21)

Noté de juillet à fin avril aux îles d'Yeu et de Noirmoutier, aux marais d'Olonne et dans les prairies et communaux du Marais Poitevin.

Au moins 120 le 19/01/95 dans les marais d'Olonne (ONC) et 50 le 08/03/95 à Sion-sur-l'Océan (G.B).

GOELAND BRUN, *Larus fuscus* (19)

Observé toute l'année sur le littoral et en hiver dans l'intérieur.

Reproduction en 1995 :

Ile d'Yeu	qques cples
Marais d'Olonne	55 -61 cples
Total Vendée	env 70 cples

GOELAND ARGENTE, *Larus argentatus* (16)

Observé toute l'année sur le littoral et en hiver dans l'intérieur.

Reproduction en 1995 :

Marais de Noirmoutier	? cples
Ile d'Yeu	plusieurs diz. cples
Sion-sur-l'Océan	13 cples
Marais d'Olonne	375 à 397 cples
Total Vendée	env 450 cples

GOELAND LEUCOPHEE, *Larus cachinnans* (13)

Observé toute l'année sur le littoral avec deux indices de reproduction (probable à Noirmoutier (P.Re) et certain avec 16 à 17 couples sur les marais d'Olonne (P.Y et M.F - ONC)).

1ère observation de 4 ind. le 12/11/94 dans la plaine de Bretet à Coulonges (G.B).

GOELAND BOURGMESTRE, *Larus hyperboreus* (11)

1 immature le 26/01/95 à la pointe de l'Herbaudière à Noirmoutier (P.Re).

1 à 2 (1^{er} hiver) du 02/02/95 au 18/03/95 à la réserve d'Olonne (ONC et C.B).

1 (2^{ème} hiver) le 18/02/95 à Sion-s-l'Océan et 1 (1^{er} hiver) le 19/02 à Saint-Gilles (G.B).

GOELAND MARIN, *Larus marinus* (8)

Observé toute l'année le plus souvent sur le littoral du nord de la Vendée avec trois indices certains de nidification.

Reproduction en 1995 :

Marais de Noirmoutier	1 cple
Ile d'Yeu	au moins 3 cples
Marais d'Olonne	4 cples
Total Vendée	8 cples

Des maxima notés : plus de 105 le 18/10/94 sur la côte nord de l'île d'Yeu et 50 le 30/12/94 à Port Joinville (X.H et M.-P.V).

MOUETTE TRIDACTYLE, *Rissa tridactyla* (41)

Présente toute l'année sur le littoral allant de Sion-sur-l'Océan à la pointe du Payré (Jard), ainsi qu'à l'île d'Yeu.

Un indice certain de reproduction de un à deux couples à Sion-sur-l'Océan, mais les jeunes n'ont pas été vus par la suite (G.B et F.P).

Plus de 30 le 12/11/94 au phare de l'Armandèche (C.B), plus de 100 le 26/12/94 et env. 50 le 17/06/95 à Sion-s-l'Océan (G.B) et 30 le 22/01/95 aux Sables (M.Cl).

STERNE HANSEL, *Gelochelidon nilotica* (1)

3 ind. le 29/07/94 à la pointe de l'Aiguillon (P.A).

STERNE CASPIENNE, *Sterna caspia* (19)

Passage ou estivage très régulier à la pointe de l'Aiguillon et à l'estuaire du Lay du 15/08/94 au 22/09/94 concernant 1 à 3 oiseaux chaque fois. 1 ind. 07/09/94 (J.R) et 1 ad et 1 juv. le 26/09/94 dans les marais d'Olonne (ONC).

Passage de printemps à partir de fin mars 95 : 2 le 26/03/95 à la prise du Maroc (O.L), 2 le 02/04/95 à la Guittière (J.-P.P, B.T et C.B), 3 le 02/04/95 à la pointe de l'Aiguillon (X.H et M.-P.V), 1 le 06/04/95 à la réserve d'Olonne (ONC), 1 le 17/04/95 à la pointe du Payré (ADEV) et 1 le 03/05/95 à la réserve de Müllembourg (LPO Noirmoutier).

STERNE VOYAGEUSE*, *Sterna bengalensis* (1)

Sterne à bec orange.

Donnée homologuée d'un adulte le 16/09/94 au lac du Jaunay (F.P).

STERNE CAUGEK, *Sterna sandvicensis* (39)

Passage d'automne bien marqué : plus de 100 le 01/09/94 à la Paracou (G.B), plus de 300 le 13/09/94 à Sion (G.B) et plus de 100 le 17/09/94 au phare de l'Armandèche (C.B). Une station de 5 à 20 du 12/07/94 au 27/10/94 à la pointe de l'Aiguillon (Equipe de la pointe).

Hivernage de 1 à 3 ind. en décembre et en janvier du littoral allant de Sion-s-l'Océan à Jard-s-Mer.

Passage de printemps à partir du 23/03/95. Env. 74 le 09/04/95 à la pointe du Payré (S.V) et plus de 800 le 22/04/95 à Sion-s-l'Océan (G.B).

STERNE DE DOUGALL, *Sterna dougallii* (3)

2 juvéniles le 21/07/94 à la jetée de Jacobsen (LPO Noirmoutier) et 1 ind. les 03 et 08/09/94 à la pointe de l'Aiguillon pendant le suivi de la migration (C.G).

STERNE PIERREGARIN, *Sterna hirundo* (32)

Un stationnement estival de 10 à 30 ind., de juillet à fin octobre, à la pointe de l'Aiguillon. Quelques maxima du passage d'automne : plus de 50 le 05/09/94 à Sion (G.B), env. 50 le 24/09/94 à la pointe du Grouin (X.H et M.-P.V). Dernier noté le 02/11/94 à la pointe de l'Aiguillon (C.G).

Au retour de migration, la première a été notée le 06/04/95 à la réserve d'Olonne (ONC).

Reproduction en 1995 :

Müllembourg	10 cples (échec)
l'Epine	3 à 4 cples
la Brille	7 cples
la Guittière	7 cples
Bouin	?
Marais d'Olonne	6 cples
Total Vendée	23 - 24 cples

STERNE ARCTIQUE, *Sterna paradisaea* (20)

Passage d'automne : 2 ad. et 1 imm. le 09/09/94; 1 imm. du 10/09/94 au 19/09/94 dans le marais de la Vie (G.B), 1 à 6 du 13/09/94 au 24/09/94 à la Belle Henriette (ADEV, C.B X.H et M.-P.V), 3 le 16/09/94 à Sion (G.B), 4 les 16 et 17/09/94 à la queue du lac du Jaunay et 4 le 17/09/94 au port de St-Gilles (F.P), 2 les 23 et 24/09/94 et à la Tranche (ADEV et C.B) et le dernier le 15/10/94 au bassin des Chasses aux Sables (C.B).

Passage de printemps : 1 le 08/04/95 à plage de la Tranche (ADEV) et 1 le 09/04/95 à la pointe du Payré (S.V).

STERNE NAINE, *Sterna albifrons* (23)

Stationnement estival de 60 à 300 individus du 21/08/94 au 09/09/94 à la pointe de l'Aiguillon pendant le suivi de la migration (C.G). Dernière notée = le 01/10/94 à la pointe de l'Aiguillon (M.T).

Au retour, le premier oiseau a été noté le 11/05/95 à Sion (G.B) et à la réserve de Müllembourg (LPO Noirmoutier). Maximum de 50 le 19/05/95 à Sion (G.B).

Reproduction en 1995 : échec d'un couple à la Nouvelle Brille à Noirmoutier (P.Re).

GUIFETTE MOUSTAC, *Chlidonias hybridus* (13)

Passage d'automne : 2 le 27/07/94 à l'étang des Boucheries (H.B), 3 le 27/08/94 dans les marais d'Olonne (X.H et M.-P.V.), 2 le 31/08/94 à la plage de Chassenon (PNR) et 1 le 23/09/94. Encore 3 le 24/09/94 à la Tranche (ADEV).

GUIFETTE NOIRE, *Chlidonias niger* (71)

2 jeunes nourris par des adultes les 03 et 11/07/94 et les dernières le 17/07/94 à la réserve de St-Denis (ADEV).

Passage d'automne noté à partir 28/08/94 : 220 le 12/09/94 à la Belle Henriette (ADEV), env 100 le 14/09/94 à l'étang des Mattes (M.T), au moins 100 le 15/09/94 dans les marais d'Olonne (ONC), plus de 120 le 16/09/94 à l'étang des Mattes (F.P) et le dernier en plu-

mage nuptial, le 26/12/94 dans le marais de la Vie ! (G.B).

Retour d'un ind.le 05/04/95 à l'étang des Boucheries (H.B). Passage très diffus un peu partout par petits groupes : 25 le 16/05/95 à Sion (G.B).

Reproduction en 1995 : 8 - 9 couples sans jeunes à l'envol à la réserve de St-Denis (ADEV) et 10-12 cplés avec 7 jeunes à l'envol (C.G) à Champagné.

GUIFETTE LEUCOPTERE, *Chlidonias leucopterus* (2)

1 juv. le 14/09/94 (M.T) et 1 ad en plumage nuptial le 27/05/95 (P.R) à l'étang des Mattes.

GUILLEMOT DE TROÏL, *Uria aalge* (9)

Hivernant surtout à l'île d'Yeu et du littoral de St-Gilles à la pointe du Grouin du Cou. 8 ind. le 07/05/95 à Sion-s-l'Océan (G.B).

PINGOUIN TORDA, *Alca torda* (26)

Hivernant sur tout le littoral et les îles. Les 3 premiers notés le 18/10/94 à l'île d'Yeu (X.H et M.-P.V) et les deux derniers le 17/06/95 à Sion-s-l'Océan (G.B).

Quelques maxima : 6 le 06/11/94 à la Chaume (X.H et M.-P.V.), 15 le 26/12/94 à Sion (G.B), 10 le 15/04/95 à l'île d'Yeu (X.H et M.-P.V.), 20 le 16/04/95 à la pointe du Payré (S.V).

MERGULE NAIN, *Alle alle* (0)

pas de données en 1994-95.

MACAREUX MOINE, *Fratercula artica* (3)

1 mort le 22/01/95 à Sion-s-l'Océan (G.B), 1 le 02/05/95 à la pointe de St-Pierre à Noirmoutier (LPO Noirmoutier) et 5 le 18/06/95 à Sion-s-l'Océan (G.B).

PIGEON COLOMBIN, *Columba oenas* (8)

8 données dont une seule en période nuptiale aux Landes-Genusson. Vols de 5 à 100 ind. observés régulièrement à la pointe de l'Aiguillon en septembre et en octobre. 5 données d'hivernage dont 3 de plus d'une centaine d'ind. à Nalliers et à Mouzeuil en Marais Poitevin (C.G)

PIGEON RAMIER, *Columba palumbus* (23)

Abondant en toutes saisons. Des bandes de 100 à 400 en hivernage dans le bocage et sur le bord du marais Poitevin. Observation de migration à la pointe de l'Aiguillon peu importante par rapport à celle de *Columba oenas*.

TOURTERELLE TURQUE, *Streptopelia decaocto* (12)

Très abondante en toutes saisons.

TOURTERELLE DES BOIS, *Streptopelia turtur* (30)

Assez bien répartie dans tout le département. Les dernières observées le 04/10/94 à Saint-Denis-du-Payré (ADEV sud Vendée), les premières le 15/04/95 à l'île d'Yeu (X.H et M.-P.V.).

COUCOU GRIS, *Cuculus canorus* (33)

Chanteurs observés dans tout le département d'avril à juin. 3 données d'oiseaux en plumage roux. Dernier oiseau observé : le 18/09/94 à Moutiers-sur-le-Lay (S.V); premier chant signalé : le 01/04/95 à Dompierre-sur-Yon (S.C).

EFFRAYE DES CLOCHERS, *Tyto alba* (14)

Signalée surtout dans le bocage en toutes saisons.

PETIT-DUC SCOPS, *Otus scops* (0)

Pas de données transmises au fichier.

Bien que connu nicheur à Noirmoutier.

CHEVECHE D'ATHENA, *Athene noctua* (10)

Comme les années précédentes, presque toutes les données proviennent du marais Breton ou du marais Poitevin. Deux données seulement dans le bocage : 25/10/94 à Commequiers (M.C) et 02/04/95 à Dompierre-sur-Yon (S.C).

CHOUETTE HULOTTE, *Strix aluco* (4)

Bien peu de données pour un rapace nocturne qui n'est pourtant pas très rare en Vendée. Les 4 données proviennent du bocage (Forêt de Mervent-Vouvant, Rocheservière, Moutiers-sur-le-Lay).

HIBOU MOYEN-DUC, *Asio otus* (31)

Signalé en toutes saisons un peu partout dans le département. 3 oiseaux tués sur la route en mars et en avril à Mouzeuil (J.-C.L.). Des jeunes sont signalés le 19/05/95 à Olonne (F.P), le 13/06/95 à Bouin et à Beauvoir (P.Re), le 24/06/95 dans les marais de la Vie (G.B).

HIBOU DES MARAIS, *Asio flammeus* (22)

Observé en hivernage dans le marais Poitevin et le marais Breton, de septembre à janvier. Un indice de nidification certaine le 10/06/95 à Bouin (P.Re) et quatre indices de nidification possible du 30/04/95 au 08/05/95 dans le marais Breton (P.Re).

ENGOLEVENT D'EUROPE, *Caprimulgus europaeus* (8)

Les données proviennent de la forêt de Mervent-Vouvant, de Faymoreau, Soullans, Longeville et Saint-Hilaire-de-Riez. Elles s'étaient du 01/07/94 au 14/08/94. 8 mâles chanteurs le 10/07/94 et 7 le 29/07/94 en forêt de Mervent (D.B).

MARTINET NOIR, *Apus apus* (27)

Les observations ont été faites dans tout le département. Les indices de nidification vont de mai à la mi-juillet. La plupart des martinets ont quitté la Vendée le 28/07/94, quelques migrants sont observés en août et en septembre. Le dernier est signalé le 01/11/94 à la pointe de l'Aiguillon (C.G).

Les premiers martinets sont observés le même jour, 12/04/95 à Noirmoutier (P.Re) et à Luçon (S.V). En période froide et humide, on a observé de grandes concentrations de martinets au-dessus des plans d'eau comme l'étang des Mattes où 300 à 400 sont rassemblés le 25/05/95 (P.Re).

MARTIN PECHEUR D'EUROPE, *Alcedo atthis* (40)

La quasi disparition de l'espèce après les hivers rigoureux de 1985 à 87 a incité les ornithologues à transmettre leurs observations qui proviennent non seulement des marais Poitevin et Breton, mais aussi des rivières et des plans d'eau du bocage. Un indice certain de nidification le 10/07/94 à l'étang du Marillet (J.D) et un autre le 30/05/95 au Girouard (F.P).

GUEPIER D'EUROPE, *Merops apiaster* (0)

Pas d'observation en 94-95.

HUPPE FASCIEE, *Upupa epops* (39)

Les données proviennent surtout du bocage et de la plaine où l'espèce n'est pas rare. Quelques-unes viennent de Noirmoutier et de la région de Saint-Gilles. En 1994, la dernière observation date du 5 octobre à Dompierre-sur-Yon (S.C) et la première du 21 mars 95 à Pouzauges (M.R). On note des indices de nidification en mai à Givrand et en juin au Poiré-sur-Vie et à la Roche-sur-Yon.

TORCOL FOURMIER, *Jynx torquilla* (5)

Cette espèce rare dans notre région n'est guère observée qu'à la migration postnuptiale le 30/08/94 à Jard-sur-Mer (F.S) et à Givrand (G.B), le 02/09/94 à la pointe de l'Aiguillon (C.G), le 18/10/94 à l'île d'Yeu (X.H et M.-P.V.).

En 1995, une seule donnée au printemps le 09/05/95 à Notre-Dame-de-Monts (P.R).

PIG CENDRE, *Picus canus* (1)

Une seule donnée de cet oiseau exceptionnel en Vendée. Le 12/07/94 une femelle est observée à Sainte-Christine dans le marais Poitevin (P.R).

PIG VERT, *Picus viridis* (12)

Cet oiseau relativement commun est répandu dans tout le département en toutes saisons.

PIG NOIR, *Dryocopus martius* (0)

Pas d'observations en 94-95.

Contrairement à 1993 et 94 où il était observé en forêt de Mervent.

PIG EPEICHE, *Dendrocopos major* (6)

Les données proviennent pour la plupart du bocage où l'espèce est observée en toutes saisons.

Une donnée provient de la réserve de Nalliers-Mouzeuil dans la partie mouillée du marais Poitevin où deux couples au moins sont nichés.

PIG EPEICHETTE, *Dendrocopos minor* (4)

4 données seulement pour ce petit pic qui, bien que discret, n'est pas rare. Il a été observé le 31/07/94 à Rocheservière (L.G), le 26/02/95 à Givrand (G.B) et le 14/05/95 aux Moutiers-sur-le-Lay (S.V).

PIG MAR, *Dendrocopos medius* (1)

Une seule donnée de ce pic rare en Vendée. Elle provient de Puy-de-Serre le 26/03/95 (G.B).

ALOUETTE CALANDRELLE, *Calandrella brachydactyla* (5)

Les cinq données proviennent des dunes côtières qui s'étendent de la Tranche-sur-mer à la pointe de l'Aiguillon où l'espèce se reproduit régulièrement. Il serait intéressant de la rechercher sur tout le littoral. Les observations sont de G.-L.C, P.A et F.P.

COCHEVIS HUPPE, *Galerida cristata* (11)

La plupart des observations sont faites sur le littoral et dans la plaine calcaire où l'espèce est commune toute l'année (C.G, G.B, D.B, S.D, J.-C.L.). Une seule donnée provient des Moutiers-sur-le-Lay (S.V), à la limite du bocage et de la plaine.

On trouve rarement le Cochevis huppé dans le bocage.

ALOUETTE LULU, *Lullula arborea* (14)

L'espèce est relativement rare sauf en certains secteurs du littoral et du bocage. Elle est signalée en automne et en hiver à Chassenon (G.B), Rocheservière (L.G), et Moutiers-sur-le-Lay (S.V).

On l'observe parfois en migration postnuptiale à la pointe de l'Aiguillon où quelques individus se mêlent à des passereaux d'autres espèces.

ALOUETTE DES CHAMPS, *Alauda arvensis* (15)

Elle est notée en hivernage dans tout le département, parfois en bandes de plus de 100 ind. Elle se reproduit un peu partout mais à part

dans la réserve de Saint-Denis-du-Payré où les nicheurs sont abondants (ADEV sud Vendée), les mâles chanteurs semblent chaque année moins nombreux.

Elle est observée en migration postnuptiale en bandes importantes de 10 à 100 ind. à l'île d'Yeu et à la pointe de l'Aiguillon, du 15 octobre à la fin novembre.

ALOUETTE HAUSSECOL, *Eremophila alpestris* (1)

Une observation d'un oiseau en hivernage le 28/12/94 à la Frandière par l'équipe de la LPO Noirmoutier.

HIRONDELLE DE RIVAGE, *Riparia riparia* (32)

L'espèce n'est pas nicheuse en Vendée, on ne l'observe qu'en migration. Les premières migratrices arrivent dès la fin de juillet en baie de l'Aiguillon. Plus de 100 individus sont observés le 28/07/94 à la prise du Maroc (D.B) et 6 à 800 le lendemain à Saint-Denis-du-Payré (P.A). Le passage continue jusqu'à la fin de septembre et certains matins des vols de plusieurs milliers d'oiseaux se posent sur la plage de la pointe de l'Aiguillon avant de partir vers le sud.

La migration pré-nuptiale commence généralement au début de mars. En 1995, les premières hirondelles de rivage sont signalées plus tardivement que d'habitude : le 16/03/95 à Rocheservière (L.G).

HIRONDELLE RUSTIQUE, *Hirundo rustica* (50)

L'espèce est observée dans tout le département avec une plus grande fréquence autour des exploitations agricoles à vocation d'élevage où elle niche dans les étables anciennes et les conduits de cheminée. Elle est relativement rare en ville.

La migration postnuptiale commence début septembre. A la pointe de l'Aiguillon, 74 % de l'effectif total des Hirondelles rustiques migrent du 1^{er} au 30 septembre 1994. On observe encore des rustiques en octobre et même en novembre. Les dernières ont été observées à la pointe de l'Aiguillon le 13/11/94.

Après l'hivernage, les premières reviennent dès le début de mars. En 1995, la 1^{ère} a été signalée le 11/03/95 à Chaillé-sous-les-Ormeaux (F.P).

HIRONDELLE DE FENETRE, *Delichon urbica* (14)

L'espèce est observée dans tout le département, elle niche peu dans les fermes isolées mais plutôt en colonies sous les toits des maisons des agglomérations. Les colonies les plus importantes sont signalées dans les villes côtières comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie en bordure de la plage de Boisvinet (G.B).

La migration postnuptiale a lieu de mi-septembre à mi-octobre. A la pointe de l'Aiguillon, les hirondelles de fenêtré sont la plupart du temps mélangées aux Hirondelles rustiques.

Après l'hivernage, les premiers retours sont observés le 29/03/95 au barrage de Mervent (J.D).

PIPIT DE RICHARD*, *Anthus richardi* (4)

Un ind. du 28/09/94 dans les marais d'Olonne (D.D), 1 du 20 au 25/10/94 à la Paracou (D.D, P-P.E et F.P) et une observation printanière le 17/04/95 à l'aérodrome de l'île d'Yeu (X.H et M.-P.V).

Ces données sont homologuées par le CHN.

PIPIT ROUSSELINE, *Anthus campestris* (9)

La migration postnuptiale commence à la fin d'août : le 30/08/94 à Givrand (G.B) et à la pointe de l'Aiguillon (C.G) et se termine fin septembre. Le dernier a été observé le 26/09/94 à la pointe de l'Aiguillon (C.G).

Au printemps, le 1^{er} oiseau a été noté le 15/04/95 à la pointe de l'Aiguillon (G.-L.C).

En période de reproduction les observations ont lieu sur les dunes littorales dans les sections de l'Aiguillon, de Longeville, de Givrand et de Notre-Dame-de-Monts, d'avril à juin 1995 (G.-L.C, A.G, G.B, P.Re).

PIPIT DES ARBRES, *Anthus trivialis* (8)

En migration postnuptiale, les premières observations ont lieu dès la fin d'août. Au printemps, le premier oiseau est signalé le 12 avril à Mervent (J.D).

En période de reproduction, les observations sont faites à proximité des massifs forestiers : le 15 et 29/04/95 à Chassenon-le-bourg où 11 couples sont cantonnés (G.B), le 12/04/95 en forêt de Mervent (J.D), le 14/05/95 à Givrand (G.B), le 03/07/94 en forêt d'Aizenay (A.G).

PIPIT FARLOUSE, *Anthus pratensis* (21)

Les premiers migrateurs d'automne sont observés à partir du 01/10/94 à Mouzeuil-Saint-Martin (J.-C.L.) et à la pointe de l'Aiguillon (M.T), la migration s'arrête vers la mi-novembre (équipe de la pointe de l'Aiguillon).

Beaucoup de Pipits farlouses hivernent en Vendée, en bandes nombreuses. Ils se regroupent en dortoirs de plusieurs centaines d'individus dans des prairies isolées (J.-C.L.).

Au printemps, des migrateurs sont encore observés en avril (20/04/95 à Mouzeuil - J.-C.L.).

Les données de mâles chanteurs indiquent que l'espèce niche à l'île d'Yeu (les 15 et 18/04/95 (X.H et M.-P.V)), le 15/04/95 à la

pointe de l'Aiguillon (G.-L.C), au marais du Pisot le 20/04/95 (G.B).

PIPIT MARITIME, *Anthus petrosus* (6)

En migration postnuptiale et en hivernage, des observations sont notées le 29/07/94 à la pointe de l'Aiguillon (P.A), le 19/10/94 au lac de Maché (F.P) et les 20/12/94 et 01/01/95 à l'île d'Yeu (X.H et M.-P.V.).

C'est seulement à l'île d'Yeu que sont observés sur la côte rocheuse de nombreux mâles chanteurs en avril 1995 (X.H et M.-P.V.).

PIPIT SPIONCELLE, *Anthus spinoletta* (17)

On ne l'observe qu'en hivernage à partir de septembre, autour des lacs du bocage (Etangs des Boucheries, lac d'Apremont, lac de Chassenon), dans les marais de Beauvoir et les marais de la Vie.

BERGERONNETTE PRINTANIERE, *Motacilla flava* (31)

La migration postnuptiale débute dès le 20/08/94 à la pointe de l'Aiguillon (G.-L.C). Au début de septembre, on observe des vols parfois très importants de plus de 100 individus. La migration s'arrête au début d'octobre (équipe de la pointe de l'Aiguillon).

La migration pré-nuptiale débute dans les premiers jours d'avril. Première observation de 1995 : le 05/04/95 au sud de Beauvoir-sur-Mer (P.Re).

Elle niche communément en Marais Breton, en Marais Poitevin et dans la plaine calcaire (Mouzeuil et Saint-Hilaire-des-Loges).

BERGERONNETTE FLAVEOLE, *Motacilla flavissima* (5)

Deux données de groupes d'une centaine d'individus chacun en migration postnuptiale le 29/08/94 et le 03/09/94 dans les marais de la Vie (G.B), deux individus à la prise du Maroc (Baie de l'Aiguillon) (D.B), un individu le 25/09/94 au marais d'Olonne (C.B), 5 en migration pré-nuptiale le 13/04/95 dans le marais de la Vie (G.B) et 1 ind. le 15/04/95 à la station d'épuration de Luçon (S.V).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX, *Motacilla cinerea* (15)

Plusieurs données en période d'hivernage sur la côte et les étangs du bocage. A la pointe de l'Aiguillon, on observe en octobre quelques migratrices isolées ou en groupes de 2 à 5 individus.

Une dizaine de données en période de nidification dans le bocage et le Marais Poitevin.

BERGERONNETTE GRISE, *Motacilla alba* (26)

Elle est observée en toutes saisons dans tout le département. Elle niche fréquemment dans les fermes à vocation d'élevage sous les tuiles ou dans les trous des vieux murs.

A la pointe de l'Aiguillon, on peut observer de nombreuses bergeronnettes en migration postnuptiale, en octobre et en novembre, en groupes variant de 3 à 100 individus. Des passages de 500 bergeronnettes ont été notés les 10 et 11 novembre 1994 (équipe de la pointe de l'Aiguillon).

BERGERONNETTE DE YARRELL, *Motacilla alba yarrelli* (11)

Les données concernent des oiseaux hivernant en de nombreux points du département.

La première bergeronnette a été observée le 29/09/94 à la Tranche-sur-Mer (ADEV sud Vendée) et la dernière le 18/02/95 à la station d'épuration de la Tranche (S.V).

TROGLODYTE MIGNON, *Troglodytes troglodytes* (17)

Commun dans tout le département, où il est nicheur.

ACCENTEUR MOUCHET, *Prunella modularis* (25)

Par son chant mélodieux, on peut le repérer en toutes saisons. Les données proviennent du bocage, de l'île d'Yeu (X.H et M.-P.V), de Noirmoutier, du Marais Breton, de la plaine (de nombreux chants en janvier à Mouzeuil (J.-C.L.)).

ROUGEGORGE FAMILIER, *Erithacus rubecula* (20)

C'est un des oiseaux les plus communs. On n'observe en général qu'un individu à la fois. Nous avons des données en toutes saisons mais la discrétion des nicheurs fait qu'il y a peu de données de reproduction : Forêt de Mervent (D.B), Rocheservière (L.G), Domaine de Beauvoir (B.P et A.S).

Dès le mois de septembre, des migrateurs venus du nord et de l'est grossissent les populations vendéennes. Le 27/09/94, à Sion-sur-l'Océan, 40 Rougegorges sont observés ! (G.B).

ROSSIGNOL PHILOMELE, *Luscinia megarhynchos* (25)

Ici encore la discrétion des nicheurs fait que nous n'avons qu'un seul indice de nidification possible en mai dans le marais de la Vie. Pourtant le rossignol est commun.

De nombreuses données de chants proviennent de tout le département avec un maximum dans le bocage : 20 mâles chanteurs le 11/04/95 aux Moutiers-sur-le-Lay (S.V). Le dernier chant a été entendu le 24/08/94 dans le marais de la Vie (G.B) et le premier le 04/04/95 à Mouzeuil (J.-C.L.).

GORGEBLEUE A MIROIR BLANC, *Luscinia svecica* (24)

23 données proviennent des marais Breton et Poitevin où les indices de nidification sont nombreux.

Une donnée montre qu'on peut aussi la rencontrer dans la plaine, avec un indice certain de nidification à Mouzeuil (J.-C.L.).

Nous n'avons aucune donnée d'hivernage. Le dernier oiseau a été observé le 24/09/94 à la Belle Henriette (X.H et M.-P.V.) et le premier le 14/03/95 à Noirmoutier, polder de Sébastopol (LPO Noirmoutier).

ROUGEQUEUE NOIR, *Phoenicurus ochruros* (25)

Cet oiseau est présent en Vendée toute l'année avec seulement un petit nombre d'hivernants, surtout sur les côtes.

On observe de nombreux migrateurs en octobre à l'île d'Yeu : plus de 50 le 19/10/94 (X.H et M.-P.V.) et à la pointe de l'Aiguillon. Dès le début de mars, des oiseaux sont fréquemment observés dans le bocage comme à Treize-Vents le 09/03/95 (S.C.).

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC, *Phoenicurus phoenicurus* (17)

Un seul indice certain de nidification en forêt de Mervent le 28/05/95 (D.B.). 2 observations printanières, l'une à l'île d'Yeu le 02/05/95 (X.H et M.-P.V.), l'autre à la Dive le 17/06/95 (C.G.).

Toutes les autres données concernent des oiseaux en migration postnuptiale et en plumage d'hiver, à partir de la mi-août.

TARIER DES PRES, *Saxicola rubetra* (11)

Un seul indice de nidification possible le 23/05/95 à la Pointe du Devin (P.Re) malgré la présence de 3 couples le 01/06/95 à la réserve de St-Denis (ADEV sud Vendée).

A part ces deux observations en période de reproduction, les autres données concernent des oiseaux en migration postnuptiale. La première est du 18/08/94 à Jard-sur-Mer (F.S) et la dernière du 03/11/94 à la pointe de l'Aiguillon (C.G.).

TARIER PATRE, *Saxicola torquata* (28)

Présence de quelques individus notée toute l'année avec plusieurs indices de reproduction de mars à juillet.

Les observations sont plus nombreuses en Marais Poitevin et en Marais Breton avec 15 couples nicheurs dans les marais de la Vie (G.B). Cependant plusieurs familles sont signalées au Poiré-sur-Vie (A.G.).

TRAQUET MOTTEUX, *Oenanthe oenanthe* (38)

Malgré la présence de nombreux couples et


de mâles chanteurs en avril à l'île d'Yeu, aucune reproduction n'a été mentionnée.

Les premiers oiseaux en migration postnuptiale sont signalés le 22/03/95 à Sion-sur-l'Océan (G.B) et les derniers le 30/04/95 à France (Mouzeuil) (J.-C.L.).

MERLE A PLASTRON, *Turdus torquatus* (8)

Les 3 observations de migration postnuptiale s'étalent du 09/10/94 à Morigq (ADEV sud Vendée) au 11/11/94 à la pointe de l'Aiguillon (C.G. et J.G.).

Les données de migration de printemps sont plus nombreuses, la 1^{ère} date du 01/04/95 à Angles (ADEV sud Vendée) et la dernière du 18/04/95 à la bergerie de l'île d'Yeu (X.H et M.-P.V.).

**MERLE NOIR, *Turdus merula*** (22)

Le Merle noir est commun dans tout le département et en toutes saisons. Des chants sont signalés le 30/01/95 à Mouzeuil (J.-C.L) et un nid en construction observé le 27/02/95 dans la réserve de Mouzeuil-Nalliers (C.G.).

Un certain nombre de Merles noirs sont observés chaque année à la pointe de l'Aiguillon en migration postnuptiale. Ils partent isolés, en petits groupes de 2 ou 3 ou mélangés à des grives.

GRIVE LITORNE, *Turdus pilaris* (37)

Elle n'est présente qu'en hivernage. La 1^{ère} donnée est du 06/11/94 à Jard-sur-Mer (X.H et M.-P.V) et la dernière du 13/04/95 à Dompierre-sur-Yon (S.C.).

Des bandes importantes sont parfois observées dans les prairies, dans les vergers de pommiers, ou en vol : 130 le 02/01/95 à Moutiers-sur-le Lay (S.V), 210 le 30/03/95 à Dompierre-sur-Yon (S.C.).

GRIVE MUSICIENNE, *Turdus philomelos* (42)

On l'observe en toutes saisons dans le département. Les premiers chants se font enten-

dre dès le mois de janvier par beau temps (le 30/01/95 à Mouzeuil - J.-C.L.).

En hiver les populations sont augmentées des oiseaux d'Europe du nord et de l'est. Les oiseaux en migration postnuptiale sont observés à la pointe de l'Aiguillon de la mi-octobre à la mi-novembre. Ils se déplacent souvent à très haute altitude en bandes d'importance variable de 5 à 50 individus, souvent mélangés à d'autres espèces de turridés.

GRIVE MAUVIS, *Turdus iliacus* (35)

Les seules données sont des données d'hivernage. Les premières Grives mauvis sont observées le 18/10/94 à l'île d'Yeu (X.H et M.-P.V) et les dernières le 19/03/95 à Dompierre-s-Yon (S.C) et à l'étang des Boucheries (L.G.).

GRIVE DRAINE, *Turdus viscivorus* (28)

La Grive draine est présente en Vendée toute l'année, nous avons des données de reproduction de mars à juin.

A la pointe de l'Aiguillon, en octobre et en novembre, on observe quelques Grives drainées en migration postnuptiale, elles se déplacent alors en petits groupes d'une dizaine d'individus souvent mélangés à d'autres turridés.

BOUSCARLE DE CETTI, *Cettia cetti* (39)

La Bouscarle est signalée en Vendée toute l'année généralement en petit nombre, dans les marais côtiers et aussi dans le bocage où elle peut être observée au bord des cours d'eau et des étangs.

Plusieurs chanteurs sont parfois entendus au même endroit : le 28/10/94 et le 02/11/94, 7 à 8 chanteurs aux Moutiers-sur-le-Lay (S.V), le 14/04/95, de nombreux chanteurs à l'île d'Yeu (X.H et M.-P.V.).

CISTICOLE DES JONCS, *Cisticola juncidis* (31)

Après avoir été décimée par les hivers rigoureux de 1985 à 1987, l'espèce est observée à nouveau en Marais Breton et Poitevin : 6 chanteurs le 06/07/94 à la Belle Henriette (G.-L.C), de nombreux chanteurs le 28/08/94 à la pointe de l'Aiguillon (X.H et M.-P.V), 3-4 couples nicheurs le 15/04/95 dans les marais de la Vie (G.B.).

PHRAGMITE AQUATIQUE, *Acrocephalus paludicola* (1)

Un juvénile a été observé le 02/09/94 dans les marais de la Vie (G.B.).

PHRAGMITE DES JONCS, *Acrocephalus schoenobaenus* (9)

Plusieurs indices de reproduction sont donnés dans les marais de la Vie et à la réserve de

Saint-Denis-du-Payré. Les derniers oiseaux en migration postnuptiale sont signalés le 01/10/94 et le premier chant d'un migrateur printanier est entendu le 01/04/95 à la réserve des Boucheries (L.G.).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE, *Acrocephalus palustris* (1)

1 chant signalé le 23/04/95 à Angles (ADEV sud Vendée).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, *Acrocephalus scirpaceus* (17)

La Rousserolle effarvate est beaucoup plus commune que le Phragmite des joncs, on entend son chant dans les roselières, les fossés des Marais Breton et Poitevin et des étangs du bocage.

Le dernier oiseau est signalé le 23/10/94 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (M.C) et les premiers chanteurs le 15/04/95 à la Belle Henriette (G.-L.C.).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE, *Acrocephalus arundinaceus* (5)

3 données proviennent de la Grande Herse d'Orouet avec des chants le 20/04/95, 22/05/95 et 06/06/95 (G.B.).

HYPOLAIS ICTERINE, *Hippolais icterina* (0)

Pas de données en 1994-95.

HYPOLAIS POLYGLOTTE, *Hippolais polyglotta* (9)

On la trouve de juillet à août 1994 et d'avril à juin 1995 dans les secteurs où il y a des buissons, en bordure des marais et dans le bocage. Elle niche en mai et en juin. Son chant aux strophes rapides et ses alarmes bruyantes la font repérer facilement.

Le dernier oiseau est observé le 09/08/94 au Poiré-sur-Vie (A.G) et au printemps, le premier est signalé le 29/04/95 au bois de la Vergne (G.B.).

FAUVETTE PITCHOU, *Sylvia undata* (5)

Les 5 données proviennent de l'île d'Yeu en octobre 1994 et en avril 1995. Plusieurs fois, elle a été soupçonnée dans les sudes de la pointe de l'Aiguillon sans que sa présence ne soit jamais confirmée.

FAUVETTE GRISETTE, *Sylvia communis* (11)

On la trouve d'avril à septembre dans les buissons du bocage mais aussi dans la végétation épaisse qui borde les marais où elle niche.

La dernière grisette de l'année est observée le 09/10/94 à Longeville (ADEV sud Vendée) et le premier mâle chanteur est signalé le 02/04/95 à la Guittière (C.B.).

FAUVETTE DES JARDINS, *Sylvia borin* (9)

Elle est généralement présente en Vendée d'avril à septembre dans de nombreux espaces boisés du bocage et des marais.

La dernière Fauvette des jardins est observée le 25/09/94 au Girouard (C.B) et le 1^{er} chant signalé le 23/04/95 à Mouzeuil (J.-C.L.).

FAUVETTE A TETE NOIRE, *Sylvia atricapilla* (24)

C'est de loin la fauvette la plus commune. En outre le chant éclatant du mâle le signale dans tous les espaces boisés du département de mars à septembre.

Quelques oiseaux hivernent en Vendée où le manque d'insectes est pallié par des baies. Un chant hivernal est signalé le 17/02/95 à Mouzeuil (J.-C.L.).

La migration pré-nuptiale a lieu à partir du début d'avril, on note dès le 15 avril de nombreux chants à l'île d'Yeu (X.H et M.-P.V.).

POUILLOT A GRANDS SOURCILS*, *Phylloscopus inornatus* (8)

7 données de la mare des Agaures : 1 ind. du 15/10/94 (P.Y) et du 02 au 04 (D.D et al.) et du 13 au 19/11/94 (D.D, P.Y, C.B, P.R et al.). 1 le 16/10/94 au bois de la Chaise à Noirmoutier (J.-F.D.).

Toutes sont acceptées par le CHN.

POUILLOT DE BONELLI, *Phylloscopus bonelli* (2)

Une donnée (probable) du 15/10/94 à Mouzeuil (J.-C.L) et une autre de juillet 94 en forêt de Mervent.

POUILLOT BRUN*, *Phylloscopus fuscatus* (1)

Oiseau de l'Asie centrale et septentrionale. Première donnée vendéenne d'un ind. le 13/11/94 aux Agaures (P.Y). Donnée homologuée par le CHN.

POUILLOT SIFFLEUR, *Phylloscopus sibilatrix* (2)

Une donnée du 29/04/95 en forêt de Mervent (J.D) et une autre du 20/05/95 à Chambrette aux Landes-Genusson (F.P) font penser que l'espèce se reproduit encore en Vendée.

POUILLOT VELOCE, *Phylloscopus collybita* (23)

L'espèce est présente toute l'année en Vendée mais assez peu d'oiseaux sont observés en hivernage. Une exception : 20-30 pouillots sont signalés le 30/01/95 à la digue des Prises (C.G).

Un pouillot de type *abietinus* est observé le 13/11/94 près du Gois (A.B).

POUILLOT FITIS, *Phylloscopus trochilus* (22)

Aucun indice de reproduction n'est signalé en Vendée. La migration postnuptiale se dé-

roule d'août à octobre. Le 1^{er} migrateur est observé le 13/08/94 à Saligny (A.G) et le dernier le 21/10/94 à l'île d'Yeu (X.H et M.-P.V.).

La migration pré-nuptiale a lieu de mars à mai. Le 1^{er} chanteur est signalé le 13/03/95 à Beautour (B.P et A.S) et le dernier le 03/05/95 à Mouzeuil (J.-C.L.).

ROITELET HUPPE, *Regulus regulus* (14)

La plupart des données sont hivernales, d'octobre à mars. On note très peu d'observations en dehors de cette période : deux données en avril à Rocheservière (L.G) et une à Longeville. Aucun indice de reproduction n'est signalé.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU, *Regulus ignicapillus* (11)


Il est signalé en toutes saisons dans tout le département avec un indice de reproduction possible à Givrand.

GOBEMOUCHE GRIS, *Muscicapa striata* (38)

Il est présent en Vendée de mai à septembre, c'est un nicheur assez commun dans notre département. Les derniers partent hiverner en Afrique tropicale à la fin de septembre. Les 1ers chants - rudimentaires - sont toujours entendus au début de mai (le 01/05/95 à Rocheservière (L.G).

GOBEMOUCHE NAIN*, *Ficedula parva* (2)

2 données d'un ind. les 09 et 10/12/94 au Poiré-sur-Velluire (J.G). Données homologuées par le CHN.

**GOBEMOUCHE NOIR, *Ficedula hypoleuca* (19)**

Les données concernent des oiseaux en migration postnuptiale, de juillet à septembre, période au cours de laquelle ils sont parfois nombreux (plus de 20 le 30/08/94 à Givrand (G.B) et env. 20 au Poiré-sur-Velluire (D.B).

Le 1^{er} migrateur est observé le 30/07 à Rocheservière (L.G) et le dernier le 26/09/94 aux Landes-Genusson (L.G).

PANURE A MOUSTACHES, *Panurus biarmicus* (4)

Les panures sont observées dans les grandes roselières des Marais Breton et Poitevin : 3 ind. le 15/08 à Port-la-Roche (F.P), un groupe important le 29/09/94 au même endroit (M.T), 2 ind. le 05/11/94 à la Belle Henriette (P.R), puis une femelle et 6 juvéniles le 26/06/95 à la Grande Herse d'Orouet (G.B).

MESANGE A LONGUE QUEUE, *Aegithalos caudatus* (12)

La Mésange à longue queue est un oiseau relativement commun en Vendée, présent en toutes saisons.

Quelques indices de reproduction.

MESANGE NONNETTE, *Parus palustris* (5)

Pas très fréquente, elle est signalée en hiver et en période de reproduction. Un couple nicheur est observé le 29/04/95 près de Saint-Hilaire-des-Loges (G.B).

MESANGE HUPPEE, *Parus cristatus* (4)

Elle est commune dans les bois de conifères. On peut l'observer en toutes saisons en Vendée. Un couple nicheur est observé le 15/07/94 dans la forêt côtière, à la Terrière (J.G).

MESANGE NOIRE, *Parus ater* (13)

Elle n'a été observée que d'octobre à mars. Aucun d'indice de reproduction n'a été signalé en 1995.

MESANGE BLEUE, *Parus caeruleus* (19)

C'est un oiseau très commun en toutes saisons, un peu plus abondant en hiver. A partir d'avril de nombreux indices de reproduction sont signalés.

MESANGE CHARBONNIERE, *Parus major* (14)

Encore un oiseau très commun en toutes saisons, un peu plus abondant en hiver.

SITTELE TORCHEPOT, *Sitta europaea* (5)

Elle est commune localement en toutes saisons dans les massifs forestiers ou les parcs plantés de grands chênes : forêt de Mervent,

Parc Soubise, parc des Oudairies à la Roche-sur-Yon, (S.C).

GRIMPEREAU DES JARDINS, *Certhia brachydactyla* (7)

Relativement commun en toutes saisons dans les mêmes endroits que la Sittelle torchepot : forêt de Mervent, Parc Soubise, les Oudairies à la Roche-sur-Yon, Beautour, Rocheservière, réserve de Nalliers-Mouzeuil.

REMIZ PENDULINE, *Remiz pendulinus* (1)

1 observation de 3 oiseaux le 08/10/94 à Longeville (ADEV sud Vendée).

LORIOU D'EUROPE, *Oriolus oriolus* (26)

Dans tous les espaces boisés plantés de grands arbres retentit le chant clair du mâle de fin avril à fin août. Nous notons plusieurs indices de reproduction. Le dernier chant est signalé le 31/08/94 à Sainte-Flaive-des-Loups (M.C) et le 1^{er} le 29/04/95 en forêt de Mervent (J.D).

PIE-GRICHE ECORCHEUR, *Lanius collurio* (21)

Les données proviennent essentiellement du sud et de l'est du département. On note plusieurs indices de reproduction : à la Dive le 09/07/94 (P.A), à Bazoges-en-Pareds le 23/07/94 (P.G). La Pie-grièche écorcheur est observée généralement en Vendée de la mi-mai à la fin d'août. On note une observation tardive le 09/10/94 à Longeville (ADEV sud Vendée), la première donnée de l'année est du 15/05/95 sur la commune de Saint-Vincent-Puy-Maufrait (L.G).

PIE-GRICHE A TETE ROUSSE, *Lanius senator* (5)

Les données dont 4 sont de mai 1995 et une de juillet proviennent du sud du département, sauf celle de Mouchamps le 25/05/95 (T.Y), nicheuse certaine au Parc Soubise avec au moins un jeune à l'envol.

Aucun indice de reproduction n'a été signalé.

GEAI DES CHENES, *Garrulus glandarius* (14)

Bien que commun dans tout le département, la plupart des données proviennent de la région de la Roche-sur-Yon (S.C) et de Mouzeuil (C.G et J.-C.L.).

PIE BAVARDE, *Pica pica* (13)

Très commune en toutes saisons dans tout le département.

CHOUCAS DES TOURS, *Corvus monedula* (18)

Très commun en toutes saisons dans toutes les agglomérations du département. Quelques individus sont observés en migration postnuptiale en octobre à la pointe de l'Aiguillon.

CHOUCAS DE DAOURIE*, *Corvus dauricus* (1)

La première mention en France a été acceptée par le CHN et inscrite en catégorie A de la liste des oiseaux de France par la commission de l'Avifaune Française.

Originaire d'Orient ; sa zone de reproduction s'étend du sud de la Sibérie (région du lac Baïkal), à la Mongolie, à l'ouest et au nord de la Chine. Son aire d'hivernage s'étend du sud de la Chine à la Corée et au Japon. Les mentions pour le reste de l'Europe sont d'ailleurs fort rares puisque trois seulement ont été rapportés, dont une antérieure à ce siècle : 1 individu tué le 01/05/1883 en Finlande, 1 adulte du 26 au 28/04/1985 observé en Suède et un autre observé le 01/05/95, du 04/ au 06/05/95, puis du 13 au 15/05/95 aux Pays-Bas.

Il a été observé en compagnie de 2 Choucas des tours le 22 juin 1995 au lieu-dit « les Douins » sur l'île de Noirmoutier par Michel FOUQUET (technicien de l'ONC) lors du recensement des oiseaux aquatiques. (M.Fouquet - *Ornithos* 1996, volume 3, n°3, p.145).

CORBEAU FREUX, *Corvus frugilegus* (17)

Le Corbeau freux est beaucoup moins commun que les autres corvidés dans notre département. Quelques corbeautières sont signalées à Bois-de-Céné, dans les marais de la Vie, aux Boucheries (Landes-Genusson), au Poiré-sur-Velluire et à Mouzeuil-St-Martin.

CORNEILLE NOIRE, *Corvus corone corone* (1)


Commune en toutes saisons dans tout le département.

CORNEILLE MANTELEE, *Corvus corone cornix* (1)

Une observation le 30/05/95 dans le Marais Breton (O.G.).

ETOURNEAU SANSONNET, *Sturnus vulgaris* (17)

Oiseau très commun en toutes saisons dans le département. D'immenses bandes d'hivernants sont signalées à partir de novembre : 3000 le 19/11/94 à Château-Guibert (S.V), 10000 le 19/11/94 au Parc Soubise (T.Y). Peu d'étourneaux sont observés en hivernage à l'île d'Yeu, mais les nicheurs y sont communs (X.H et M.-P.V.).

**MOINEAU DOMESTIQUE, *Passer domesticus* (11)**

Très commun en toutes saisons dans tout le département.

MOINEAU FRIQUET, *Passer montanus* (11)

Relativement rare sauf sur certains sites bien localisés comme la réserve des Boucheries (L.G.).

Une observation à la Roche-sur-Yon, au parc des Oudairies (S.C) et une à Chasnais (S.V).

MOINEAU SOULCIE, *Petronia petronia* (0)

Pas de données en 1994-95.

PINSON DES ARBRES, *Fringilla coelebs* (16)

Très commun en toutes saisons dans tout le département avec de nombreux indices de nidification. A la pointe de l'Aiguillon, on observe une migration très importante de Pinsons des arbres du 15 octobre au 15 novembre. Ils volent en bandes de plusieurs centaines d'individus souvent mélangés à des fringilles d'autres espèces. On peut estimer à plus de 50.000 pinsons le nombre des migrants en automne 1994.

PINSON DU NORD, *Fringilla montifringilla* (7)

Nous n'avons que des données d'hivernage du 06/11/94 à Saint-Vincent-sur-Jard (X.H et M.-P.V.) au 09/02/95 à Longeville (ADEV sud Vendée). Notons une observation de 30 oiseaux le 18/11/94 au Petit Bois de Venansault (F.P).

SERIN CINI, *Serinus serinus* (2)

Il est assez commun localement de mars à octobre. On note plusieurs données d'hivernage à Noirmoutier (A.B) et sur la côte. Une bande de 50 oiseaux environ est observée le 26/02/95 dans les dunes de Givrand (G.B).

VERDIER D'EUROPE, *Carduelis chloris* (16)

Commun en toutes saisons dans tout le département. Hivérne en petites bandes.

CHARDONNERET ELEGANT, *Carduelis carduelis* (13)

Assez commun localement d'avril à octobre. Les chardonnerets hivernent en bandes. Nous avons des données d'hivernage sur la côte avec plus de 25 ind. le 13/12/94 à Champagné (C.G) mais aussi dans le bocage avec un groupe de 40 le 01/02/95 au Bas-Ajonc à la Roche (S.C).

A la pointe de l'Aiguillon, on observe une migration postnuptiale très importante du début d'octobre à la mi-novembre. On peut estimer que près de 60.000 Chardonnerets ont migré par la pointe en 1994.

TARIN DES AULNES, *Carduelis spinus* (11)

Il n'est observé qu'en hivernage de septembre à mars. La première donnée est du 17/09/94 à Jard-sur-Mer (ONC de Chanteloup) et la dernière du 16/03/95 à Rocheservière (L.G). Une bande de 45 oiseaux est observée le 30/12/94 à Dompierre (S.C), une de 50 à 60 le 25/01/95 au Poiré-sur-Velluire (C.G).

LINOTTE MELODIEUSE, *Carduelis cannabina* (14)

Assez commune localement en toutes saisons, les Linottes hivernent en grandes bandes en Vendée. Des groupes sont signalés le 15/12/94 à Mouzeuil (J.-C.L), le 15/02/95 à Rocheservière (L.G).

On observe une migration postnuptiale très importante à la pointe de l'Aiguillon de la mi-septembre à la mi-novembre. On estime que 70.000 Linottes ont migré par la pointe en 1994.

SIZERIN FLAMME, *Carduelis flammea* (1)

Une seule observation d'un Sizerin en migration le 06/11/94 à la pointe de l'Aiguillon (L.G).

BECCROISE DES SAPINS, *Loxia curvirostra* (0)

Pas de donnée en 1994-95.

BOUVREUIL PIVOINE, *Pyrrhula pyrrhula* (12)

Nous avons des données en toutes saisons de cet oiseau devenu rare en Vendée. Les données proviennent de divers points du département et en particulier de l'île d'Yeu où on l'observe encore régulièrement.

GROSBEC CASSENOYAUX, *Coccothraustes coccothraustes* (0)

Pas de donnée en 1994-95.

BRUANT LAPON, *Calcarius lapponicus* (0)

Pas de donnée en 1994-95.

BRUANT DES NEIGES, *Plectrophenax nivalis* (3)

Les 3 données hivernales proviennent de la côte : un couple le 26/12/94 à la pointe de l'Aiguillon (P.G), 1 femelle le 20/12/94 au Gois (O.P) et 1 mâle le 28/12/94 à Noirmoutier (LPO Noirmoutier).

BRUANT JAUNE, *Emberiza citrinella* (12)

Il est présent toute l'année un peu partout dans le département mais n'est commun que localement.

BRUANT ZIZI, *Emberiza cirlus* (22)

Il est présent toute l'année un peu partout dans le département. Il est commun localement.

BRUANT ORTOLAN, *Emberiza hortulana* (1)

Cet oiseau est devenu très rare. Nous n'avons qu'une seule donnée d'un petit groupe en migration, le 31/08/94 à Rocheservière (L.G).

BRUANT DES ROSEAUX, *Emberiza schoeniclus* (15)

Il est commun en toutes saisons dans les Marais Breton et Poitevin et autour des étangs du bocage. 10 couples de Bruants des roseaux sont recensés le 01/06/95 à la réserve de St-Denis (ADEV sud Vendée)

A la pointe de l'Aiguillon, on observe une migration postnuptiale importante de Bruants des roseaux de la mi-octobre à la mi-novembre.

BRUANT PROYER, *Miliaria calandra* (14)

Il est commun dans les Marais Breton et Poitevin ainsi que dans la plaine calcaire.

Quelques données d'hivernage sont enregistrées : le 03/12/94 à la prise des Wagons (S.V et A.T), le 30/01/95 à la digue des Prises (C.G) et en février à Beauvoir.

Liste des observateurs :

P. Adams	P.A	A. Gérard	A.G	P. Rouillier	P.R
G.Balança	G.Bal	O. Girard	O.G ou ONC	M. Roy	M.R
M.-N. Balança	M.-N.Bal	C. Gonin	C.G	F. Salmon	F.S
H. Belier	H.B	J. Gonin	J.G	A. Sarrazin	A.S
F. Berland	F.B (49)	A. Goubert	A.Go	F. Signoret	F.Si
G. Besseau	G.B	L. Grillet	L.G	B. Teillet	B.T
C. Brochard	C.B	T. Gueffier	T.Gu (49)	M. Tessier	M.T
A. Brodie	A.B	X. Hindermeyer	X.H	A. Thomas	A.T ou ADEV
D. Brossard	D.B	F. Jiguet	F.Ji	Y. Trévoux	Y.T
G. Bulidon	G.Bu	A. Larousse	A.L	B. Trolliet	B.T ou ONC
B. Buono	B.Bu (49)	C. Launay	C.L	M. Tuteau	M.T
J.-P. Buron	J.-P.B (49)	O. Loir	O.L (49)	V. Vecquaud	V.V
D. Casseron	D.C	J.-C. Luez	J.-C.L	M.-P. Vignault	M.-P.V
S. Charrier	S.C	W. Maillard	W.M	J. Vimpère	J.V
G.-L. Choquene	G.-L.C	S. Mérand	S.M	S. Vignaud	S.V
M. Clémot	M.C	P. Moteau	P.M	P. Yésou	P.Y
B. Condoumi	B.C	S. Palier	S.P ou ADEV	T. You	T.Y
J. Delattre	J.D	V. Pasquier	V.Pa (49)		
C. Denéchère	C.De (49)	O. Penard	O.Pe	ADEV sud Vendée	ADEV
H. Destouches	H.D ou ADEV	B. Perrotin	B.P	Equipe LPO Noirmoutier	LPO
S. Durand	S.D	D. Philipon	D.P	Noirmoutier	
P.-P. Erard	P.-P.E	F. Portier	F.P	Equipe PNR	PNR
J.-P. Emeriau	J.-P.	C. Potiron	C.Po	ONC Chanteloup	ONC
M. Fouquet	M.F ou ONC	D. Rautureau	D.R ou ADEV	Sortie S.N.P.N.	S.N.P.N.
J.-Y. Frémont	J.-Y.F	J. Rautureau	J.R	Sorties G.O.V.	G.O.V.
P. Gallot	P.G	P. Retiveau	P.Re		

Dessins :

M. Fouquet p 88; J. Gonin p 70, p 86; C. Goyaud p 75, p 84; J.-C. Luez p 36, p 39; O. Pouvreau p 48.

Photos :

G. Besseau p 57, p 61; P. Garguil p 41, p 42; C. Gonin p 65; J. Gonin p 78.