

# Stationnement hivernal d'un bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*) sur l'île de Noirmoutier

Didier DESMOTS et Matthieu VASLIN

Le 28 janvier 2002, l'un d'entre nous examine un groupe d'environ 200 chevaliers gambettes (*Tringa totanus*) sur le reposoir de marée haute de la Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, à Noirmoutier-en-l'Île (Vendée). Parmi ces oiseaux, un autre limicole de taille nettement inférieure attire l'attention. Il s'agit manifestement d'un bécasseau en plumage internuptial complet, mais la silhouette ne correspond pas à celle d'un bécasseau variable (*Calidris alpina*). Le bec long, nettement recourbé vers le bas, le sourcil blanc très marqué, les pattes noires et longues et surtout le croupion blanc bien visible lors des petits déplacements de l'oiseau indiquent qu'il s'agit d'un bécasseau cocorli (*C. ferruginea*).

Cet oiseau est ensuite observé régulièrement sur le site, jusqu'au 14 mars 2002, toujours en compagnie des chevaliers gambettes. Un bécasseau cocorli est également noté le 11 février 2002 dans l'anse du Gois. Il s'agit probablement du même individu car, grâce à l'observation d'oiseaux bagués, des échanges ont déjà été constatés pour diverses espèces de limicoles entre le reposoir de la Réserve Naturelle et les vasières du Gois, distantes d'une dizaine de kilomètres.

Ceci fait suite à des observations tardives à l'automne précédent (un bécasseau cocorli avait été noté sur la Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg les 27 et 29 novembre 2001, dans le même reposoir de chevaliers gambettes) et suggère qu'un bécasseau cocorli a hiverné sur le site.

En France, le Bécasseau cocorli est un migrateur régulier aux deux passages et fréquente l'ensemble des zones humides du littoral. Lors de la migration postnuptiale, les dernières observations sont réalisées dans le courant du mois d'octobre, parfois début novembre, et la migration pré-nuptiale débute généralement en mars (GIRARD 1992, DUBOIS *et al.* 2000). Les observations en période hivernale sont exceptionnelles. DUBOIS *et al.* (2000) ne mentionnent qu'une donnée, concernant un

individu le 27 décembre 1983 en Loire-Atlantique.

En Vendée, les observations cadrent bien avec ce calendrier migratoire, mais l'examen du fichier de la LPO 85 apporte toutefois une mention complémentaire à une date intéressante : 1 ind. le 13 février 1996, pointe de l'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer (Alain Thomas, *in* fichier LPO 85).

Le Bécasseau cocorli semble donc pouvoir être marginalement présent en hiver en Vendée. Ceci est conforme à la tendance enregistrée en Europe où des cas d'hivernage ont été mis en évidence (CRAMP & SIMMONS, 1982). Les observations de cette espèce en dehors des périodes classiques d'apparition doivent toutefois être bien circonscrites. Les risques de confusion de la part d'observateurs n'ayant pas une bonne expérience des limicoles sont réels. En plumage hivernal, des bécasseaux variables présentant un long bec peuvent aisément prêter à confusion. À l'inverse, cette relative ressemblance fait que l'espèce pourrait parfois passer inaperçue.

L'examen attentif des groupes de limicoles en décembre et janvier, pas toujours facile à réaliser, permettrait de préciser le statut hivernal du Bécasseau cocorli.

## REMERCIEMENTS

Nous remercions Christian Gonin pour la recherche des observations disponibles dans le fichier de la LPO85 et Pierre Yésou pour la relecture de cette note.

## BIBLIOGRAPHIE

CRAMP S. & SIMMONS K.E.L. (Eds) - 1982 - *The Birds of the Western Palearctic. Vol III : Waders to Gulls*. Oxford University Press, Oxford, London - New York, 913 pages.

DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., YESOU P. & OLIOSO G. - 2000 - *Inventaire des oiseaux de France*. Nathan/HER, Paris, 400 pages.

GIRARD O. - 1992 - La migration des limicoles en France métropolitaine à partir d'une synthèse bibliographique. *Alauda*, 60 : 13-33.

SMIT C.J. & PIERSMA T. - 1994 - Effectifs, distribution à la mi-janvier et migration des populations de limicoles utilisant la voie de migration est-atlantique. *Bull. mens. de l'ONC*, 194 : 18-43.

Didier DESMOTS et Matthieu VASLIN  
Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg  
Ligue pour la Protection des Oiseaux  
Fort Larron  
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ILE  
marais.mullembourg@wanadoo.fr



*Un bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) photographié à Beauvoir-sur-Mer en septembre 1999.  
Photo © Frédéric SIGNORET / LPO*