

défavorables plus au Nord (coup de froid de fin Décembre).

L'effectif de plus de 51.000 Anatidés est de loin le nombre le plus important enregistré en Vendée depuis l'hiver mémorable et cruel de 1962-1963.

Puissent, tous ceux que cela intéresse, faire en sorte que la richesse et la diversité des milieux humides, non seulement en Vendée mais dans l'Ancien Monde (à l'échelle des déplacements de ces oiseaux), soient conservées en l'état, au moins. Sinon nous serons les derniers témoins d'une richesse que nos enfants regretteront...

Nouvelles Ornithologiques Vendéennes (Janvier à Juin 1977).

NIDIFICATIONS:

- Deux nouvelles colonies de Guiffettes Noires (*Chlidornias niger*) : une sur le communal de St Benoist/Mer (environ 12 couples), une sur le communal de Longeville (environ 7 couples). DAVIAU, BARITEAU, MORNET.

- Les différentes colonies de Barges à queue noire (*Limosa limosa*) en Vendée pour 1977 : communal de Triaize (2-3 couples) ; communal de Luçon (2-3 couples) ; communal de Beugné l'abbée (5-6 couples). Soit un total de 9 à 12 couples !!! C'est peu. GARNIER, WATIER.

- Ont niché sur la Lagune de Bouin mise en réserve de nidification (accès interdit) cette année : Sterne naine (*Sterna albifrons*) 5 couples ; Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) 180 couples, Avocettes (*Recurvirostra avosetta*) 24 couples ; Gravelot à Collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) 6-7 couples ; Vanneau (*Vanellus vanellus*) 43 couples ; Gambette (*Tringa totanus*) 10 couples. METAIS.

- Une forte augmentation des effectifs d'Avocettes (*Recurvirostra avosetta*) a été notée cette année en période de reproduction, par rapport à 1976 : Marais d'Olonne : 340-380 contre 200 ; Marais de Bouin : 130-140 contre 50-60 ; Marais de la Guittièrre : 30 contre 30. Soit un total de 500-550 contre 280-290 en 1976.

Par contre, forte diminution des couples d'Phasses (*Himantopus himantopus*) : Marais d'Olonne : 20 contre 30 ; Marais de Bouin : 4 contre 20 ; Marais de Noirmoutier : 3-5 contre 20-25.

- Sur renseignements de M. JOLY (Beauvoir/Mer) une colonie de Hérons cendrés (*Ardea cinerea*) a été localisée dans le nord de la Vendée.

OBSERVATIONS :

- Un très important passage de Mouettes pygmées (*Larus minutus*) du 20 Mars au 20 Avril 1977. Un maximum de 1000-1200 le 25 Mars sur la Réserve de Chanteloup, Ile d'Olonne (équipe Chanteloup).

- 5 à 8 Cigognes blanches (*Ciconia ciconia*) séjournent dans le Marais de Longeville depuis début Mai (ou avant) (BARITEAU, MORNET).

- 1 Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*), ♀ en plumage nuptial, a été observé le 15 Mai 1977 en Baie de l'Aiguillon (GARNIER, WATIER).

- 1 Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*) en compagnie de 4 Corneilles noires (*Corvus corone corone*) le 8 Mai 1977 sur la dune de Sauveterre (GARNIER).

- 1 Mergule nain (*Plautus alle*) sur la Réserve de Chanteloup le 21/2/77.

AVIS : 4 Flamands du Chili (*Phoenicopterus ZOOFILIVS...*) stationnent dans le Marais d'Olonne. Prière à ceux qui les ont perdu de venir les chercher... (mais ils volent bien !).
