



CONSEILS ET CONSIGNES POUR L'ATTRIBUTION DES CODES DE NIDIFICATION EN PAYS DE LA LOIRE



Butor étoilé (Francis Cauet ©)

Guide n°2 : du Butor étoilé au Faucon pèlerin

V1 - 07.04.2010



PAYS DE LA LOIRE



L'ensemble des informations composant ce guide sont principalement issues de documents suivants :

- « Vade-mecum de l'Ornitho en Poitou-Charentes » réalisé et coordonné par Poitou-Charentes Nature
- « Consignes par espèces, commentaire sur le statut et le comportement des espèces nicheuses en Bretagne » réalisé par le Groupe Ornithologique Breton.

Nous tenons vivement à remercier les ornithologues et les associations nous ayant permis de reprendre divers informations concernant la biologie et l'écologie des espèces et tout particulièrement : Charente Nature, le Groupe Ornithologique Breton, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, la LPO Charente-Maritime, la LPO Vienne et Poitou-Charentes Nature ainsi que Patrice Choisy, Jean-Marie Clavery, Alain Doumeret, Bruno Dubrac, Alexandre Dutrey, Jean Fonbonnat, Daniel Gilardot, Pierre Grillet, Pierre Guignard, Éric Jeamet, Pascal Lavoue, François Lecomte, Michel Masson, Michel Matard, Fabien Mercier, Loïc Petit, David Pinaud, Victor Turpaud-Fizzala et Benoît Van Hecke.

Une grande partie des informations proviennent également de l'état des lieux sur l'avifaune en Pays de la Loire réalisé en 2008.

Espèces présentes dans ce guide

- Butor étoilé
- Blongios nain
- Bihoreau gris
- Crabier chevelu
- Héron garde-bœufs
- Aigrette garzette
- Grande Aigrette
- Héron cendré
- Héron pourpré
- Cigogne noire
- Cigogne blanche
- Ibis sacré
- Spatule blanche
- Bondrée apivore
- Milan noir
- Circaète Jean-le-Blanc
- Busard des roseaux
- Busard Saint-Martin
- Busard cendré
- Autour des palombes
- Épervier d'Europe
- Buse variable
- Aigle botté
- Balbuzard pêcheur
- Faucon crécerelle
- Faucon hobereau
- Faucon pèlerin


Légendes

Phénologie de la reproduction

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

La période de reproduction de l'espèce est indiquée par le dégradé bleu. Pour les migrateurs, attention aux individus de passage en début et fin de période.

Carte de présence



Ardéidés

Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : uniquement dans les roselières inondées, couvrant généralement de grande surface.

Conseils : **ne pas mettre de codes « possible » avant le mois d'avril** hormis pour les chanteurs. Prospector les secteurs connus et favorables au moment du couché ou du levé du soleil afin d'écouter les mâles chanteurs.



Blongios nain (*Ixobrychus minutus*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : roselières et cariçaies inondées des marais et étangs d'eau douce ainsi que dans la végétation arbustive résultant notamment de l'abandon des roselières.

Conseils : à rechercher sur les sites connus, au crépuscule, afin d'entendre le chant discret du mâle. Suivre autant que possible la reproduction.



Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : ripisylves abondantes et inondées des cours d'eau et des plans d'eau ainsi que dans les saulaies inondées des marais ; niche en colonie, dans les arbres.

Conseils : **éviter les codes de nidification hors des colonies** ; à rechercher sur les sites de reproduction connus ; repérer les nids, transport de matériaux et les jeunes... Attention à la dispersion parfois précoce de ces derniers (juin).



Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : zones humides dans lesquelles il s'installera au sein de colonies d'ardéidés. Nid dans les arbres.

Conseils : **ne pas mettre de codes « possible » avant le mois d'avril** ainsi qu'en dehors des sites de nidification ; prospector les colonies d'ardéidés connues et surtout, suivre la reproduction si un individu est découvert.



Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : niche en colonie avec d'autres ardéidés. Moins inféodé aux zones humides que les autres espèces.



Conseils : **éviter les codes de nidification hors des colonies** ; prêter attention aux individus en plumage nuptial (plumes orangées sur le dos, la poitrine et la tête, bec jaune et pattes rougeâtre) ; rechercher les transports de matériaux (mars et avril), les nids et les jeunes non volants.



Héron garde-bœufs (Francis Cauet ©)

* : espèce devant faire l'objet d'une attention particulière en 2009 (enquête spécifique)

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : se reproduit en colonie mixte de hérons dans les arbres, aussi bien sur la côte qu'à l'intérieur des terres.

Conseils : **éviter les codes de nidification hors des colonies** ; prêter attention aux individus en plumage nuptial (2 longues plumes sur la nuque) ; rechercher les transports de matériaux (avril et mai), les nids et les jeunes non volants.



Grande Aigrette (*Casmerodius albus*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : se reproduit en colonie mixte d'ardéidés dans les arbres, à proximité de zones humides (plans d'eau, marais...).

Conseils : **éviter les codes de nidification hors des colonies** ; prêter attention aux individus en plumage nuptial (bec noir vers l'extrémité et jaune à la base, haut des pattes rougeâtres) ; rechercher les transports de matériaux, les nids et les jeunes non volants.



Héron cendré (*Ardea cinerea*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : se reproduit en colonie, parfois mixte, souvent à proximité de plans d'eau, zones humides ou cours d'eau mais pas forcément sur la rive.

Conseils : **éviter les codes de nidification hors des colonies** ; surveiller les directions prises par les individus en plumage nuptial (couleur rose du bec) pour trouver la colonie ; parades dès février puis mars ; accouplement en mars, surveiller les transports de matériaux ; espèce bruyante (nombreux cris).



Héron pourpré (*Ardea purpurea*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : marais et plans d'eau riches en végétation et présentant d'importantes roselières ou boisements inondés ; niche surtout dans les roselières mais peut construire son nid dans un arbre, notamment dans les saulaies

Conseils : **éviter les codes « possible » avant la mi-avril** ; rechercher les transports de matériaux en avril puis les allers et venus des adultes allant nourrir au nid aux mois de juin et juillet.



Ciconiidés

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : massifs boisés proches de zones humides pour l'alimentation : vallées, prairies, mares...

Conseils : attention aux migrateurs tardifs (mai) et précoces (juillet). **Pas de code « possible » avant le mois de juin.** Très discrète ; repérer les nids en hiver (diamètre 1,5 m) ; repérer les individus planant au dessus des massifs forestiers en juin et juillet.



Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : souvent à proximité de zones humides, construit son nid dans les arbres, sur une plate-forme ou sur les pylônes des lignes haute-tension.

Conseils : attention aux migrateurs en début de saison et aux individus erratiques ; éviter les codes de nidification hors des sites de reproduction : repérer les parades (claquement de bec) et les cantonnements (recharge des nids en matériaux).



* : espèce devant faire l'objet d'une attention particulière en 2009 et 2010 (enquête spécifique)



Cigognes blanches paradant (Louis-Marie Préau ©)

Threskiornithidés

Ibis sacré (*Threskiornis aethiopicus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : en colonie mixte avec d'autres ardéidés, principalement dans les arbres à proximité de zones humides.

Conseils : **éviter les codes de nidification hors des colonies de nidification** ; attention aux nombreux individus erratiques en raison notamment des campagnes de tir ; repérer les transports de matériaux et les jeunes non volant au nid.



Spatule blanche (*Platalea leucorodia*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : à proximité de zones humides, en colonie mixte avec d'autres ardéidés mais peut se retrouver isolée sur de nouveaux territoires ; nid dans les arbres.

Conseils : **éviter les codes de nidification hors des sites de nidification** ; repérer les individus fréquentant les colonies d'autres ardéidés et/ou posés sur des nids ; repérer d'éventuels allers-retours des adultes en plumage nuptial.



Accipitridés

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : plutôt en milieu forestier mais également dans les grosses haies en milieu bocager ; densité de couples assez faible.

Conseils : **éviter les codes « possible » avant la mi-mai** en raison des migrateurs tardifs ; parade nuptiale remarquable en mai (claque les ailes dans le dos en vol), le transport de matériaux (mai-juin) et de nourriture en juillet (« gâteau de cire ») ainsi que le feuillage frais dans l'aire sont des indices à rechercher.



Milan noir (*Milvus migrans*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : niche surtout à proximité de zones humides, dans des grands arbres en lisière de bois mais également de manière isolée ; nid souvent réutilisé d'une année sur l'autre.

Conseils : **éviter les codes « possible » avant le mois d'avril** ; repérer les parades (vol synchronisé, simulation d'attaque) et cris caractéristiques jusque fin avril ; les adultes



* : espèce devant faire l'objet d'une attention particulière en 2009 et 2010 (enquête spécifique)

alarmant lorsque l'on approche du nid ; la présence de déchets sur l'aire ou au pied est souvent caractéristique (à confirmer par la présence d'individus).

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : grands massifs forestiers ; aire de petite taille, pouvant être située à hauteur moyenne (dès 4-5 m).

Conseils : **éviter les codes « possible » en dehors des sites connus** ; une observation isolée est à confirmer car l'espèce peu chasser sur un rayon de 15 km autour de son aire ; repérer les parades (avril) et les transports de nourriture aux mois de juin et juillet (serpent dépassant du bec) ; recherche de nids en hiver.



Busard des roseaux* (*Circus aeruginosus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : en lisière des marais et des plans d'eau souvent riche en roselières ; niche au sol, au sein des roseaux ; se reproduit parfois dans les plaines céréalières

Conseils : repérer les parades (passage de proies) dès le mois de mars ainsi que le transport de matériaux ; surveiller le transport de proies et l'approvisionnement au nid.



Busard Saint-Martin* (*Circus cyaneus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : principalement dans les landes et les parcelles forestières en régénération ainsi que les clairières ; niche au sol.

Conseils : repérer les parades de la mi-mars à la mi-mai, mais également les passages de proies entre le mâle et la femelle en mai et en juin. Cette dernière retourne au nid pour alimenter les poussins.



Busard cendré* (*Circus pygargus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : surtout en plaines céréalières, où il niche au sol, directement dans les parcelles de blés ou d'orges

Conseils : prospecter les secteurs de plaines et repérer les parades, l'apport de matériaux (même après l'éclosion) et l'apport de proies.



Autour des Palombes (*Accipiter gentilis*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux forestiers de taille variable ; installe préférentiellement son aire au sein de vieilles futaies de résineux.

Conseils : repérer les parades au-dessus des massifs depuis un point haut dès le mois de février ; passer dans les parcelles favorables de la mi-juin à la mi-juillet afin de repérer les jeunes (cris) ; chercher les aires en hiver.



Autour des palombes (Louis-Marie Préau ©)

* : espèce devant faire l'objet d'une attention particulière en 2009 et 2010 (enquête spécifique)

Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : dans les massifs boisés et les bosquets surtout en milieu bocager mais également dans les parcs urbains.

Conseils : repérer les parades dès la mi-mars ; de juillet à août, les jeunes sont peu discrets.



Buse variable (*Buteo buteo*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : dans les massifs boisés et les bosquets en milieu bocager, forestier, dans les plaines et même les marais littoraux.

Conseils : éviter les codes « possible » avant le mois de mars ; repérer les parades, les cris des jeunes à partir de mi-juin et chercher les aires en hiver.



Aigle botté (*Hieraetus pennatus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : dans les massifs boisés variés, alternant feuillus et résineux, à proximité de milieux ouverts, de préférence bocagers.

Conseils : attention aux individus erratiques pouvant estiver ; l'observation d'un individu doit être suivi avant d'envisager un code atlas ; les parades spectaculaires sont visibles à partir de la mi-avril.



Pandionidés

Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : en milieu forestier, pas très loin de zones de pêches (étangs, lacs, cours d'eau...). Aire volumineuse au sommet d'un résineux (pin le plus souvent), sur un pylône de lignes haute-tension ou sur une plate-forme.

Conseils : attention aux migrants jusqu'en mars ainsi qu'aux individus erratiques. **Ne pas mettre de codes « possible » pour cette espèce.** Suivre les individus avec un poisson dans les serres afin de trouver le site de reproduction.



Balbuzard pêcheur (Louis-Marie Préau ©)

* : espèce devant faire l'objet d'une attention particulière en 2009 et 2010 (enquête spécifique)

Falconidés

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux très variés, même en zone urbaine. Utilise d'anciens nids de corvidés mais niche également dans des carrières, sur des bâtiments...

Conseils : éviter les codes « possible » avant le mois d'avril. Les cris caractéristiques « kikikikiki » émis en début de période sont un bon indice de nidification ; repérer également le transport de proies et les jeunes, bruyants, aux mois de juin et juillet.



Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux très variés ouverts à semi-ouverts. D'une manière générale, il utilise d'anciens nids de corvidés mais doit être recherché aussi sur les pylônes électriques.

Conseils : éviter les codes « possible » avant le mois de mai ; repérer les transports de proies et suivre les individus ; le mâle peut également être bruyant (cris ressemblant au crécerelle); les jeunes se font également remarquer aux mois d'août et de septembre.



Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : utilise les zones rupestres pour installer son aire, offrant généralement un large champ de vision. Peut également utiliser de grands édifices ou des ouvrages d'art.

Conseils : attention aux individus erratiques pouvant rester jusqu' au mois d'avril voire plus. Le transport de proies, les acrobaties en vol ainsi que les échanges de proies sont souvent de bons indices de nidification.



Bibliographie

Groupe Ornithologique Breton, 2004. *Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Annexe 3 : Consignes par espèce, commentaires sur le statut et le comportement des espèces nicheuses en Bretagne*. Groupe Ornithologique Breton, 6 p.

Marchadour B. & Séchet E. (coord.), 2008. *Avifaune prioritaire en Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 221 p.

Poitou-Charentes Nature, (éds.) 2005. *Vade-mecum de l'ornitho en Poitou-Charentes*. Poitou-Charentes Nature, Poitiers, 186 p.

Thiollay J.-M. & Bretagnolle V. (coord.), 2004. *Rapaces nicheurs de France, distribution, effectifs et conservation*. Delachaux et Niestlé, Paris, 175 p.