

**Gast Beobachter** [\[ausloggen\]](#)

**TAGESLISTE - Bitte alle festgestellten Arten eintragen!**

**Ort** Döllnitzsee / Wermdorf (SN, TDO)  
**Datum** Samstag, 23. Juli 2011 / 10h00-13h00

[\[den Ort ändern\]](#)

Bitte klicken Sie sämtliche beobachteten Arten an (Feld wird gelb = Art nachgewiesen). Mit solchen Tagesblättern helfen Sie, dass für ein Gebiet oder eine Gemeinde möglichst vollständige Artenlisten erstellt werden können. Sie erhöhen den Wert Ihrer Angaben, wenn Sie bei den eher seltenen Arten eine exakte Zahl oder mindestens eine Schätzung eingeben. Für Detailinträge: + anklicken.

<input type="checkbox"/> Höckerschwan	142	Brutzeitcode : kein
<input type="checkbox"/> Singschwan		Brutzeitcode : kein
<input type="checkbox"/> Kanadagans		Brutzeitcode : kein
<input type="checkbox"/> Graugans	100	
<input type="checkbox"/> Nilgans		
<input type="checkbox"/> Brandgans		
<input type="checkbox"/> Mandarinente		Brutzeitcode : kein
<input type="checkbox"/> Schnatterente	12	Brutzeitcode : C13b
<input type="checkbox"/> Pfeifente		Brutzeitcode : kein
<input type="checkbox"/> Krickente	10	Brutzeitcode : kein
<input type="checkbox"/> Stockente	300	
<input type="checkbox"/> Stockente, Bastard, fehlfarben		
<input type="checkbox"/> Spießente		Brutzeitcode : kein
<input type="checkbox"/> Knäkente		Brutzeitcode : kein
<input type="checkbox"/> Löffelente	4	Brutzeitcode : kein
<input type="checkbox"/> Kolbenente		Brutzeitcode : kein
<input type="checkbox"/> Tafelente	15	Brutzeitcode : kein
<input type="checkbox"/> Reiherente	35	Brutzeitcode : C16
<input type="checkbox"/> Schellente		Brutzeitcode : kein
<input type="checkbox"/> Gänseäger		Brutzeitcode : kein

## Hinweise zur Prioritätensetzung bei der Sammlung von Zufallsbeobachtungen

Stand: 30. Oktober 2011

**A**ls Beobachter notiert und meldet man vor allem persönlich als interessant angesehene Vogelarten oder Ansammlungen und nicht unbedingt die, für die aus Sicht des Naturschutzes oder des Vogelmonitorings ergänzende Informationen benötigt werden bzw. die avifaunistisch interessante Auswertungen ermöglichen. Deshalb haben wir alle in Deutschland nachgewiesenen Vogelarten in drei Kategorien eingestuft, um Ihnen bei der Sammlung und Meldung von Zufallsdaten eine Orientierung hinsichtlich der Prioritätensetzung zu geben:

- a Vogelarten, denen ganzjährig besondere Aufmerksamkeit geschenkt und für die zudem möglichst oft eine Häufigkeitsangabe gemacht werden sollte (s. Hinweis 1).
- b Vogelarten, denen während der Brutzeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden und für die zu dieser Zeit möglichst oft eine Häufigkeitsangabe gemacht werden sollte.
- c Häufige und weit verbreitete oder über die Erfassungsprogramme bereits gut überwachte Vogelarten, deren Erfassung ganzjährig wünschenswert, jedoch nicht prioritär ist.

Bei den Arten der Kategorien a und b handelt es sich also vorwiegend um Arten, die über die Monitoringprogramme nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausreichend erfasst werden, bei denen zusätzliche Informationen für die Naturschutzarbeit wichtig (Anhang I-, Rote Liste-Arten) oder die aus avifaunistischer Sicht besonders interessant sind.

Eine Differenzierung nach den prioritären a- und b-Arten sowie allen Arten findet sich auch bei den sog. Tageslisten, die eine wichtige Grundlage für phänologische Darstellungen, Berechnungen zu Bestandsveränderungen und Modellierungen sind. **Bitte füllen Sie daher Tageslisten aus, so oft Sie können** – auch für alle Arten! Sie werden sehen, dass es spannend ist, regelmäßig alle Arten zu notieren. Näheres zu den Tageslisten finden Sie im Infoblatt zur „Mitarbeit bei ornitho.de“.

**Wichtig:** Die Einteilung in die obigen Kategorien erfolgte aus bundesweiter Sicht! Auf regionaler und lokaler Ebene dürften oft auch Arten der Kategorie c von hohem Interesse sein, z. B. in Regionen, in denen Feldlerchen oder Gartenrotschwänze mittlerweile eine Seltenheit geworden sind. Ebenso steht z. B. die Dreizehnenmöwe in Kategorie c, da die Brutbestände auf Helgoland jährlich

**Hinweis 1: Auch Schätzungen oder Mindestangaben sind hilfreich!**

Insbesondere außerhalb der Brutzeit treten Zugvogelarten mitunter in großen Trupps auf (z. B. Gänse, Limikolen, Möwen, Rabenvögel). Oft ist es schwierig, teils auch nicht möglich, diese genau zu zählen oder es fehlt die Zeit für eine genaue Erfassung. Doch auch Schätzungen oder Mindestangaben liefern wichtige Informationen. Versuchen Sie deshalb – insbesondere bei den a-Arten – Schätzungen oder Mindestangaben abzugeben und diese in ornitho.de zu übermitteln. In der Auswahlliste neben dem Feld zur Bestandsangabe können Sie angeben, ob es sich um eine genaue Zählung, eine Schätzung oder eine Mindestangabe handelt. Vielen Dank!

gezählt und sie außerhalb der Brutzeit im Rahmen der Seabirds at Sea-Erfassungen gut erfasst wird. Dennoch werden sie in vielen Regionen Scharen von Beobachtern anlocken. Als Faustregel kann also gelten: **Melden Sie alles, was Ihnen interessant erscheint, jedoch auch immer die aus bundesweiter Sicht prioritären Arten!**

**Bitte beachten:** In der nachfolgenden Liste **NICHT AUFGEFÜHRT** sind alle sehr selten (< 100 Ind. jährlich) auftretenden Vogelarten, Unterarten sowie Gefangenschaftsflüchtlinge, nicht etablierte Neozoen und Hybride. Diese stehen aufgrund ihrer Seltenheit grundsätzlich in Kategorie a!



Der Bruchwasserläufer ist eine typische a-Art, da derzeit kein Erfassungsprogramm von Limikolen im Binnenland existiert.

Foto: Christoph Moning.

## Kategorie a

Vogelarten, denen ganzjährig besondere Aufmerksamkeit geschenkt und für die zudem möglichst oft eine Häufigkeitsangabe gemacht werden sollte (s. Hinweis 1). **NICHT AUFGEFÜHRT** sind alle sehr selten (< 100 Ind. jährlich) auftretenden Vogelarten, Unterarten sowie Gefangenschaftsflüchtlinge, nicht etablierte Neozoen und Hybride. Diese stehen aufgrund ihrer Seltenheit grundsätzlich in Kategorie a!

Artnamen	wiss. Artname
Schwarzkopf-Ruderente	<i>Oxyura jamaicensis</i>
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>
Zwergschwan	<i>Cygnus bewickii</i>
Hellbäuchige Ringelgans	<i>Branta bernicla hrota</i>
Waldsaatgans	<i>Anser fabalis fabalis</i>
Tundrasaatgans	<i>Anser fabalis rossicus</i>
Kurzschnabelgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>
Zwerggans	<i>Anser erythropus</i>
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>
Bergente	<i>Aythya marila</i>
Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>
Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>
Alpenschneehuhn	<i>Lagopus muta</i>
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>
Sternstaucher	<i>Gavia stellata</i>
Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>
Dunkler Sturmtaucher	<i>Puffinus griseus</i>
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Kormoran (ssp. carbo)	<i>Phalacr. carbo carbo</i>
Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>

Artnamen	wiss. Artname
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>
Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>
Seedler	<i>Haliaeetus albicilla</i>
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>
Merlin	<i>Falco columbarius</i>
Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>
Großtrappe	<i>Otis tarda</i>
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>
Seereggenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>
Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>
Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>
Isländische Uferschnepfe	<i>Limosa limosa islandica</i>
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>
Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>
Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>
Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>

Artnamen	wiss. Artname
Sumpfläufer	<i>Limicola falcinellus</i>
Sanderling	<i>Calidris alba</i>
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>
Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>
Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>
Meerstrandläufer	<i>Calidris maritima</i>
Schmarotzerraubmöwe	<i>Stercorarius parasiticus</i>
Falkenraubmöwe	<i>Stercorarius longicaudus</i>
Spatelraubmöwe	<i>Stercorarius pomarinus</i>
Skua	<i>Stercorarius skua</i>
Papageitaucher	<i>Fratercula arctica</i>
Krabbentaucher	<i>Alle alle</i>
Tordalk	<i>Alca torda</i>
Gryllteiste	<i>Cephus grylle</i>
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>
Baltische Heringsmöwe	<i>Larus fuscus fuscus</i>
Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>
Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>
Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>
Weißbart-Seeschwalbe	<i>Chlidonias hybrida</i>
Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>

Artnamen	wiss. Artname
Halsbandsittich	<i>Psittacula krameri</i>
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>
Uhu	<i>Bubo bubo</i>
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>
Ohrenlerche	<i>Eremophila alpestris</i>
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>
Schwanzm. (ssp. caudatus)	<i>Aegithalos c. caudatus</i>
Gelbbrauen-Laubsänger	<i>Phylloscopus inornatus</i>
Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>
Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>
Nordische Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus cinclus</i>
Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>
Strandpieper	<i>Anthus petrosus</i>
Thunbergschafstelze	<i>Motacilla thunbergi</i>
Trauerbachstelze	<i>Motacilla yarrellii</i>
Gimpel (ssp. pyrrhula), „Trompetergimpel“	<i>Pyrrhula p. pyrrhula</i>
Zitronenzeisig	<i>Carduelis citrinella</i>
Berghänfling	<i>Carduelis flavirostris</i>
Spornammer	<i>Calcarius lapponicus</i>
Schneeammer	<i>Calcarius nivalis</i>

## Kategorie b

Vogelarten, denen während der Brutzeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden und für die zu dieser Zeit möglichst oft eine Häufigkeitsangabe gemacht werden sollte.

Artnamen	wiss. Artname
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>
Graugans	<i>Anser anser</i>
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>
Krickente	<i>Anas crecca</i>
Spießente	<i>Anas acuta</i>
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>

Artnamen	wiss. Artname
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>
Kranich	<i>Grus grus</i>

Artnamen	wiss. Artname
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>
Waldohreule	<i>Asio otus</i>
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>
Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Alpensegler	<i>Apus melba</i>
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>
Grauspecht	<i>Picus canus</i>
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>
Alpendohle	<i>Pyrrhocorax graculus</i>
Tannenhäher	<i>Nucifr. caryocatactes</i>
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>
Felsenschwalbe	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>

Artnamen	wiss. Artname
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>
Drosselrohrsänger	<i>Acroceph. arundinaceus</i>
Orpheusspötter	<i>Hippolais polyglotta</i>
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>
Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>
Schneesperling	<i>Montifringilla nivalis</i>
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>
Graumammer	<i>Emberiza calandra</i>
Zaunammer	<i>Emberiza cirlus</i>
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>

### Kategorie c

Häufige und weit verbreitete oder über die Erfassungsprogramme bereits gut überwachte Vogelarten, deren Erfassung ganzjährig wünschenswert, jedoch nicht prioritär ist.

Artnamen	wiss. Artname
Ringelgans	<i>Branta bernicla</i>
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>
Eissturmvogel	<i>Fulmarus glacialis</i>
Basstölpel	<i>Sula bassana</i>
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>

Artnamen	wiss. Artname
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>
Pfuhschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>
Knutt	<i>Calidris canutus</i>
Trottellumme	<i>Uria aalge</i>
Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>



Artnamen	wiss. Artname
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>
Brandseeschwalbe	<i>Sterna sandvicensis</i>
Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>
Straßentaube	<i>Columba livia f. dom.</i>
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>
Mauersegler	<i>Apus apus</i>
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>
Elster	<i>Pica pica</i>
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>
Dohle	<i>Coloeus monedula</i>
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>
Kohlmeise	<i>Parus major</i>
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>
Schilfrohrsänger	<i>Acroc. schoenobaenus</i>
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>

Artnamen	wiss. Artname
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>
Amsel	<i>Turdus merula</i>
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>
Haussperling	<i>Passer domesticus</i>
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>
Kernbeißer	<i>Coccothr. coccothraustes</i>
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>